



PP

Q
Gr

L. 1. 22

D

III

158



Eight Days for perusal
1365

Hearts for

XLII.

1.

11


XIII.

2.

12.

L4-16

8851



Donavit

Guo. Hamilton Act B. Prop.

Societatis Nostrae

Socius Honorarius

M,DCC,LXXXVII

IO. ZACHAR. PLATNERI
INSTITVTIONES
CHIRVRGIAE
RATIONALIS.

PARS POSTERIOR.



O E D E M A.

§. 726.

Sed, cum de variis tumoribus dictum sit, qui cum inflammatione sunt, iam etiam transibo ad alia genera, quae a veteribus frigida dicta fuerunt. Incipiam autem ab oedemate et tumoribus, qui iis oriuntur, quos aqua inter cutem male habet.

§. 727.

Οἰδημα nomen est tumori pallido, molli, frigido, et qui sine dolore atque sine inflammationis indicibus est. Si digito comprimitur, is cedit, ita, ut plerumque sinus per aliquod tempus in cute permaneat. Per se et ex paruulo incipere solet et diu paulatimque crescere.

§. 728.

Oritur, si lymphæ, vel serum, per inuisibilia cutis foramina exire solitum, vel in lymphaticis, et his etiam minoribus, arteriis atque venis, vel in adipis cellulis, vel, id, quod in vario hydropis genere fit, in aliquo cauo subsistit. Nonnunquam enim ipsa cutis, in cuius arteriis, serum afferre solitis, humor etiam haerere videtur, intumescit. Quidquid igitur et sanguinis et lymphæ vitalem motum et seri excretionem impedit, potest oedemati occasionem dare *.

* Oedema ex iisdem causis oriri potest, ex quibus oriri solet inflammatio. Si enim corpuscula, per minores arterias sanguinem ferentes manantia, prorsus quiescunt, et si sanguis a corde motus maiori vi ad hunc locum appellitur, is in minores et lymphæ accommodatas, e latereeductas arterias urgetur, oritur obstructio et vera atque sanguinea inflammatio (34). Si vero manantia illa corpuscula in extremis arteriis, quæ sanguinis capaces sunt, non prorsus

sub-

subsistunt, motu tamen multo tardiori ac impeditiori feruntur, lymphæ a sanguine recedit, et copiosior in illas minores arterias recipitur. Minores vero illae arteriae sic distentae oedema faciunt.

§. 729.

Crebrius autem oedema nascitur, si sanguis non libere per venas refluere potest. Membrum enim quoduis intumescit, si maior vena ita comprimatur, ut sanguis quidem haud omnino consistat et quiescat, at vero per eam difficulter atque aegre fluat. Eam ob causam gravidis, quarum iliaca venae ab uteri mole premuntur, pedes intumescunt, id quod etiam iis accidit, qui, in rheda sedentes, vel equo vecti, iter faciunt, quorum etiam venae, quae per femora descendunt, premuntur. Si ossibus fractis ferulae panique ita accommodati sunt, ut venae comprimantur, idem tumoris genus oriri solet.

§. 730.

Vt autem hoc incidit, si venae sanguini accommodatae comprimuntur, sic etiam oedemata nascuntur, si venae illae exiguae, quae lympham recipiunt, a quacunque causa comprimuntur atque arctantur. Proinde, si qua parte glandulae conglobatae, vel etiam viscera glandulis assimilata, intumescunt, et scirrhus occupantur, corpus his tumoribus inaequale fit.

§. 731.

Neque tamen ex his solis causis oedema excitatur, sed fere frequentius id a vitiatis in corpore succis, ipsa prae caeteris lymphæ, proficiscitur. Quibus enim malus corporis habitus ex ictero, empyemate, magna suppuratione, malis et chronicis ulceribus, ipsa etiam phthisi, est, iis hoc tumoris genus frequentius nasci solet. Id etiam fieri potest, si corpus longo morbo viti-

vitiatum est, vel malis ac intempestiuis medicamentis, quae aduersus febres, scabiem, aliasque valetudines, quandoque adhibentur, affectum; vel nimia sanguinis profusione aliisque euacuantibus infirmatum et exhaustum, quod vltimum in febribus acutis accidit, si nimium sanguinis detrahitur, et ob id illa rubicundior sanguinis portio deficit, quae ad praeparandos perficiendosque omnes vitales succos adeo necessaria est. Etiam cacochymia, et tandem cachexia, cum oedemate oritur, vbi aliquis per longum tempus intemperantius, tum esca, tum potione, vsus est, et inusitados ac inutiles cibos assumpsit, se quotidie ardente spiritu, vel similibus liquoribus, quibus lymphæ cogitur, nec non multa crudaque aqua iniurgitauit, et quem quotidianus moeror lacerauit atque confecit. Etiam his tumoribus prae caeteris obnoxius erit, qui corpus ignauia nimioque somno hebetat, nec non is, qui mox post cibum intemperanter lucubrare consuevit, cui nocturno humore ac palustri coelo grauato inuisibilis exspiratio per cutim cohibetur, et cui vrina naturaliter non redditur. Foeminis, quibus sanguis per menstrua non respondet, et viris, quibus haemorrhoides, sanguinem fundere solitae, subito suppressae sunt, haec inflatio contingere solet. Corpus etiam intumescere potest, si illud vim acriorum frigorum hiememque perfrigidam, qua humores coguntur vasaque rumpuntur, sustinuit.

§. 732.

Est vero quaedam differentia. Tumor, qui, digito pressus, mox iterum consurgit, significat, humorem suis adhuc receptaculis vasisque lymphaticis contineri, si autem tumor mollior est, et qui digito pressus cedit, ita, vt circumfluens etiam humor id, quod non premitur, attollat, et sinus impressus diu maneat, is

ostendit, rupta esse illa receptacula, et humorem in adipis cellulas esse emissum, qui casus multo asperior est. Pessimum vero genus est, vbi, ruptis iisdem, aqua vel in caput, pectus, vel in abdomen contrahitur, in quibus ita mouetur, vt eius impetus sentiri possit.

§. 733.

Hi autem tumores, quorum omnium communis est nimia humoris abundantia, variis nominibus discernuntur, quae a diuersis sedibus, quas infestant, trahere consueuerunt. Intumescunt frequentius pedes, cum ab his sanguis per venas difficilius consurgat, quibus tumoribus verum, et quasi proprium, nomen oedematum est. Si tumor per totum corpus enascitur λευκοφλεγματία, et, si magis adoleuit, ανάσαρκα vocatur. Si caput intumescit, oritur υδροκέφαλον externum, si in caput interius aqua contracta est, υδροκέφαλον internum, si in oculum, υδροφθαλμία, si in pectus hydrops pectoris, si in imum ventrem, ασκίτης. Si in umbilico humor consistit, υδρομόφαλον oritur, si autem is sub scroto confluit, et ei sedes est inter illas tunicas, quibus testes comprehenduntur, vitium υδροκήλην appellant. Ab hoc differt tumor, qui oritur, si ipsius scroti tunica cellulosa simili colluie tumet.

† Si humor in articulis, genu praecipue haeret, *hydrarthron*, Germ. *Gliedschamm* dicitur.

†† Si ab accumulatis humoribus tumor durior est, vocatur *Oedema scirrhusum*; si erysipelas accedit, *Oedema erysipelatos* est, quod non raro in gangraenam lentam ac deinde in sphacelum abit. Saepe quoque vlcera sunt, difficilioris curationis.

§. 734.

Multum etiam interest inter oedema, quod per se inceptit, et inter illud, quod alteri vetusto ac graui et ancipiti morbo superuenit. Oedema enim, quod per

per se incepit, et quod a causis variis accidentibus, non ita malis, ortum est, saepe per se, et sine curatione, finitur. Ergo in iis, qui, grauem sanguinis profusionem passi, conualescunt, nec non in grauidis, postquam pepererunt, sine negotio id dissipatur. Difficilius autem tollitur, si cum alio graui diuturnoque morbo, cacoehymia, cachexia, phthisi, tabe, aliis hydropis generibus, longis et magnis suppurationibus est. Nec enim tuto tolli potest hoc posterius oedematis genus, nisi curato prius eo morbo, e quo id enatum fuit. Si enim morbus depelli non potest, etiam hi tumores nullam curationem recipiunt, qui potius, si phthisis et tabes aegris superueniunt, mortis propinquae indices esse solent. Oedema, quod ex febre quartana male curata relictum est, tollitur, si febris reuertitur. Si scabies medicamentis extrinsecus adhibitis prohibita, et ex hac curatione ortum fuit oedema, optimum etiam est, illam reuocari. Qui arthritidi externis mederi volunt, iis crebrius tumor manet nulla arte discutiendus. Facilius tollitur oedema in iunioribus, quam senibus, et melius aestate, quam hyeme. Saepe id, cuius inter initia non difficillima curatio est, si inueterauit, non sine magna mole discutitur. Si vulneribus accidit, pus prohibetur. Nunquam enim oedema ad bonam suppurationem spectat, sed in eo, si id emollientibus curatur, fiunt mala vlcera et gangraena.

§. 735.

Curandi vero ratio ex cognitis praecipue causis ducenda est, ad quas is, qui curaturus est, semper respicere debet. Illud, quod a causis, quae extrinsecus accidunt, excitatum fuit, non aliis auxiliis eget, quam, quae ipsi tumori superdari solent. Ne pedes, compressis venis, intumescant, prohibetur fascia, vel illo

tibialis genere, quod alias (168) laudaui. Hoc etiam vtilissimum et valde opportunum iis est, quibus pedes post magnam inflammationem, erysipelas, vlcera curata, intumuerunt. Neceffe enim est, laxiorem cutim hac fascia, non nimium, tamen vehementer, adstringere.

† Pedom oedemate affectus abstineat a statione, sedeat sic, vt crura aut prorsus aut paene situm seruent horizonti parallelum, vel et elatiorem. Constrictio moderata artuum non his modo, de quibus PLATNERVS dixit, sed etiam aliis prodest, dummodo datis medicamentis idoneis sanguis eiusque riuuli ita immutati sint, vt excretioni per renes non resistant. Nam tum diuresin per medicamina mouendam efficaciter eo promouent fasciae, quod reorptionem iuuant.

§. 736.

Iis, quos Anasarca male habet, si ea ex frigore orta fuit, incidenda cutis est, super talum, satis altis plagis, quo per plures dies frequens humor feratur. Adiiciendae vero sunt exercitationes, et praecipue, fricationes totius corporis cum pannis suffitis, idoneusque victus, quibus omnibus corpus, effusa aqua, duratur, donec id ad pristinum statum reuertit.

§. 737.

Quibus aqua in pectus, vel abdomen, contracta est, et viscera adfecta sunt, iis haec curandi ratio leuamen saepe adfert, vt morbus hominem, qui sine summa difficultate spirare non poterat, emissa sic aqua, diu, et aliquando per vnum alterumque annum, trahere possit. Saepe humor eadem ratione per vlcera exit, quae per se, etiam in pedibus, oriri solent. In his vero casibus ea diligentia adhibenda est, ne vlcera putrescendo intendantur, et ne iis gangraena superueniat. Igitur, si vlcera serpere videntur, imponi potest aqua vulneraria, addita, si id res postulat, essentia succini. Si vero iam nigrities est, eaque serpendo in-

increfcit, putre lenius exeft aqua phagedaenica. Solent vero haec vlcera aliquando pura effe, aft cum intolcrabili dolore ac pruritu. Tum vero omnia, quae reprimunt et putrem carnem exedunt, aliena funt, imponi debent linamenta ficca, quae crebrius mutari oportet, ne iis, qui humorem bibunt, vlcera magis exafperentur. Virgente dolore, etiam quaedam paregorica imponere licet.

§. 738.

Si os fractum eft, et membro oedema accedit, ita fuperdandi accommodandique panni ac ferulae funt, ne vena prematur. Vulneris oedemate affecti orae concidendae funt, imponenda vero, quae efficaciora funt ad pus mouendum, fuperdatis etiam difcutientibus ex vino meraciori coctis.

† Oedema, quod vulnera comitatur, aut a malo corporis habitu, aut nimia curatione refrigerante oriri folet. Si prior cauffa fubeft, non eadem curandi ratio prodeffe potest. Plerumque tamen cortex chinae cum aromaticis intus fumi debet. Extrinsecus vero oedematofum tumorem cataplafma ex eodem cortice vel abfinthio et oxymelite paratum, frigidum quidem, difcutit.

§. 739.

Oedema autem, quod a vitiata lymphâ enafcitur, tollitur aliis auxiliis, quae, cum Medici doceant, ab iis requirenda funt. Si vifcera nondum affecta funt, opem inter alia fert fquilla, quae, vel cum nitro trita, vel ex vino cocta, dari potest. In hoc etiam cafu proficiunt thermae Carolinae, quibus humor attenuatur et ex corpore eliminatur. Si is in foemina eft, cui menftrua non proueniunt, vel in viro, cui haemorrhoides fuppreffae funt, falutares illae excretionēs revocari debent. Si febrem, praecipue quartanam, medicamenta subito et intempeftive data fufculerunt, illa reducenda eft, id quod optime fit, fi purgantibus, refoluentibusque permixtis, fuperinfunditur vinum, et

huius quotidie cyathus fumitur. Vtiles etiam sunt Becheri pilulae per plures dies deuorandae.

§. 740.

Victus vero necessarius est siccus, sine iurulentis, panis candidus siccus, seu bis coctus, carnes assae, aromate, zingibere potissimum, conditae. Prohiberi debet aeger ab omni potione, quae sitim extinguit, et dari vinum paucum, aut meracius. Praecipue haec vitia longam sitim longamque patientiam desiderant, et plures, qui sibi ex toto temperare nequeunt, se in exitium praecipitant, qui, si medentium imperio obtemperassent, seruari potuissent.

† Quae de necessaria abstinencia a potu Auctor noster dicit, nuper addubitata sunt, vid. DONALD MONRO *An Essay on the Dropsy, The third Edition*, London 1775, velletius a me edita versio, item *An historical Essay on the Dropsy, by R. Wilkes*, nec non *Recherches sur les maladies chroniques etc. par Bacher*. Paris.

§. 741.

Scabies medicamentis extrinsecus admotis prohibita, si oedema relinquit, hoc curari potest, datis decoctis aliisque medicamentis sanguinem purgantibus, et pulueribus ex stibio diaphoretico et sulphure, quibus efficitur, ut scabies reuertatur

§. 742.

Post grauem sanguinis profusionem oedema victu potissimum datisque iurulentis curatur, adhibita etiam fricatione, et, quantum per vires licet, exercitatione.

§. 743.

Postquam vero ea medendi ratione illud vitium, ex quo oedema natum est, submotum fuit, veniendum etiam est ad ea, quae, extrinsecus admota, his tumoribus medentur. Aduersus eos vero omnino necessarius est calor. Sudor euocari potest, si pedes in arenam calidam, vel furfures calidos, demittuntur. Furfuribus

furibus admisceri potest rad. bryoniae, herba absinthii, fabinae, rutae, persicariae. Superhaberi etiam debent cataplasmata quae vero ficciora esse oportet, quam alias cataplasmata solent. Parari possunt ex farina volatili, herba rutae, persicariae, fabinae, agrimoniae, centaurio minori, cum aqua calcis viuae. Si tumor minui coepit et cutis laxior est, frictio atque fascia prodest (168. 735.), et superdari possunt panni ex vino rubro feruido expressi, quo lithargyrium cum gummi myrrhae, elemi, animae, fuit decoctum. Humor, qui in oedemate haeret, si is non nimis coactus est, quandoque soluitur, si sudor accenso in laconico spiritu ardente euocatur. Valentius etiam reprimunt thermae Carolinae exterius admotae. Vel, si lixiuium illud, quod post illarum thermarum euaporationem cum sale relinquitur, pediluuiis admiscetur.

† In largiori vsu lithargyrii videndum, ne alui obstructio, colica affectio fiant. Tutius roborat et reprimat solutio globulorum martis pediluuii specie adhibita.

HYDROCEPHALVM.

§. 744.

Hydrocephali duo potiora genera sunt. Nonnunquam enim cutis, qua caput contegitur, aqua intenditur, et nascitur tumor, qui ad immanem magnitudinem increfcit, et in quo, tanquam in vitro cornuque, humor per cutim apparet *. Raro aquae sedes est inter caluariam et pericranium, id quod si accidit, caput non ita intumescit, sed pressum, sicut vter repletus atque arte adstrictus, renititur.

* Hoc genus delineatum vide in RVYSCHII Thes. II. Tab. III. conf. p. 23.

§. 745.

Si autem in ipsum caput aqua contrahitur, hoc etiam, sed cum aliqua duritia, intumescit, frons extube-

tuberat, oculi torui sunt eminentes humentesque *. Nonnunquam caput tumoribus inaequale fit. Nam in mollibus ossium commissuris, praecipue in ea, quae inter occiput et bregmata est, se attollunt tumores, qui ita increfcunt, vt tandem a capite dependeant **. Crebrius autem aquae in ipsos cerebri ventriculos confluere solent.

* Vide figuram in M. A. SEVERINO de Abscessibus nouiss. obseru. Cap. IX. p. 210.

** Vide RVYSCH Obs. Anat. Chir. Obs. LII. p. 69. fig. 45.

† De hydrocephali speciebus variis docte dictum est in CHR. LVDWIGII *Dissert. de Hydropce cerebri puerorum. Lipsiae* 1774 edita. Item in MONROI l. c.

§. 746.

Si humor in interiora cerebri et huius ventriculos contrahitur, etiam dura mater et cum ea pericranium intenduntur, imo ipsa etiam cutis attollitur, vt hydrocephalum plerumque ex vtroque genere interno et externo quasi compositum sit.

§. 747.

Interno nonnunquam aliud vitium accedit, spina nimirum bifida. Si enim humor in anterioribus cerebri ventriculis increfcit, ille per aquae ductum Syluii in tertium ventriculum fertur, et ex hoc, si ei nullus exitus per infundibulum datur, per valvulam maiorem cerebri perrumpens in quartum. Tandem ex hoc is sibi vtcunque viam facit in eam vertebrarum fistulam, per quam medulla cerebro commissa descendit. Hoc in ipso partu incidere potest, in quo caput ab vteri ore valentius comprimitur *. In pueris singulae vertebrae ex tribus ossiculis constant, quae media cartilagine continentur. Cartilago vero etiam est in parte posteriori, vbi adultorum vertebrae processus exigunt, quibus a spina nomen est. Haec tenerior

car-

cartilago in pueris, et, vt videtur, etiam in nondum maturis ac in vtere haerentibus partibus, ab incrementum humore ita premitur, vt illa teneriora ac cerea officula inter se diducantur, cutis vero ab humore, qui subest, attollatur. Haec enim frequentior horum tumorum causa esse videtur **. Vtrum spina etiam findi possit, si infans in arctiori vtero ita compressus est, vt valentius tum eius coxae, tum artus inferiores, comprimantur, dubium esse videtur ***. Saepe pueris, qui cum his tumoribus nati sunt, pedes resoluti sunt incurui et in interiora obtorti. Hoc vero etiam ideo incidere potest, quia spinae medulla, vbi ex ea nerui educuntur, qui per artus inferiores pertinent, a humore pressa resoluitur. Membris vero resolutis, quia non aequabiliter crescunt, figura manet, quam forte a situ, qui eis in vtero fuit, traxerunt.

* Vid. RVYSCH Epist. problem. XII. p. 24.

** Ex hoc tumore, si is inciditur, plerumque multus et limpidus humor exit, infantes vero, eo aperto, celerius extinguuntur. Hoc vero tumoris genus ex aquarum in caput contractarum redundantia oriri, ex eo discitur, quia crebrius cum hydrocephalo esse solet. Imò experimentis cognitum est, protinus multum ex capitis tumore minutum fuisse, si lumborum tumor scalpello diuissus fuit et humor emissus. Glutinata vero iterum illa plaga, capitis tumor ad oculum increuit. Vid. IOH. CONR. BRVNNERI Obs. in Ephem. Nat. Cur. Dec. III. A. 1. Obs. 152. p. 149. seqq. Conf. etiam Dec. II. A. 2. Obs. 158. p. 363. vt plures alias, in iisdem voluminibus legendas, obseruationes omittam, ex quibus clarum est, hunc tumorem cum hydrocephalo esse. Icones dederunt TVLPIVS Obs. L. III. Cap. 30. VAN DER WIEL Cent. II. Obs. 34. RVYSCHIVS Obs. Anat. 34. 35. 36. fig. 36. 37. qui similes tumores, etiam in nucha et infima ossis sacri parte vidit. BIDLOO de osse cribroso et neruis olfactoriis laesis in Opp. p. 187. APINVS in Ephem. N. C. Dec. III. A. IX. et X. Obs. 180. et, qui eundem casum describit, CAR. FRIDER. HOECHSTETERVS in Diss. de Spina bifida, Altdorfii, MDCCIII. Plures etiam et similitum tumorum et partuum monstroforum icones conspiciuntur in TITSINGHII et VLHORNII scriptis. Conf. IOH. SALTZ-

SALTZMANNI Dissert. de tumoribus quibusdam serosis externis, Arg. MDCCXIX.

*** Magnam de hac re controuersiam inter se habuerunt duo Amstelodamenses chirurgi, ABR. TITSINGH et HENR. VLEHORN. Aliquid conferre potest situs infantis in vtero, frequentior vero huius vitii causa est aqua in caput vel in spinam contracta. Multi matris grauidae phantasiam concitatum et visa in animis earum impressa, vt solam causam, amplectuntur. Obscurarum vero et incomprehensibilium causarum quaestio tunc minimum superuacua est, vbi euidentes, et, quae explorari possunt, apparent.

§. 748.

Caput vero inflatur, si sanguis per compressas iugulares venas libere refluere nequit (729), vel etiam, si interius infundibulum aliaque lymphae itinera vt-cunque obturantur (728). Hoc autem morbi genus non, nisi in infantes incidit, in quibus, si cerebrum ab humore distenditur, calvariae ossa, molles commissuras habentia, cedere possunt, et sic totius capitis inflatio oriri. In adultis vero ex eadem occasione oritur apoplexia, vel lethargus. Atque etiam venae iugulares non raro in vtero ab umbilico constringuntur. Id quod accidere quoque solet, si collum ab vteri ore partum non emittente comprimitur. Lympha vero vitiatur, si matri malus corporis habitus est, si ea nimia auaritia plus, quam debet, et alimenta, quae mali succi sunt, crassioremque pituitam faciunt, assumit *.

* Hydrocephalum in puella XIV. annorum ortum ex illico aduersus capitis tinea vnguento, quod et arsenicum et sulphur habuit, vid. in Ephem. N. C. Cent. I. et. II. Obs. 157. p. 323. In puella IV. annorum, quae ex cunis praeceps in pauimentum data fuerat, hydrocephalum ortum, et post obitum, inciso tumore, calvaria fracta inuenta fuit. Vid. IDO WOLFII Obs. XIV. p. 47. Tumorem etiam, qui hydrocephalum mentitur, excitare pueris solent scelesti mendiculi. Vide HILDANVM Cent. III. Obs. XVIII. p. 199.

§. 748.

Hydrocephali externi, et a causis, quae extrinsecus accidere solent, orti, inter initia non difficillima curatio

tio est. Si vero morbus inueterauit, et cum malo corporis habitu est, id nullam curationem recipit. Nec hydrocephalum internum medicinam admittit.

§. 750.

Curatio a Medicis potissimum requirenda est. Vbi vero res patitur, festinanter subueniendum erit. Infantibus dari potest oxymel squilliticum, quod profuturum est, si vomitu multa pituita reiicitur. Purgationis causa datur radix ialappae, quae commode puliculae adiicitur, vel resina ialappae cum amygdalis contrita, nec non syrupus de spina ceruina, de scorzonerā rhabbaro, quibus crebrius et non ita multis interpositis diebus vtendum est. Mediis autem diebus cibo adiici potest radix ireos florentinae. Omnia etiam vrinam mouentia, quia humores vitiatos extenuant, vtilia sunt. Igitur dari potest aqua petroselinī, fragorum, vt et succus millepedarum syluestrium, qui cum vino diluitur.

† Fuere inter recentiores, qui aduersus hydrocephali species mercurio dulci vterentur. Sed fatendum est, morbum hunc plerumque curationi vel optimae resistere.

§. 771.

Moderandum vero inter haec est, vt vires conseruentur. Cibum dare oportet sine pinguibus, glutinosis, infantibus et acescentibus. Optima sunt iura carniū cum pane sicco candido, et cereuisia, quae multum lupuli habet. Potioni etiam idoneum est decoctum ligni sancti. Sitis vero ante reliqua necessaria est.

§. 752.

Vbi autem tumor minui coepit, quotidie aliquoties vtendum est fricatione cum linteis calidis suffitisque. Possunt etiam radix ireos florentinae, bryoniae, herba absinthii, rutae, maioranae, serpilli, pulegii,
roris

roris marini ex vino rubro austero coqui et panni ex decocto expressi capiti superhaberi. Sub finem his adiici possunt alia, quae reprimunt, et inter haec radix tormentillae, bistortae, herba alchimillae, millefolii. Multi haec ex lixiuio sulphuris coquunt, quod vero vix ita tutum esse videtur. Cutim etiam flaccescentem optime adstringit et caluariae ossa adducit illa fascia, quae, in duos fines glomerata, caput arctius comprehendit, *la Capeline*.

§. 753.

Quod si tumor his non discutitur, adhibenda etiam est scalpelli opera. Occipitium conciditur, vel ferro candente aduritur. Magis fere opportunum est, per perforatam cutim, ne illa nimis celeriter coeat, linum multiplex, et ita tortum, ut vnitas sit, traicere, et bis per diem ducere, quo per plagam et aqua effluat et pus moueatur. Videndum vero, ne gangraena vlcus occupet, et ne ea cum periculo serpat.

HYDROPTHALMIA.

§. 754.

Hydrophthalmia oritur, si in oculo venulae limpida humorem absorbentes obturatae sunt. Oculus intumescit, cum aliquo etiam dolore, adeo, ut is palpebris operiri nequeat. Id vero ex variis causis fieri potest, plerumque vero ex grauiori ictu, et si medicamenta reprimentia diu superhabita fuerunt. Perforandus est oculus acu, scalpello ancipiti, vel alio ferramento, quod fistulam habet ei similem, per quam hydropicis aqua ex ventre emittitur (*Troisquarts*). Illud vero ferramentum, quod scleroticam vucamque transire debet, ei loco admouendum demittendumque est, per quem acus traicitur, si ea suffusio curatur.

Est

Est vero is inter corneam et angulum tempori propiorem fere medius, corneae tamen paulo propinquior et aliquantum inferior. Aqua educitur, et, ubi oculus defedit, inter palpebras demitti potest vesicae frustulum cum quodam vnguento (323), cui axungiam viperarum adiacere licet. Exterius autem oportet oculum paulo valentius comprimere, vel impossitis pluribus pannis et fascia, vel ferramento, quod alias proposui Fig. XIII. (589). Necessè vero est, etiam percurato vulnere, oculum diu sic deligatum contineri, ne tumor reuertatur. Cum his dari debent medicamenta vrinam mouentia, praecipue succus millepedarum sylvestrium cum meraciori vino, nec non potiones et iuscula viperarum.

† Morbus ab Auctore nostro descriptus dicitur Hydrophthalmia vera. Sed est quoque Hydrophthalmia notha, non vnius generis sed trium. Aut enim saccus hydropicus in adnata tunica aut in cornea formatus est, aut inter bulbum oculi et orbitam hydatis quaedam genita est, quae oculi bulbum vrget et foras trudit. De his omnibus legatur DONALD MONRO in *Essay on the Dropsy*, praecipue eius versio teutonica a me edita; in appendice enim obseruationum quaedam abs me addita sunt. Lestum quoque digna est CARTHEUSERI *Dissertatio de Hydrophthalmia*, Francof. ad Viadrum edita.

PARACENTESIS.

§. 755.

Quibus venter ex aqua intenditur, his ea nonnunquam inter peritoneum atque abdominis musculos haeret. Hoc genus plus doloris habet, non vero ita malus corporis habitus est, ac in ascite. Foeminis saepe intumescunt ouaria, cui vitio ascites superuenire solet *. Crebrius autem multa aqua in ventrem contrahitur, cui hydropis generi nomen ascites est. Huic quandoque mederi licet, si aqua emittitur.

B b

Non

Non vero omnes in hoc morbo sic curari possunt, sed robusti, qui febre ex toto carent. Nam, quibus iecur et alia viscera affecta sunt, et malus corporis habitus corruptusque stomachus est, illi idonei huic curationi non sunt, quae saepe mortem maturare consuevit. Id quod praecipue accidit, si vlcus qua parte est, quod, accedente per factam plagam aere, exasperatur. Non nunquam tamen, si tumor adeo increuit, vt periculum sit, ne, cohibito omni diaphragmatis motu, aeger ex toto stranguletur, ea aliquod leuamen misero afferre potest. Neque enim in robustis ascites hac, chirurgia sola euincitur. Nam emissus humor non morbum tollit, sed medicinae locum facit, quam is, intus inclusus, impedit.

* Vid. Diss. IVSTI THEODORI SCHORKOPFF de Hydropse Ovarii muliebris, *Basil. MDCLXXXV.* ADAMI BRENDELII de Hydropse ovariorum muliebrium, *Viteb. MDCCI. 10H.* HVLDRICI PEYERI de Ouario hydropico in Cadauere Virgineo reperto, *Basil. MDCCXIX.* POLYCARPI GOTTLIEB SCHACHERI de Virgine ascitica post paracentesin purpura maligna extincta, *Lipsiae, MDCCXXV.* et NICOLAI WILLII de stupendo abdominis tumore, *Basil. MDCCXXXI.*

§. 756.

Hanc vero chirurgiam antecedere exercitatio debet. Imbecillis ambulatio, gestatio, clara lectio, pro exercitatione est. Omitti autem curatio debet, si homo crebrius tussit. Metus enim est, ne, aqua emissâ, sub tussi spiritus deficiat. Curatio ita ordinatur: aeger supinus in lectulo cubat, ita, vt in illud latus, quod perforandum est, inclinatus sit. Ferramentum, quod in ventrem demittitur, fistulam habet argenteam, ex qua illud, quod acutum est, educitur, haec autem relinquitur, vt per eam humor effundatur. Praeferri debet ferramentum, quod non nimis tenue, sed paulo plenius est. Perforari autem solet locus, qui medius est inter umbilicum et spinam supremam ossis

offis ilei. Violari enim haud debent musculus rectus, cui subiecta arteria epigastrica est, et qui valida nervosaeque aponeurosi continetur, nec etiam linea alba, nec ille tendo, qui inter obliquos rectosque conspiciatur. Cura etiam habenda, ne ferramento qua vena incidatur, quae plerumque obscuro sanguine refertae fatis conspicuae sunt. Ferramentum, dum illud cuti admouetur, paululum superiora versus inclinari debet, dum vero illud traicitur, illud leniter verti et ita deduci debet, ut inferiori parti magis insadat.

§. 757.

Multi curationem diuidunt et non omnem humorem effundunt, sed fistulam in vulnere relinquunt, quam demisso linteolo claudunt. Docuit enim experientia, eos, quibus omnis aqua effunditur, praecipue, si eius maior vis est, nonnunquam sub ipso opere animae defectione mori. Hoc vero auertitur, si, dum aqua effluit, venter fascia adstringitur. Deficit enim aeger, quia spiritum trahere non potest, cum effuso humore abdominis muscoli multum laxati viscera premere non possint et diaphragmatis motum iuvare. Arteriae etiam et venae maiores, quae per abdomen descendunt, aquis valentius pressae, etiam dilatantur, quibus omnibus impeditur respiratio humorumque circuitus. Nullus vero metus est, si corpus circumdato vinculo constringitur *. Si vero tamen aegri imbecillitas prohibet, quo minus omnis aqua euocari possit, protinus etiam fistula recipienda et super vulnus linamenta ex aqua vulneraria expressa deliganda sunt. Postero vero die iterum ferramentum per alium locum cum fistula demitti, et, si quid humoris superest, euocari potest. Nihil enim magis pestiferum est, quam, si per fistulam ad interiora perlabitur aer, qui visceribus novus est et noxius. Fascia

etiam diu post curationem vtendum, et simul adhibenda frictio est, cum linteis suffitis. Quod curationis reliquum est, a medicis docetur.

* Vid. IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Mechanismo muscutorum abdominalium, Halae MDCCXXXVI. §. 24. p. 20.

** Peculiare ligamen descripsit et figura expressit ALEXANDER MONRO in the Medical Essays Vol. I. p. 214.

† Ligamen istud postea in MONROI Operibus britannica lingua editis, et ex his in eiusdem viri Operibus teutonice versis descriptum est delineatumque. Vid. ALEX. MONRO, des Aeltern, sämtliche Werke, praktischen und chirurgischen Inhalts. Leipzig 1782. Nemo nostratum hactenus, quod sciam, ligamine illo MONROI vsus est, neque tamen unquam causam habuere id desiderandi. Et sane si homo adhibetur, cui sat largae longaeque manus sunt, quibus passis omnis regio abdominis comprimatur, ligamine eo facile caremus.

†† Sunt quaedam aliae animaduersiones necessariae. Primo enim de praesentia aquarum certo persuasi esse debemus. Eam autem vt cuique notum est, demonstrat, sic dicta fluctuatio aquarum. Sed fit aliquando, vt aut hepar aut lien, tumore insigni turgeat, atque fluctuatio in alterutro latere minus evidens sit, tumorque is altius descendens perpunctionem in latere affecto frustret. Chirurgus igitur explorans abdomen ne contentus sit vnius lateris percussione illa omnibus nota, sed animum attendat, vt, sitne in utroque latere fluctuatio aquarum eadem an in alterutro euidentior, intelligat. Si utrobique eadem esse videtur, parum interest, quo latere fiat punctio; sin in altero latere obscurior, in altero euidentior ea est, in eo fiat illa, vbi euidentior est. Punctio autem audacter fiat, maxime in obesioribus, alioquin enim cannula non satis ad interiora protrusa obturatur adipe ita, vt aquarum effluxus cohibeatur. Interdum quoque humor spissus est adeo, vt is per cannulam, non admodum amplam, transire nequeat. Huius rei suspicionem suggerit lenta humoris congestio atque debiliior fluctuatio. Quo casu fistula amplior et acus triquetra plenior adhibenda est. Fistula quoque exteriori parte, habeat fulcum, vt, si ne sic quidem factum foramen sufficiat, id postea scalpello commode tutoque ampliari possit.

Neque ignorare decet, aquas aliquando non libere in imo ventre solumque peritonaeo moueri et contineri, sed faccis concludi. Quae res non modo perpunctionem emissionemque aquarum difficiliorem reddit et impedit, sed et nouum affluxum aquarum eiusdemque sacci impletionem

nem efficit, maxime si non vnus faccus, sed plures sunt. Hoc morbi genus subesse verosimile est, si cum tumore ventris vomitus est, si flatulentia, si alui obstructio, si dolores per ventrem, si vmbilicus non prominet, si aegrotus in conuersione corporis in alterum latus sensum intus habet prouoluti ponderis cuiusdam, si abdomen non in vtroque latere aequaliter turgidum est tumidumque. Volunt tum quidem nonnulli abdomen incidendo latius aperiri, et faccum suppuratione destrui. De his vid. LE DRAN *Consultations*. DE HAEN *Ratio medendi*, T. III. T. V. *Comment. Acad. Chirurg. Paris*. T. II. Nec defuerunt, qui in vero ascite, h. e. non faccato, post emissionem aquarum liquores varios iniici vellent. Verum euentus bonae voluntati non respondit. Vid. *Transact. Britannor.*

TVMORES, QVI TVNICA SVA INCLVDVNTVR.

§. 758.

In capite, palpebris, et qualibet fere sede corporis, oriuntur tubercula et tumores, qui a paruulo incipiunt et diu paulatim crescunt. Fere sine dolore sunt suaeque tunica includuntur. Sedem habent in tunica adiposa et cellulosa, quare non rarum est, illos etiam in interioribus sedibus ac visceribus oriri.

§. 759.

Habent differentias, sed mediocres, quare variis vocabulis discernuntur, non tamen diuerso genere curantur. Tumorem enim mollem ac cedentem, in quo humor liquidior, cerae ac melli similis, est, et qui pressu circumfluit, *μελικτην* nominant. Si tumori duro ac renitenti humor subest, magis concretus et puliculae similis, imo aliquando durior, *ἀθήρωμα* vocatur. *Στεατώματα* vero dicuntur, quibus pingue quiddam subest, ita, vt cutis etiam super eam materiam labare videatur.

B b 3

§. 760.

§. 760.

Quandoque etiam in his tumoribus alia esse confueuerunt. Reperiuntur in iis vesicae humore liquidiore, qui igne cogitur, plenae, quas *υδαριδας* nominare solent. Interdum in velamento vera pinguedo est. Nonnunquam idem tumor pulticulae similem ac concretum humorem et pingue continet, seu ex duplici genere, atheromate et steatomate, compositus est*. Inuenta etiam fuerunt quandoque quaedam aliena, conferti pili, lapilli, crines, ossa et alia**.

* Insignem huius generis tumorem aliquando vidi in iuvene sedecim circiter annorum. Is in scapula ortus fuerat, quantum ego resciscere potui, ex tineae, quae medicamentis extrinsecus admotis prohibita fuerat. Tumor, quem ab initio varia medicatione tentauerant, cum ad pugni circiter magnitudinem increuisset, et sine negotio tolli potuisset, committitur curationi agrestis et temerarii empirici. Hic, tumorem, quem sine dubio pro abscessu habuit, emolliendum esse, dixit, et per sat multum tempus lardum superimposuit. Cum vero interea tumor ad immanem magnitudinem excreuisset, is monet, iam tempus esse tumorem aperiendi. Ergo in inferiorem tumoris partem demittit cultrum maiorem, quo educto, magna sanguinis profusio orta est, quae etiam ipsum illum nebulonem perterruit. Sanguis tandem conquieuit, et ego accersor. Inuenio hominem sanguinis profusione infirmatum et tumorem immanis magnitudinis, qui non solum scapulam, sed totum fere tergum occupabat. Non difficile erat praedicere, omnem curationem superuacuam futuram esse, et miserum hominem, cum is ab initio perperam curatus fuerit, iam seruari non posse. Aliorum curae traditus post aliquod tempus exinanito corpore obiit. Cum vero locus, quem is incolerat, aliquot millia passuum a nostra vrbe abesset, missus mihi tumor fuit a corpore resectus. Quanquam ex hoc omnis fere humor expressus erat, ille nihilominus pondus habuit vndecim librarum. Inferius humor concretus erat verumque atheroma, supra hanc vero materiam, et sub cute, erat alia, ad crassitiem quatuor circiter digitorum, seuo duriori simillima.

** Vide inter alia RVYSCHIVM de Atheromate ventriculi Aduers. Anat. Decad. III. p. 1. et POLYCARPI GOTTLIEB SCHACHERI Programma de atheromate pilis referto in ouario MDCCXXXV.

§. 761.

Enascuntur hi tumores, si receptacula, lymphae aliisque succis accommodata, intumescunt. Hoc vero accidit, si humor ex varia occasione in iis cogitur ac coaceruatur, qui ideo venis non potest resorberi. A vero propius est, atheromatis et hydatidis sedem esse potissimum in venis lymphaticis, quas valuulis suis distinctas esse nouimus, nec non in glandulis, quae sub cute sunt, et quas, ubi corpus frigore inhorret, oculis distinguere licet. Meliceris esse videtur in glandulis, quas Anatomici sebaceas nominant. Steatotate autem adipis cellulae occupantur. Nemo vero ignorat, cellularum oleo plenarum contextum in omnibus fere visceribus ac sedibus corporis esse, in quibus etiam hoc tumorum genus oriri quandoque solet. Venae enim lymphaticae et receptacula, glandularumque tunicae, si ab humore intus contento premuntur ac distenduntur, formant illud velamentum, quo concretus humor includitur. Et, quia compressas venas sanguis non permanere potest, illa materia indies augetur, et tunica, seu velamentum, crassescit, et ipsae venae, quae per interiora tumoris discurrent, non parum ampliantur. Arteriae autem, quae sanguinem adferunt, quod in confiniis comprimuntur, plerumque exiles sunt.

† Tumores tunicati in capite orti plerumque ad genus meliceridum pertinent, vocanturque *Testudines*, *Talpae*, *Lupiae*. Fere nostris temporibus in foeminis frequentius quam olim reperiuntur; cuius frequentiae, causa atque ratio repetenda videtur ab illo calamistratae et cothurnatae comae ornatu, qui, ut stabilis sit, acubus longis et axungia indiget. Praeterea tritici farina seu amyllum inspersum veluti cumulus humanae stultitiae additur. Nam sic et pungitur subinde cutis, et pori cutanei obstruuntur, perspiratio cutanea supprimitur.

§. 762.

Non difficile est hos tumores ab alio tumorum genere, aneurysmate, abscessu, scirrho et oedemate, distinguere. Nec enim dolor calorque, nec arteriarum ictus, vel pulsus, in his percipiuntur. Nonnunquam tamen etiam ad suppurationem spectant, et, rupta cute, humor, qui intus coïuerat, effluit. Nisi vero illa tunica a cute et subiecta carne separetur et tota eiiciatur, id quod, vel manu, vel medicamentis, fieri potest, vlcus haud sanescit, sed, putri carne excrecente, oritur sarcoma, seu fungus, totumque vlcus inaequale fit, et in verum carcinoma vertitur.

§. 763.

Steatoma interdum quasi loculamenta habet, in quibus, si id, vel per se, vel scalpello, apertum est, humor, accedente aere putrescit, et tunicas exest. Quare non raro tumor intus et in medio cauus fit, sub cute vero et circum circa multum increfcit.

§. 764.

Oriri solent hi tumores, si vitales corporis fucci vitiiati sunt. Quare saepe nascuntur, si scabies, tinea, varia exulcerationum genera, reprimentibus fuere prohibita. Interdum autem oriri videntur, si illa receptacula violantur, comprimuntur, illatoque ictu laeduntur. Etiam ex iisdem occasionibus, ex quibus scirrhos fieri supra relatum est (256. 257.) quandoque hi tumores fiunt.

§. 765.

Tumor, qui recens est, nec durus, nec magnus, quandoque resoluitur. Superhaberi debet emplastrum, diachylon simplex, diachylon compositum, emplastro diaphoretico mixtum, nec non galbanum, quod,
aceto

aceto solutum, super cutem iniicitur, et ei superdatur tegula, vel pannus calidus. Sunt, qui vaporem ex aceto, vrina et sale ammoniaco extollunt. Cataplasmata, cum fibras multum laxare soleant, hic aliena sunt. Nunquam enim, neque his, neque aliis, medicamentis efficiendum est, vt per se tumor aperiatur. Nam, quia illud velamentum non abscedit, metus subest, ne ex hac vitiata caro increseat et sarcoma oriatur (762).

† G. galbanum et G. ammoniacum, si iis vti velis, etiam satis commode ouorum vitello soluuntur.

§. 766.

Si tamen tumor quacunq[ue] ratione apertus est, et humor effusus fuit, protinus etiam eicienda illa tunica est. Optimum est, illam a cute et subiecta carne scalpello separari. Hoc vero cum saepe difficile sit, vtendum est medicamentis, quibus velamentum illud eroditur. Validioribus vero opus est. Si enim non alia, quam pus mouentia, intus in folliculum iniiciuntur, timor est, ne hebes putrisque caro increseat (762). Si aliquid ex tunica relinquitur, vel idem accidit, vel, si vlcus sanescit, tumor breui tempore reuertitur. Inter medicamenta vero prae caeteris idoneus est lapis infernalis, nec non spiritus salis ammoniaci cum calce viua. Haec velamento illi admoueri debent, admotis subinde etiam aliis digerentibus. Vbi consumptum omne alienum est, vulnus glutinatur. Si tunica durior est, expedit, illam prius scalpello concidere, et post superdare medicamenta. Spiritus salis ammoniaci admouetur vel penicillo, vel specillo, quod lana inuolutum in eum demittitur.

† Si acribus erodentibus adhibitis destruere velamentum vel totum vel partem velis, locus non saepius vexandus est, sed paulo liberalius semel vel bis illis vtendum est.

§. 767.

Expeditissimum vero est, hos tumores excindere. Plaga recta fit in cute, ita, vt velamentum, quo illa materia comprehenditur, haud violetur. Si tumor maior est, plaga duabus transuersis lineis, quae litterae X figuram accipiunt, incidi debet. Iam vero tumor, scalpelli manubrio, vel digitis, deducendus est a cute et integris partibus, et sic totus, excutiendus. Vbi tamen nimium adhaeret, scalpellum admoueri potest, semper vero videndum, ne aliquid ex tunica relinquatur, et ne, velamento inciso, concretus humor effluat. Si cutis iam affecta est et occalluit, illam etiam, si res postulat, latius praecidere oportet. Vulnus vero prius implendum, post glutinandum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

† Efficacior haec medendi ratio parum aut vix differt ab ea, quae supra proposita est, vbi sermo erat de curatione scirrhorum. Ne igitur actum agam, lectorem ad locum eum remitto, et nonnisi hoc addo; steatomatum et atheomatum tunica plerumque facile extrahitur, si tumor incisione, paulo quam tumor est, longiori aperitur et materies antea extrahitur.

§. 768.

Raro sanguis cum periculo fluit, si tumor ita velando excutitur, cum arteriae, quae tumori alimentum subministrant, ab huius mole comprimantur arctenturque. Venae autem plerumque maiores esse solent. Si vero maiores arteriae atque venae tumori subiectae, vel glandulae, prope sunt, et illae iam intumuerunt, si aegrum, vel febris, vel tabes, male habet, et si fluens alius eum exercet, haec chirurgia, et praecipue scalpellum, sine pernicie adhiberi nequit.

§. 769.

Vbi autem iam hebes putrisque caro cutim supercreuit eaque cum exulceratione mucosa atque cum
foe-

foetore inaequaliter tumet, fungum appellare confueuerunt, cuius facilis transitus in carcinoma est. Hoc vitium difficilem curationem habet. Plerumque enim, si etiam scalpello exciditur, post inductam cicatricem tamen reuertit, et non raro causam mortis adfert. Si tamen spes est, illum excindi sine periculo posse, incidenda circum circa in orbem cutis est, et tumor vellendo subsecandoque tollendus. Plerumque tamen is altiores quasi radices egit, et valentius inhaeret, vel tendini, vel alii neruosaë parti. Et hanc, altius etiam demisso scalpello, atque plaga maiori transuersa, incidi, tendines etiam praecidi, necessarium est. Nisi enim hoc fiat, tumorem reuerti experientia docuit.

X A Λ A Z I O N.

§. 770.

Non rarum est, tumores his non ab similes in palpebris nasci, qui, si maior iis durities est, χαλάζια vocantur. Nec alia ratione illi exciduntur, ea tamen adhibita differentia, vt, si sub cute sunt, ab exteriori, si sub interiori palpebrae membrana, ab interiori, parte id fiat. Videndum, ne transuersim incidatur ille musculus, quo superior palpebra attollitur (581), quare haec plagam rectam, a summa orbitae parte cartilagineam versus descendente, desiderat. Si accidit, vt aliquid ex tunica relictum fuerit, admoneri debent adurentia (766), vbi tamen multa diligentia adhibenda est, ne acrioribus oculis offendatur, quem prius lenibus medicamentis inungere oportet.

† Tumores tunica inclusi non adeo magni illi, in palpebris nati in timidulis hominibus interdum sine scalpelli opera tolli possunt. Imponendum emplastrum vel malacticum vel diachylon cum gummatibus, cui aliquid pulueris cantharidum admixtum est. Si post aliquot dierum spatium tumor inflammatus, dolentior, et paulo maior est, aliud em-

emplastrum tenacius adhaerens imponatur. Id autem ex resina seu pice alba et therebinthina componitur adiecta etiam aliqua parte cantharidum. Sub hoc emplastro suppuratio mouetur, eoque post dies duos detracto aut sponte ruptus erit, vel facile lanceola aperietur, et materies exprimitur. Cauum deinde sphaerula vel ex linteis carptis vel ex emplastro formata impletur. Altero die nisi ad extractionem paratum videatur velamentum, similis sphaerula emplastri malleolici puluere cantharidum vel praecipitati rubri conspersa in cauum detur. Ita sequenti die velamentum adhibita vossella extrahi poterit. Quae ratio et in aliarum partium tumoribus tunicatis locum habet.

ΠΑΛΑΔΑΡΟΤΗΣ.

§. 771.

Παλαδαρότης vocatur tumor mollis, fungo similis, qui in palpebra interiori nascitur *. Is forfice praeciditur, sedes scalpello conciditur, et in oculum demittitur vnguentum de tutia cum frustulo vesicae tenerioris.

* In Introductione, quae vulgo tribuitur GALENO Cap. XVI. T. II. p. 390.

G A N G L I O N.

§. 772.

Non adeo absimilis est alius tumor durus et renitens, qui etiam sine inflammatione ac dolore est, et praecipue musculorum tendinibus insidet, quem γάγγλιον nominare solent. In tumore, qui recens est, humor esse solet ex coacta lymphā albidus, imo pellucidus, oui albo fere similis. Si vero ganglion malis medicamentis affectum adeo increuit, ut id rumpatur, humor, qui etiam quasi loculamentis continetur, accedente aere corrumpitur et in acrem foetidamque sanie, minime autem in pus, conuertitur.

§. 773.

§. 773.

Sedes est in tendinibus, praecipue in tendine musculi sublimis, s. perforati, digitorum, aliquando etiam in tendine extensoris communis. Oriri videtur, si humor, qui, axungiae instar, tendines horumque vaginas lubricat, super tendines, vel etiam inter hunc atque eius vaginam concrefcit. Id vero incidere solet, si musculi validiori actione et nixu multum adducuntur, vel nimium intenduntur *, et illa humorum pelucidorum receptacula rumpuntur.

* Haud ita pridem ganglion insolitae magnitudinis vidi, quod, cum curationem recipere non posset, bonum honestumque virum interemit. Is ante plures annos, cum ex rheda defiliret, ea sede, qua magnus et vulgo dictus Achilleus tendo est, sentit acutum dolorem, qui tamen breui se iterum remisit. Post vnum alterumque annum tumor enascitur sub eo tendine inter hunc et duo cruris ossa. Tumor enim, quem medium tendo comprimebat, vtrinque quasi extuberrare coepit, qui vero ab initio gressum haud prohibuit. Eo tempore is mihi tumorem ostendit, vbi ego, praeuidens, eum adeo increuisse, vt medicamentis discuti haud possit, scalpellum vero his reconditis et nervosis locis sine periculo vix adhiberi posset, prohibui eum attingere. Interea cum eximius nostrae aetatis chirurgus opportune nostram urbem adueniret, et is in consilium vocatus fuit, qui vero scalpellum admouere ausus non est. Et igitur eo iam tempore nobis non difficile erat prospicere, aliquando necessarium futurum esse, vt crus praecideretur. Aeger morae impatiens varii generis emplastra aliaque medicamenta imposuit. Adiit etiam exteros et magni nominis viros, quorum nonnullis, vt mihi postea retulit, visum fuit, materiam concretam digerendam et ad maturitatem perducendam esse, id quod mox ab initio ego dissuaseram. Tandem, vt fieri solet, bonus vir ad omnis generis remedia decurrit, quorum non pauca etiam rudes et ignorantissimi empirici, inconsideratissimae temeritatis pleni, subministraverunt. His vero omnibus tumor concitatus, adeo increvit, vt is non minor esset hominis capite. Tandem extenuata cutis madescere, et aeger febrem habere coepit, quae eum fere semper tenuit. Cum hoc denique tempore iterum ad eum, amicorum rogatu accersituque, venissem, deprehendi, illud praesidium, quod mihi semper vnicum visum fuerat, membri nimirum amputationem, iam etiam magno cum periculo esse, cum corpus iam tenuatum, imo

malis

malis succis ac febricula vitiatum esset. Illud tamen, ut vnicum, quamvis anceps, proposui. Aeger vero nunquam ad haec extrema descendere voluit. Rupta in variis locis cute, per quatuor fere menses incredibilis vis humoris acrioris et foetidioris effluxit. Tumor, liquatis et putrescentibus iis, quae intus erant, cauus factus est, ambitus vero eius multum adauctus, ut parum abesset, quin etiam is anteriora tibiae contegeret. Febre interea aucta summaque macie orta, homo tandem, diutinis malis fatigatus, extinctus fuit. Ganglion fuisse nullus dubito, cuius vero et magnitudo et sedes mihi insolitae visae sunt.

§. 774.

Ganglion, si nec multum iacruit, nec valde induruit, quandoque sine alio auxilio iterum discutitur, maxime, si id, vel digito valentius premitur, vel pugno lignoue, percutitur, et illa, qua comprehenditur, tunica rumpitur. Quo facto, oportet et locum multum fricare, et ei laminam plumbeam imponere, hancque valentius adstringere. Experiri etiam licet medicamenta, quae multi extollunt. Emplastrum diaphoreticum Mynsichti cum diachylo composito, oleum lumbricorum terrestrium, scorpionum. Tentanda haec sunt, alii vero etiam videndum, ne iis tumor, dum mollescit, multum augeatur.

† Ganglia minora non admodum dura, nec nimium vetusta, aliquando ab imposito emplastro mercuriali evanescere vidi. Spiritus quoque saponatus bis terue die vnctione et leni frictione adhibitus, noctu vero splenium eodem spiritu madens, impositum plerumque dissipant tumores eos.

§. 775.

Quod vero sic discuti haud potest, etiam oportet excindi. Et in hoc genere velamentum inuiolatum seruandum est, et eiiciendum cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen illud ab inferiore parte tendini inhaesit, magna diligentia adhibenda, ne is scalpello laedatur, quae res magnum dolorem atque inflammationem mouere potest.

† Tumor

† Tumor aut durior, aut qui haftenus adhibitis medicamentis non cessit, sine multo negotio sectione tollitur. Cutis quidem scalpello ad tunicam tumoris vsque diuidenda est, deinde detecta tunica quoque sectionem paulo longiorem quam tumor ipse est, accipit, atque sic materies contenta extrahitur. Quo facto labia vulneris futura non cruenta ad se mutuo adducta in hoc situ retinentur, balsamus aliquis vulnerarius ope linteorum imponitur, splenio et fascia ea firmantur, eademque futuris deligationibus fiunt. Sed eiecta materie festinandum est, nec committendum, vt aer diutius ad interiora admittatur.

POLYPVS NARIVM.

§. 776.

Interdum in ea membrana, qua intus nares vestitae sunt, et cui nomen a pituita est, quae in ea secerantur, nascuntur carunculae, quae maiores tandem tumores fiunt, et polypi dicuntur. Hi tumores, qui plerumque imis narium partibus inhaerent, modo ad labra tendunt, narem implent et magnam deformitatem adferunt, modo retrò feruntur per illa foramina, quibus spiritus a naribus ad fauces descendit, vbi incrementum adeo, vt postquam conspici possint et hominem tandem strangulare. Nisi aliud vitium accessit, ii fere sine dolore sunt.

§. 777.

Inter eos tamen discrimen est. Interdum enim tumor latissima radice nascitur et fit rotundus, muliebri mammae similis, quod genus nonnulli a polypo distinguunt et sarcóma vocant *. Polypus enim ab initio caruncula est infra ad membranam, cui inhaeret, tenuis, supra latior, quae, vbi incrementum, plures quasi pediculos, siue radices membranae inhaerentes, format, a quibus nomen trahit.

* Vide GLANDORPIVM de Polypo Cap. III. VILARS T. II. Art. VIII. p. 334.

† Polypus

† Polypus sic dictus non semper a pluribus vno pediculis dependet, quamvis crescens progressu temporis pluribus locis non tam concrefcens quam adglutinator esse possit.

§. 778.

Differunt etiam colore. Polypus enim modo albus est, modo subrubër. Interdum tumor, praecipue, si is a resoluta laxataque membrana ortum habet, multum increfcit, alio tempore iterum minuitur. Prius illo tempore accidere solet, quo copiosior mucus ad hanc membranam fertur.

† Alii polyporum sunt molles, rubentes et sensu praediti, quamquam non dolore molesti; *carnosos* cognominaueris. Alii duri, scirrhusi sunt et dolorem mouent. Priores vocantur *benigni*, posteriores *maligni*. Aliud genus est eorum qui albi et molles sed instar corii tenaces, *polypi pituitosi* vocantur. Atque hi praecipue modo mole augentur, modo minuuntur, pro varia tempestatum vicissitudine, multam mucositatem plerumque plorant. Ideoque a membranae pituitariae singulari emollitione et elongatione proficisci videntur. Praeterea quidam *solidi* sunt, nonnulli vero caui, hos *vesiculares* vocant. Alii tum ex rubentibus tum ex albidis facile rumpuntur, alii minus. Sedes quoque varia est. Modo in inferiori et anteriori, modo in inferiori et posteriori narium parte haerent. Quidam et ad anteriora et ad fauces porriguntur. Aliorum sedes altior est, ab ipsis sinibus frontalibus deorsum protrusi. Oriuntur alii in sinibus maxillarium ossium superiorum. Varia quoque eorum facies exterior est. Alii enim sunt *scabri*, alii *laeues*, alii *nodosi*, quidam ramos quosdam emittunt; *ramosos* dixeris.

§. 779.

Ex variis occasionibus hi tumores nascuntur. Si multus humor in nares destillat et per illam membranam (776) copiosior pituita profluit, haec laxatur, intumescit, et oritur primum illud tumoris genus, quod fere rotundum est. Accidere etiam potest, ut in ea tunica, quae plures glandulas habet, scirrhus fiat, ad quem pituita, quae calore spissatur, opportuna est. Contingit hoc, si forte nimia sanguinis profusio per nares, ad motus reprimendos, nec non adurentibus,

urentibus, vitriolo et similibus, repente fuit cohibita, et his nimis valenter materia retenta. Nonnunquam ex alio, praecipue ex venereo, morbo teneriora narium ossa ac cartilagine vitiantur, et mala vlcera fiunt, atque ozaena, quibus hebes putrisque caro increfcit.

† Si de caussis fermo habendus est, fcire licet, caussam proximam diuersarum specierum esse diuersam. Albidorum polyporum ortus repetendus est tum a relaxata elongataque membranae pituitariae parte quadam, tum vero etiam a quadam acrimonia vellicante et humores copiosiores alliciente. Illi, qui rubent, eo fieri videntur, quod vascula membranae illius paulatim in aliquo loco ampliantur, sanguine implentur, et ab aliqua acrimonia exstimulantur, sic vt luxuriantis carnis species excrescat. Priores illi fiunt in iis, quibus a crebriori et diuturniori coryza membranae Schneideri nimium emollitur laxaturque, maxime in locis insalubribus atque paludosis. Illi alteri nascuntur in iis, qui frequentiori haemorrhagia narium affecti fuere, etiam si nulla remedia externa ex acrioribus adhibita fuerint. Omnis solutio continui vel ab erodentibus vel ab acri coryza vel violentia externa facere potest maxime in praedispositis, vt vascula et fibrae luxurient. Acrimoniam acidam, quae simul spirituosa est, posse polypos narium gignere credimus, quoniam in hominibus vino et cereuicia acido-dulci abutentibus nasum externum excrescentiis turpiter affectum plus semel vidimus. Nostra aetate virus venereum saepe idoneam polyporum causam esse posse docent aliarum partium, genitalium iisque vicinarum praecipue, morbi cutanei generis simillimi. Sed quod acrimonia ea, per humores corporis diffusa, potest, idem etiam ab aliis effici posse non absurde dicitur. Haud vero parum interest, fcire morborum causas. Alia enim medendi ratio necessaria est, si malum a causa quadam locali, alia, si a vitio humorum profectum est. Luxurians autem cutis in venereis, si recens quidem hoc symptoma est, plerumque nulla medicatione externa opus habet. Vitium vetustius solis medicamentis intus assumtis raro cedit.

§. 780.

Polypus, qui, tenuibus radiculis inhaerens, mollis et sine dolore est, cui nullum aliud vitium subest, in homine caeteroquin sano tollitur. Qui vero scaber est et durus, et dolet, is fere *κακηνώδης* esse solet, et attingi non debet. Si ex polypo, vel medicamentis,

vel scalpello, curato, radícula relicta est, is renascitur. Si is ferramentis resoluitur, sanguis periculosius quandoque erumpit, cuius profusio hominem interimere potest.

† Polypi prodromi: Coryzae species aut certe opinio; narium obstructio humida tempestate; effluxus multi humoris; iactura olfactus; sternutatio, quae tamen cessant sicca tempestate, quia polypus iunior antea ab humiditate intumescens nunc siccatus concidit.

Signa benigni, facilius sanandi

- 1) Color pallidior, cinereus, brunus sed non obscure,
- 2) Vix dolens aut perraro, ac ne ad contactum quidem.
- 3) Moles humida tempestate crescens, sicca decrescens.
- 4) Mobilitas (versus anteriora) posteriora.
- 5) Mollities.
- 6) Qui plorant humorem pellucidum non mali odoris.
- 7) Qui sat alte admittunt specillum in parte sui anteriori.

Signa difficilioris curationis

- 1) Dolor vehemens in sincipite et superiori narium parte.
- 2) Color statim ab initio ruber valde (*hochroth*) vel et ex obscuro ruber.
- 3) Qui continuo crescunt sine vicissitudine incrementi et decrementi.
- 4) Qui dolent ad contactum vel fundunt sanguinem.
- 5) Qui ad tussim, sternutationem, emunctionem, in naribus vel fronte faciunt sensum ingratum.
- 6) Qui fixi sunt, nec ad emungendi conatus mouentur vel antrosum vel retrorsum.
- 7) Duri valde et a contactu dolorem in cantho interno et fronte mouentes.
- 8) Qui multum accreti sunt, sic, ut circa anteriorem partem mouere specillum nullo modo possis.
- 9) Qui subinde stillant saniem foetentem.

§. 781.

Si tumor rotundus est et a relaxata tunica ortus, adhuc mollis, nec ita magnus, expeditissimum est, illum scalpello incidere. Dum enim vulnus curatur, membrana illa cicatrice contrahitur *.

* Vid. PALFIN *Anat. Chir. P. I. p. 406.*

§. 782.

Medicamentis adurentibus non nisi illud genus curari potest, quod molle est. Nam id, quod durum est, illorum vsu carcinodes fieri consuevit. Admoueri possunt, temperata tamen manu, et demisso per fistulam medicamento, lapis infernalis, butyrum antimoni, aliaque adurentia. Ea enim diligentia adhibenda est, ne medicamentum os, vel cartilaginem, rodat, in quibus difficilis curatio esse solet.

§. 783.

Sunt, qui circa polypum nares emplastro contingunt, et radiculæ supremæ, mediante penicillo, admouent adurens medicamentum, quod, si hoc radiculam perrodit, etiam tumor inarescit. Ne illud medicamentum diffundatur, protinus calida eluenda naris est.

§. 784.

Vbi vero ferramenti vtendum, homo in aduerso fedili collocandus est, loco lucido. Caput, quod in posteriora reclinandum est, ab ea parte minister continet. Chirurgus ferramento, vel volsella, ad id idonea, per nares demissa, apprehendit tumorem a superiore parte, et, vbi eum satis tenet, paulatim deducit, trahitque, ac permutatis digitorum vicibus, illum contorquet, ita, vt nulla propter festinationem vis adhibeatur, tandemque illum euellit. Si metus est, ne sanguis cum periculo erumpat, diuidenda hæc curatio est, et tumor indies magis ac magis attrahendus. Si polypus post vnam haeret, volsella, qua is apprehenditur, esse debet oblonga, et quæ extremum incuruatum habet. Hæc enim per os demittitur. Sunt, qui, vt melius apprehendere possint polypum, prius incidunt velum palati, quæ res vero facit, vt homo non recte deglutire possit. Ad id idoneum est scalpellum anceps linamentis inuolutum.

§. 785.

Sanguis, nisi cum periculo fluat, non tam celeriter sistendus est. Si vero metus est, ne homo vehementiori profluvio exhauriatur, cereus tenuior traicitur per fauces in nares, qui linum trahit. Linum vero habet linamenta, seu puluillos teretes contortos, aliquantum inter se distantes, eique innexos. Cereus prehenditur et adducitur filum, atque imis naribus adprimitur puluillus prior, qui ex linamentis siccis puris esse solet. Si vero sanguis nondum conquiescit, alter puluillus exprimi debet ex liquore ad sanguinem suppressendum idoneo, qualis est alcohol, ut adducto magis lino, et priori etiam puluillo, hic oris venarum sanguinem fundentium admoueat. In nares etiam linamenta sicca, vel simili medicamento madentia, coniici possunt. Sunt, qui oras venarum ferro candente per fistulam demisso adurere iubent, id quod et difficile et minus tutum videtur. Vbi sanguis conquieuit, vlcus curandum est medicamentis, quae locis nervosis idonea sunt. Optima est aqua vulneraria, cui parum essentiae succini adiectum fuit.

§. 786.

Interdum non omnis tumor tolli potest, sed, illo praeciso, eius radix relinquenda est. Huic admouenda sunt medicamenta, quae eam leniter exedunt, additis aliis, quae digerunt. Haec medicamenta illiuntur lino, quod multiplex et ita tortum est, ut unitas in eo facta sit. Linum hoc etiam per nares traicitur et in ore relinquitur. Quotidie vero debet illud sic iminutari, ut subeat pars, quae medicamento illita est. In hac medendi ratione, quae ardua, et taedii ac molestiarum plena est, tamdiu perseverandum, donec nihil ex tumore reliquum sit *.

* Vid. LE DRAN Obs. VI. VII.

§. 787.

Si digitus, ferramenta, nec non medicamenta, per os demittuntur, videndum est, ne posterior linguae pars prematur, irriteturque. Sic enim vomitum cieri, nemo ignorat.

† Si consilium polypos curandi capiendum est, ante omnia humores, si vitio quodam inquinati sunt, corrigi, et, quod dicunt, purgari debent. Miasmata morbi venerei per corpus dispersa et in naribus haerentia, nisi vetus hoc malum est, sic satis feliciter et commode per medicinas ex hydragyro paratas ex corpore expelluntur, iisque expulsi excrecentiae cutaneae in genitalibus vicinisque partibus plerumque sine medicinis externis contrahuntur, et sponte abeunt. Eadem spes de polypis ab causa simili luxuriantibus esse potest. Aqua mercurialis tam mitis et diluta, ut rodere nullo modo possit, extrinsecus subinde adhibita curationem eam iuvare potest. Sin malum vetustius est, eadem quidem facienda sunt, sed tum ut plurimum vitium radices altiores cepit, sic ut ossium iactura quaedam fiat. Scrophulosus corporis habitus similem, quamvis paulo mitiorem medicationem exposcit. Potest autem utroque casu aegroti proclivitas in fluxus sanguinis magnam moderationem a medentibus requirere. Si neutrum eorum vitiorum est, homo vero et ante ortum polyporum et ortis iis ipsis sanguinem crebrius ex naribus stillantem habuit, neque genus vitii pravorum humorum exquiri potest, eorum tamen tenuitatem et acrimoniam quamcunque subelle credibile est. Itaque generalibus remediis utendum est, tanquam aquis mineralibus diluentibus magis quam salinis, fero lactis, lacte ipso, decoctis radicum demulcentium, alimentis et blandis et concoctu facilibus etc.

Curatio extrinsecus adhibenda multiplex proponitur. Si basis excrecentiae latior est, atque sedes eius manus et ferramenta chirurgi admittit, expeditissima ratio haud dubie est, si luxurians caro scalpello refecatur. Verum raro adeo in propinquo et propatulo malum est, ut rationi ei locum concedat. Proponunt igitur usum medicamentorum, quorum longam enumerationem exhibet HEISTER in *Instit. Chirurg.* At vero nisi ad locum eum ipsum, ubi polypus radicans est, medicamentum peruenire tandem possit, malum per rodentia et adurentia redditur peius. Si tamen ea sint ex genere eorum, quibus acidum minerale quoddam adhaeret, atque si valde diluta iterum iterumque ac saepius admoueantur, vasa polypi contrahendo prodesse aliquando possunt sic, ut polypi radix exsucca reddita facilius a subiectis partibus solvatur,

Polypos constrictione circumpositorum, vinculorum curari nouum non est. Cum vero prodesse haec ratio nequeat, nisi vinculum in ipso ortu polypi aut certe in vicinissima propinquitate eius circumiici queat, in remotioribus narum partibus radicati polypi curationem hanc non permittunt. Et tum quoque, quando filum ad polypi radicem peruenire potest, eius constrictio difficultatem affert. Inventum est a LEVRETTO machinamentum quoddam, quo difficultas ea superatur. Descriptum delineatumque est et in *Comment. Acad. Reg. Chir. Paris. T. III.* et in libro singulari, cuius inscriptio haec est: *Observations sur la Cure radicale de plusieurs polypes* etc. Paris 1749. Adhiberi non potest, si polypus nares prorsus implet.

Illa ratio polypum mediante forcipe tollendi, luculenter a PLATNERO descripta est. Si vulgaris forceps ob singularem polypi habitum et molem non satis commoda fuerit, chirurgus non omnino obtrusus sibi parari aliam curabit. Nisi radici proxima polypi pars forcipe apprehendi possit, saepe fit, ut non extrahatur totus polypus sed rumpatur. Sequi multum sanguinis solet. Cunctandum tum non est sed danda forceps iterum in nares, ut relicta pars quoque, partim leniter trahendo partim huc illuc vertendo seu contorquendo forcipem, protrahatur. Polypi albidum mucosum humorem plorantes extractionem haud admittunt. Plerumque etiam origo altior est, quam ut ligatura fieri possit. Potior medela a mutatione totius habitus corporis sperari potest; qua facta quaedam ex antea tactis medicamentis moderate fibras et vascula adstringentibus, seu mercurialibus seu saturninis, attrahi naribus aut siphone iniici possunt —. De Polypis Liber LEVRETI supra citatus euoluatur.

H E R N I A.

§. 788.

Herniae nomen, quod olim in obscenis fuisse videtur *, hac nostra vero aetate honeste dicitur, commune est variis tumoribus, qui in abdomine fiunt, et qui caeteroquin, et sede, et natura, et ortu, non parum inter se discrepant.

* CELSVS L. VII. Cap. XVIII.

§. 789.

Duae arteriae vnaque vena, quae ex foetu ortae ad secundas pertinent, in hoc, quamdiu is succo materno

terno alitur, sanguinem recipiunt, in adultis vero in ligamenta degenerant. Hae arteriae venaque contiguntur peritoneae, quod ibi plicatum est. Haec vero ligamenta, quibus adhuc aliud ex vracho, & vesica educto, accedit, ad umbilicum inter se iunguntur, et velantur comprehendunturque tunica, quam sibi a peritoneo adsciscunt. Cum hac traiciuntur per circulum nervosum vel tendineum, qui in linea alba, communique abdominis musculorum tendine est. Ab hoc enim circulo umbilicus oritur, qui in foetu ad secundas fertur, post partum autem praeciditur. In hac sede, si ille circulus, quem ex tendine esse dixi, ex varia causa se remittit et laxatur, viscera abdominis peritoneum premunt, quod etiam, quia id solum intestina non satis continere potest, grauiatur, diducitur et ab irrupentibus, tum epiplo, tum intestino, distenditur. Si vero illud intentum cutim, ipsumque umbilicum, attollit, is indecore prominet, et vitium communi nomine *ἐξόμφαλος*, vel *ἐξόμφαλον πάθος*, vel *ὀμφαλοκήλη* dicitur. Si tumor solum omentum continet, vocatur *ἐπιπλόμφαλος*, si solum intestinum, *ἐντέρομφαλος*, si vero utrumque, *ἐντέροεπιπλόμφαλος* appellari potest *.

* Vid. GALENI, Defn. Tom. II. p. 274.

§. 790.

Est aliud herniae genus, quod in variis abdominis sedibus oriri potest, et de quo, propter raritatem, inter autores parum constat, qui id, quod non cognoverant, praetermiserunt. Vocant herniam ventralem, quae oritur in iis locis, ubi in musculis transversis abdominis fibrae inter se diductae sunt. Si in haec loca, quibus adeps innascitur, pressum ex variis occasionibus peritoneum irrupit, illudque etiam distenditur, viam quoque reperiunt, et omentum, et intestinum.

Accidere etiam potest, ut hoc vitium ex vulnere abdominis, musculos ad peritoneum usque penetrante, enascatur, utque haec membrana, quia musculis haud tegitur, ab iis, quae intus sunt, diducatur. Atque aliter quoque id fieri solet, ubi patentiori plaga cum musculis etiam peritoneum discissum, et, curato vulnere, cicatrix minus confirmata relicta fuit, quae ab intus prementibus distendi et diduci potest.

† Hernias ventrales in quovis abdominis loco progenitas protrusasque studiose collegit JOSEPH. TADD. KLINKOSCH *Programmate de diuisione herniarum, Pragae edito 1764.*

§. 791.

In utroque inguine super os, quod sub pube transversum, pectinem vocant, descendunt in viris vasa spermatica, quae contextu celluloso comprehenduntur, quem sibi ab eo, qui sub peritoneo est, adsciscunt. Hunc, qui in alterum testis velamentum, seu tunicam vaginalem, vertitur, vulgo processum peritonei appellant, quem tamen a vero peritoneo distinctum esse, ex his intelligitur. In foeminis ad naturalium oras per eandem viam descendunt etiam minores arteriae atque venae, quae simili contextu celluloso vestitae, et alieno nomine ligamenta vteri rotunda vocantur. Haec vasa, quae in utroque sexu in abdomine sub vero peritoneo sunt, quo omnes partes, generationi inferuientes, conteguntur, sub illa membrana ad foramen oblongum arcuatum feruntur, quod in eo tendine est, quem habet musculus obliquus externus, accedente etiam tendine obliqui interni. Nam ab hoc ultimo, et quandoque etiam a carnibus musculi transversi, in viris, incipit ille musculus caeus, cremaster dictus, qui tertium testis velamentum, vel tunicam erythroideam, constituit. Foramen vero illud, quod annulum vocant, arcum repraesentat, cuius crura pectini et huius mediae atque anteriori

teriori cartilagini oblique insistant. Et hoc foramen crebrius diducitur, atque per id descendit distentum peritonaeum, in quod et omentum et intestinum suo pondere deuoluuntur. Quamdiu tumor in inguine est, et quasi bubonem mentitur (127), *βιβωνοκήλη* nomen habet. Si vero illa, quae subsunt, ad inferiores etiam partes nisa, viam inueniunt, ea in viris scrotum paulatim diducunt, quod vitium *όσχεοκήλη* vocatur. In foeminis ex eadem occasione vastius tument pudendorum labra, quod tamen herniae genus in his peculiari denominatione haud distinguitur. Sed vero in utroque sexu omne genus herniae a retento in tumore omento *έπιπλοκήλη*, et ab intestino incluso *έντεροκήλη* vocatur. Si vero vtrumque subest, illud *έντεροεπιπλοοκήλη* haud paucis dicitur.

§. 792.

Arteriae atque venae, quae iliacae dicuntur, ex abdomine ad femora pedesque descendunt et nomen habent cruralium. Vbi vero ex abdomine educuntur, illae ab osse ileo sustinentur, quod hac sede cum osse pectinis committitur et sinuatum est. Arteriae autem atque venae super musculos psoas et iliacos feruntur, contegunturque ligamento quodam, quod ab inuentoribus ligamentum FALLOPII *, vel POUPARTII **, appellatur. Istud formatur ex aponeurosi, vel tendine, musculi obliqui externi, qui et ossis ilei spinae, tum superiori, tum inferiori, et tuberi ossis pectinis inhaeret. Is tendo dum in interiora quasi inflectitur, et cum obliqui interni tendine committitur, crassescit et maiorem etiam duritiem habet. Sub hoc igitur ligamento, vel, ut alii *** volunt, musculorum tendine et aponeurosi validiori, quibus accedunt fibrae ex fascia lata, educuntur illae maiores arteriae atque venae. Et hac parte, si hoc sic dictum ligamentum

premitur, diduciturque vel laxatur, peritonaeum intenditur, et omentum ac intestinum descendunt. Herniam cruralem, vel *μηροκήλην* recentiores appellant.

* FALLOPIVS in Obseru. Anat. p. 91. et in Instit. Anat. ab initio.

** Vid. H. A. R. Sc. MDCCV. p. 64.

*** Negatur a MORGAGNO Aduers. III. Animadu. I. COWPERO in Myotomia p. 2. Tab. XIV. XV. HEISTERO in Compend. Anat. not. IV.

§. 793.

His adhuc addi potest rarum herniae genus, fsi vesicae pars per eum musculi obliqui arcum (791), vel, vulgo sic dictum, annulum, irrupit, et, vel in inguine prominet, vel testis tunicas diducit et in scrotum descendit.

* Vid. Comm. A. R. Sc. MDCCXIII. p. 146. RVYSCH Obs. Anat. Chirurg. XCVIII. 10. SALTZMANNI Diss. de Vesicae vrinariae hernia, Arg. MDCCXXXII.

† Vesica in foeminis aliquando etiam in vaginam vteri prorumpens speciem herniae sistit. Multo plures hernias vesicae compilauit KLINKOSCH l. c. quem inspicere, si lubet. Enumerauit praeter ea vir doctus plures imi ventris partes herniosos tumores ingredi solitas, addiditque obseruationem de herniae insolito genere; tumore enim ligamentum hepatis rotundum receptum fuit. Ouaria quoque hernia comprehensa refert idem, plane singularem tamen casum narrat POTT in *Chirurgical-Observations*, London 1775.

§. 794.

In omnibus his herniis frequentissimum est, peritonaeum diduci, atque multum extendi, rarum vero, illud rumpi. Hoc tamen aliquando fieri potest, praecipue, si illa sedes, in qua hernia est, vehementer percussa fuit.

* Cum veteres existimarent, hanc tunicam, seu peritonaeum, frequentius in herniis ruptum esse, ortum Germanis vocabulum, *der Bruch*. Negant tamen plures, et inter hos RVYSCHIVS, peritonaeum vnquam rumpi, Aduers. Dec. II.

p. 9. Id vero fieri, obseruatione PETITI confirmat GARENGEOT Oper. Tom. I. C. VII. Art. IV. Obs. XVI. p. 329. et, vt videtur, vel eadem, vel fere simili, historia SALTZMANNVS in Diss. de hernia vesicae §. 21. p. 34. Homo, hernia laborans, percussus fuit a calcitrante equo, et mox rupta herniae tunica, seu peritonaeum, magnaue moles intestinorum deuoluta fuit.

† RVYSCHIVS non est inter primos, qui hernias plerumque non a rupto seu a laxato dilatoque peritonaeo fieri dicebant. PAVLVS AEGINETA Lib. VI. C. 65. AETIVS *Serm. II. C. 23.* olim ita existimarunt.

§. 795.

Si igitur herniae vocabulum tumorem significat, qui oritur, si partes quaedam molles situm praeter naturam mutant, et in varias sedes prolabantur, his modo commemoratis speciebus proprium herniae nomen est. Hoc vero vocabulum etiam abusiue et translatione facta aliis tumorum generibus accommodatum fuit, qui herniis vulgo adnumerari solent.

§. 796.

Vmbilicus interdum intumescit, si humore distenditur, id quod in ascite crebrius fieri solet, dum ille tendineus circulus (789), mole aquarum pressus, se remittit. Crebrius etiam in omphalocele (789) in dilatatum peritonaeum humor contrahitur, et eo loco cum epiplooo et intestinis reperitur. Ὠδρόμφαλον vocant hoc tumoris genus, quod plerumque cum iis vitiis esse, non vero facile per se oriri, videtur. Πνευματόμφαλον oriri posse, seu solum spiritum in intantum peritonaeum irrumpere, plures dubitare videntur*. Crebrius vmbilico carnes increscunt, modo integrae, modo carcinomati similes, quod valetudinis genus σαρκόμφαλος appellatur.

* Exemplo, non tamen satis luculento, probauit HEISTERVS Inst. Chir. P. II. Sect. V. Cap. 114. §. 2. p. 784.

§. 797.

§. 797.

Humor contrahitur in cellulas alterius tunicae quae testem comprehendit, et quae vaginalis dicitur. Plerumque humor inter mediam et imam tunicam, seu inter albugineam et vaginalem, consistit, quandoque inter summam, quae erythroidea dicitur, seu inter musculum cremasterem et mediam. Vbi humor increscit et mediam tunicam perfrangit, in utraque se de circumfluere potest. Incidere solet, ut, si in bubonocoele, vel oscheocoele, intus compellitur omentum et intestinum, peritoneum vero distentum elongatumque et per anulum devolutum relinquitur, idque a vincitura extrinsecus admota comprimitur, etiam in hanc tunicam, vel, uti vulgo vocare solent, saccum humor contrahatur, utque interdum tunica in summa parte arctetur et claudatur. ὀδρσκήλην hoc valetudinis genus appellant.

* Vid. LE DRAN Obs. LXXV. Tom. II. p. 162.

§. 798.

Etiam ipse testiculus indurescit, et in eo scirrhus fit. Vel inter tunicas ipsis etiam arteriis venisque, ex quibus testiculus dependet, carnes (796) increscunt: Σαρκοκήλην Graeci vocant.

§. 799.

Praeter haec vitia, integris etiam tunicis atque testibus, illae modo commemoratae arteriae venaeque, quae ad testiculum pertinent, intumescunt, quae quasi intortae ac conglomeratae, et visui subiectae sunt, et inaequales prementi digito renituntur, quod tumoris genus κισσοκήλην vocant.

§. 800.

Raro haec tumorum genera sola sunt, sed saepe alterum alteri accedit. Inde etiam plura nomina et curantibus maiores difficultates oriri solent.

EXOM-

EXOMPHALOS.

§. 801.

In hoc, si intestinum prolapsum est, tumor nec durus, nec mollis, esse solet, qui retento spiritu crescit, vbi vero homo resupinatus est, is vel sponte desidit, vel digito pressus sonat, et cum quodam quasi murmure retro compellitur. Vbi vero omentum est, caetera similia sunt, tumor autem mollior, in quo strepitus haud percipitur. Vbi vtrumque est, indicia etiam mixta sunt.

† Si proprie et strikte loqui velis, hernia vmbilicalis dicitur ea, cuius sedes est vmbilicus. Laxiori sensu LE DRAN et ante eum PALFIN alique vmbilicales nominant eas quoque quae per omnem lineae albae longitudinem sunt. Vid. LE DRAN *Traité des Operat.* p. 238. Verum eas ad ventrales rectius referri liquet.

§. 802.

Frequens hoc vitium infantibus esse solet, quibus vmbilicus, postquam is praecisus fuit, non recte curatus, aut fascia non satis adstrictus fuit. Si etiam his vmbilicus inflammatur, ad eum confluit humor, quo ille circulus laxatur. Nec parum confert puero-
rum, quem saepe ingentem edunt, vagitus. Foemini-
nis etiam hoc ex grauiditate partuque incidit. In
viris hoc herniae genus rarum esse solet, in quibus
tamen aequae, ac in foeminis, illud enasci potest, si ab-
domen valentius premitur, vel concutitur.

§. 803.

Non sine periculo est omphalocèle. Nam, si in-
testinum prolapsum fuit, aliquando eo delabitur ster-
cus, ex quo, vt et spiritu retento, illud vastius tumet
inflammaturque. Adiiciuntur dolores, vomitus, fe-
bres, et tandem, incremente inflammatione, ac super-
veniente gangraena, homo, nisi minime distans cura-
tio

tio adhibeatur, præcipitatur. Rarius incidit, ut omentum, si id solum eiusque maior modus per illum circulum perrupit, et ab hoc premitur, inflammetur.

§. 804.

Si ea, quae proruperunt, non intus compelluntur, et arctius circumdata fascia continentur, etiam metum est, ne ille saepe commemoratus circulus et intentum peritoneum, neque hoc, et intestinum ac epiploon inter se glutinentur. Nam haec res in omni hernia periculum auget, cum ea, quae ita adhaerent, sine scalPELLI opera inter se diduci ac retro compelli nequeant.

§. 805.

De omni etiam herniarum genere, in quo per varias sedes intestinum atque epiploon deuoluta sunt, illud tenendum, eas curari posse in infantibus, quorum corpora augeſcunt, sola adhibita vinctura. In adultis vero vinctura morbum non tollit, sed leuat, et, si recte accommodata est, hominem sine periculo esse sinit.

§. 806.

Igitur, si exomphalus in puero est, is resupinari debet, et, quod prolapsum est, digito premi, ut id in ventrem relabatur. Umbilico autem et sinui, qui in eo est, imponitur cera, quae fere pileolum repraesentat, ima parte, qua cuti imponitur, globosa, suprema parte latior. Huic imponi potest emplastrum, superfulciendi vero sunt panni gradati. Omnia comprehenduntur fascia, quae abdomen circumit, et quae paulo valentius adstringitur. Necessè vero est, ut haec per plures menses superhabeantur, et, ubi fasciam resolui oportet, ea diligentia adhiberi debet, ne ea, quae in suas sedes reducta fuerunt, iterum deuoluantur.

§. 807.

§. 807.

Adultis vero necessarium est lorum, cui pila affuta est ex subere, panniculis, vel coactili, facta, et aluta contexta, quae tumore, postquam is, repulsis omnibus, desedit, accommodatur. Cum haec, quae diutius superhabentur, sudore conspurcari, cutis vero exulcerari soleant, inter pilam et cutim linteolum mundum, vel panniculus quadratus coniiciendus est. Fascia, vel lorum, melius continet, si ei adiciuntur duae habenaе, quae vtrinq̄ue a scapulis descendunt, ita, ut dexterior sinistra, sinisterior dextera procedant, et quae sic, tum in tergo, tum in ventre, illi loro adsuuntur. In valde obesis quandoque necessarium est, ut alia habena a posteriori parte per perinaeum ad ventrem detur et priori adsuatur. Magis tamen opportunum est, si, loco fasciae, semicirculus ex chalybe, cui pila affixa est, abdomini recte et curatius aptatur, et is, mediante loro, adstringitur.

§. 808.

Intestina vero et epiploon, quae, nec intus compelluntur, nec tali vincitura continentur, inflammari nonnunquam solent. Hoc vero incidit post frigora, vel, si venter valde adstrictus est, si adsumpta fuere, quae refrigerant et inflant, et aliena stomacho sunt. Huius rei notae sunt: dolor, tormina, vehemens inflatio, crebrior vomitus, et, si nec aluus, nec spiritus, infra transmittitur. Tandem adiicitur vomitus biliosus et mali odoris, imo ipsum stercus per os redditur, quod morbi genus *εἰλεδν* medici vocare consueverunt.

§. 809.

Vt vero ea, quae prolapsa, distenta ac inflammata sunt, intus cogi queant, plurimum confert, hominem recte iacere. Ei resupino tum caput, tum coxae

a ministris erigendae sunt *, ilia vero ab alio vtrinque comprimenda. Tumor recta digitis deorsum premittitur, ita, vt priora semper condantur, quae posteriora prolapsa sunt. Situs subinde mutandus et venter parumper concutiendus est.

* Necesse est, vt hoc ab aliis fiat, vtque aegri muscoli, praecipue recti, et alii abdominis se ab omni actione remittant.

§. 810.

Si vero ea in suas sedes reduci nequeunt, experienda medicamenta sunt. Super tumorem dari possunt cataplasmata ex pane candido, lacte et oleo. Vel ex lacte coquuntur radix althaeae, maluae, herba meliloti, flores sambuci, verbasci, semen lini, donec cataplasmatibus crassitudo sit, et additur oleum. Opportuna etiam est lana oleo madens et succida *. Haec omnia calida esse oportet. Nocere potest et nimius humor et frigus. Nimius tamen calor etiam offendit, et fibras ad validiorem contractionem excitat.

* Sunt, qui pellem leporis, vel lini fasciculum, ex lacte calido oleoque exprimunt et imponunt.

§. 811.

Interea venter superinungi potest oleo, quod rosam exceperit. In aluum vero infundi debent lotiones, tum mollientes, tum paulo acriores. Eas iterari oportet, quamuis venter nihil excernat, et ipsa etiam lotio intus maneat. Non raro opem fert fumus peti, si is simili ratione, vel per fistulam ad id accommodatam in aluum immittitur.

§. 812.

Cum his dari debet oleum amygdalarum dulcium recens, quod cum cereuisia misceri potest, adiecto semine cumini, bene trito. Multi vinum Maluaticum cum oleo miscent, et eius cyathum aegro propinant.

Inter-

Interdum, vbi omnia frustra adhibita fuere, opem tulit sanguinis missio, qua vero eius non parum detrahi debet. Ex iam dictis apparere potest, omnia, quae, intus sumpta, calefaciunt, nec non, quae refrigerant et inflant, et, quae ex spiritu vini parata prostant, aliena esse.

§. 813.

Si vero epiploon et intestinum, quae inflammata sunt, his fomentis in sedes suas reduci nequeunt, ad incidendum tumorem festinare necesse est. Haec tamen chirurgia inanis esse solet, si ea iam gangraena tenet. Cuius rei notae sunt: tumor mollior, ita, vt sinus digito impressus maneat, cutis liuida, et dolor se multum sine leuatione remittens, maiorque imbecillitas (conf. 172. 173.)

§. 814.

Vbi omnia recte repulsa fuerunt, dolor, inflammatio, et alia mala signa, se mox remittunt. Interdum, quamuis omnia desedisse videantur, tamen inflammatio, dolor atque febris, quibus homo vrgetur, et quae timeri possunt (804), haud conquiescunt, sed continuantur. Id quod non solum in hoc herniae genere, sed in omnibus aliis euenire potest. Solet enim incidere, quia intestina iam grauis et magis diffusa inflammatio tenet, vel, quia intestinum, quod ex vehementiori commotione ac vomitu vertitur, implicitum, et quasi inuolutum est, recentiores voluulum vocant, vel etiam, quia illud peritonaei elongati tunica, cum qua intus compulsum fuit, arctius comprehenditur et strangulatur (789. 791. 792). Nec facile inueniuntur notae, quae ostendunt, ex qua occasione intestina laborent. Scire tamen licet, inflammationem non in ea parte intestinorum, quae prolapsa fuerat, consistere, sed magis diffusam esse, si dolor totum

ventrem infestât, et vehemens huius inflatio est. Si intestinum implicitum fuit, inueniri potest manu imposita mali locus, qui vehementer dolet, et digito renititur. Vbi autem intestinum peritonaei tunica strangulatur, eo tempore, quo id manu coactum in ventrem relabitur, haud sonat, et in cute super umbilicum, nec non super muscoli obliqui annulum et ligamentum Fallopii, quasi sinus quidam manet depressior, quem digito sentire non difficile est. Si primum est, homo seruari nequit. In altero experienda sunt, quae medici in ilei et voluuli curatione praecipiant, et ex his etiam mercurius, cuius magnum pondus deglutire iubent, quo intestina explicentur. In ultimo casu necessaria scalpelli opera est.

* Vid. LE DRAN Obs. LVIII. T. II. p. 18.

§. 815.

Hominem autem, quem scalpello curari oportet, necesse est, resupinum, et super scortum puluinum, ita collocari, vt pectore et coxis demissioribus sit, umbilico vero erectiori. Eum etiam duo praeualentes ministri, pectori ac cruribus incumbentes, continere debent. Inciditur super tumorem intenta cutis, plaga recta, et, si tumor maior est, etiam duabus lineis transuersis. Magna vero moderatio adhibenda est, vt sola cutis aperiatur. Nam quandoque, quamuis rarius, si peritonaem ruptum est, protinus sub ea et adipe intestinum esse solet. Si vero peritonaem integrum est, secta cute conspicitur aliquod quasi reticulum, quod nihil aliud esse videtur, quam tunica cellulosa, qua peritonaem contegitur, alioquin tenebrior, iam vero vexata, inflata et tumida, in quam non raro etiam humor contractus est. Haec tunica leuissima manu secanda, et vulnus sedulo, obiectis sanguinis linamentis, vel spongia, detergendum est. Neque
chi

chirurgus periclitetur, ne intestinum, quod subest, laedatur.

§. 816.

Tandem vero, vbi ad imam tunicam, ipsumque peritoneum, peruentum est, illud etiam incidi debet. Summa itaque moderatione adhibita illa tunica digitis prehensa leuanda, et, facta prius minori plaga, pertundenda est, mox autem demisso specillo, sulcum habente, et scalpello, vel forcice incurua, quae retusum mucronem habet, latius aperienda. Aperto sic tumore, ea, quae proruperant, intus compelluntur (687. 688). Si vero quaedam ex omento vitiosa sunt, vel induruerunt, illa praecidi debent. Quod si vel hoc, vel intestina peritoneaei tunicae, vel haec circulo inhaerescunt, et glutinata sunt (804), necesse est, illa inter se, non tam scalpello, quam digito, vel scalpelli manubrio, diducere. Hoc autem non raro incidit, si nondum reposito omento et intestino vincitura iniicitur, illaque et elongatum peritoneum aliquantum comprimuntur. Si vero res cogit scalpello vti, illud semper quam maxime ab intestinis debet abduci. Opportunum esse potest scalpellum Petiti, quod aciem habet non admodum acutam (698).

§. 817.

Nonnunquam res postulat, vt, si eorum, quae in contractionem circulum (689) irruerunt, maior modus est, is incidatur, quo magis pateat. Id fieri potest illis ferramentis, quae supra (689. 690. 691) proposui, obseruatis etiam omnibus, quae in ventris vulneribus curandis alias praecepi (694).

§. 818.

Repositis omnibus, vulnere imponi potest glomus, seu pila, ex linamentis facta (21. fig. 11). Superdantur panni et iniicitur fascia, quam mantile vocant cum

suspenforio (623. 639. 700). Necessè est, vt aeger se contineat atque resupinus decumbat. Oportet etiam vti sanguinis missione, abstinencia et lotionibus in aluum immixtis. Pestifera sunt omnia, quae inflant, opportuna autem, prae aliis, iuscula ex auena, hordeo, et similibus cum ptisana.

§. 819.

Observatione cognitum est, eos, quibus in hoc et aliis herniarum generibus magnus modus omenti et intestini descendit, raro seruari, quamuis curatio bene cessisse videatur, omniaque sine noxa fuerint retro coacta. Nam omnia abdominis viscera ab insolito pondere premuntur atque male afficiuntur *.

* GARENGEOT Op. T. I. p. 359.

§. 820.

Quamuis vero omnis curatio finita, vulnusque ad cicatricem perductum fuerit, non omnis tamen metus sublatus est. Non raro enim ea, quae repulsa sunt, diducta minus valida cicatrice, iterum in illum circum irrumpunt, quare oportet umbilicum pilae atque vincturae subiicere. Quandoque, et praecipue, si homo iam adoleuit (805), illa vinctura per omnem aetatem necessaria est (806. 807). Id vero non ad exomphalum solum pertinet, sed commune est omnium herniarum, si omentum et intestina excefferunt, et incisa cute in suas sedes iterum reducta fuerunt.

† Exomphalon vulgo pila hemisphaerica vna et vinctura retinere solent chirurgi. Sed etiam si pila satis magna initio circum umbilicalem ita obturat, vt hernia repressa videatur, potest tamen eum progressu temporis ampliare, atque adeo causam morbi adaugere. Quamobrem praestat pilas oblongas duas capitibus duobus vincturae affigere, capitum vero alteri clauum vncinum alteri ligulam assuere. Vincturae pars media dorso, capita illa pilis armata oblongis umbilico applicantur sic, vt circuli umbilicalis partes laterales versus mediam urgeantur. Pilas in situ eo retinet clauus vncinus et ligula per eum data. Vid. *Mémoires et Observations de Chirurgie* etc. par TRECOURT. A Bouillon. 1769.

HERNIA

HERNIA VENTRIS.

§. 821.

Minus peritos hoc herniae genus fallere potest, iisque opinionem abscessus facere, sed vero, tum ortu, tum variis signis, quae cum hernia esse solent, non parum discrepat. Vbi enim intestinum subest, illud vehementissimos abdominis dolores affert, et stomachum etiam afficit, ut, tum ea, quae assumpta sunt, tum bilis, tandemque, ingrauescente morbo, etiam sterqus, per os reddantur. Tumor plerumque magnus non est, qui quandoque enascitur, si interior abdominis membrana ex ictu vehementiori, retento diutius spiritu, vel sub graui etiam fascia, aliaue occasione, diducitur. Hanc herniam in nonnullis sedibus et quandoque ex vulnere oriri, quod musculis abdominis, vel solis, vel cum his etiam, peritoneo, illatum fuit, iam alias (790) retuli.

† Hernia ventris fieri potest in quavis ventris regione et facta legitur in linea alba, tum supra tum infra umbilicum, in regionibus umbilici lateralibus, in linea semilunari, in regione epigastrica, in iliis, in regione hypogastrica laterali, prope annulum, supra pubem, in vagina musculorum rectorum, iuxta musculos abdominis alios, per ovale foramen ossium pelvis, per incisuram ischiadicam, ad perinaeum, ad dorsum, in vaginam prolapsam aut uterum prolapsum et inuersum, in pectus aut per solutum aut relaxatum diaphragma, aut per foramina diaphragmatis dilatata, aut per vulnera eius; denique in toto ambitu anteriori abdominis in saccum extensa. In herniis illis sedeo adeo diuersis diuersae quoque partes contineri quisque videt. De his omnino legendus KLINKOSCH l. c.

§. 822.

Nec aliter curatur hoc vitium. Si tumor non cedit, et cum inflammatione est, necessaria sunt fomenta (810), et oportet resupinato recteque collocato corpore (687. 809) tumorem digitis premere atque cogere.

† Quodsi intestinum in hernioso tumore subest, idque inflatum, neque cum adiacentibus concretum, aqua frigida vel nix, tempestive adhibita non raro ita contrahit intestinum, ut id vel sponte sub situ apto vel digitorum modesta contrectatione in debitum ventris cauum reprimatur. Fomenta calida tum saepe non modo non profunt, sed spiritum intus conclusum expandendo nocent. Atque hoc item de aliis herniis intestini partem concludentibus dictum esto.

§. 823.

Si vero is magis obnuitur, cutis incidenda est cum adipe et carnibus. Interior vero tunica, seu diductum peritoneum, quod intestinum et omentum continet, relinqui potest, et, resolutis ab eo adipe ac carnibus, cum iis, quae continet, retro pelli. Vulnus glutinatur, eique aptatur vinctura (805. 806). Si tumor ea sede ortus est, qua olim vulnus fuit, illa interior tunica, si olim peritoneum vulnere laesum fuit, subiecta non est (705), sed carnibus mox subest intestinum, vel omentum. Igitur, si res postulat tumorem incidere, circumspectius illud faciendum, et manus suspendenda est, ne intestinum laedatur.

* GARENGEOT Op. T. I. Art. VI. p. 367.

† Si ad scalpelli usum ventum est, tum in hoc, tum in alio quocunque genere herniarum, magna prudentia et sapienti cunctatione scalpellum adhibere chirurgus debet; nulla enim hernia est, quae a reliquis omnibus non re aliqua differat.

B V B O N O C E L E.

§. 824.

Hoc herniae genus (791) fere frequentissimum est, praecipue viris. Oritur, si homo sub clamore et satietate, et sub aliquo pondere nititur, vel, si is totius corporis nixu grauiores fasces tollit mouetque, si labore ludoque contendit, luctaturque, tibias inflat, si is vomit, vel ficcior, aluum durum reddit, et si foemina partum enititur. Oriuntur etiam herniae casu

casu ab alto, et si per hunc femina valentius inter se diducuntur, et illae musculorum aponeuroses atque peritonaeum (791. 792) laxantur. Nec non, si ab dominis viscera, ictu extrinsecus illato, casu ab alto, praecipiti saltu, et quavis exercitatione, grauiter commouentur, si pectus et abdomen fasciis, thoracibus arctioribusque vestibus comprimuntur. Rarum esse videtur, nonnunquam tamen obseruatum, herniam ex terrore repente fieri *. His vero offensis magis obnoxia est infirmitas, et hominibus imbecillis, obesis, humidis, hydropes laborantibus, iisque, qui quotidie copiosum lac, oleum atque butyrum assumunt, vel qui se calida ingurgitant, saepe per haec, aliaque in abdomine loca, intestinum ac epiploon, descendunt.

* RVVSCHIVS Obs. Anat. Chir. p. 98.

† Est *hernia* in infantibus, quae vocatur *congenita*. Non ignota quidem fuit priorum temporum medicis, veruntamen nouissimis temporibus in lucem clariorem protracta. Fit autem circa id tempus, quo testiculus ex ventre imo in scrotum deuolutus secum deducit peritonaei productionem, cuius hiatus nisi mature satis contrahitur deleturque fortuito eò delapsum intestinum recipit, atque sic herniae initium facit. Vid. ALBERT. HALLERI *opuscul. Patholog. Obseru. XXVIII.* et eiusd. *Element. Physiol.* T. VII. p. 412. seqq. POTT in *an Account of an particular Kind of rupture frequently-attendant in new born childern* etc. London 1757. HUNTER in *medical commentaries*, Part. I. London 1762. ARNAUD *Memoire de Chirurgie*, London 1768. Senes etiam herniis laborare solent, tum ob intestina magis magisque nitentia in annulos tum ob defectum vitalis virtutis in his.

§. 825.

Plerumque autem haec prius in inguina deuoluuntur, in quibus etiam tumor buboni similis (123) ab initio paruus conspicitur. Huic nomen esse bubonocle, supra retuli (791). Ea vero, quae sic descenderunt, nisa, illud iter, per quod irruperunt, magis et magis diducunt, tandemque etiam in scroti tunicas:

viam reperiunt. Incidere tamen potest, ut, si maior vis fuerit adhibita, repente et potenter diducantur illae aponeuroses, membranae atque peritoneum, utque mox intestinum in scrotum deuoluatur.

§. 826.

Notas, quae in omni herniarum genere communes esse solent, alias (601) posui, nec non eas, quibus bubonocèle a bubone distinguitur * (123). Non ita expedita est distinctio bubonocèles ac herniae cruralis. Bubonocèlem viris, herniam cruralem foeminis, frequentiore esse, obseruatione compertum est. Bubonocèle propius a pudendis est, et in inguine paulo inferiori. Hernia cruralis in parte superiori, et fere super femur, prominet. Quare etiam, ubi inflammatio accessit, haec magis dolet, si tibia flectitur. Nam valentius adducitur fascia lata, cui *μηροκήλην* aliquantum subiectam esse constat (501).

* Inter alia indicia et hoc esse potest. Imperandum est homini, ut tussiat, interea vero manus admoueat tumori. Si bubo est, fere nullus in tumore percipitur motus, longe maior in hernia.

§. 827.

Subesse vero intestinum cognoscitur, si tumor paulo magis digito renititur. Etiam, ubi ei inflammatio accessit, longe acerbior dolor, crebrior vomitus et desidendi conatus esse solet, infra vero, nec alius, nec spiritus, transmittitur.

§. 828.

Si vero omentum est, tumor mollior esse consuevit, et alius etiam redditur. Vomitus tamen nihilominus vrget, quia ab omento adducitur ventriculus.

§. 829.

Animaduenterunt, interdum non totam intestini fistulam in tumorem descendere, sed vnam et inferiorem

rem eius partem, quae mole stercoreis paulatim distenditur atque elongatur, ita, ut appendix quasi quaedam et diuerticulum fiat, quod, quia sterco, et cum hoc etiam spiritus, in eo haeret, et, quia id comprimitur, etiam inflammatur *. Oriuntur dolores crebrioresque vomitus, aliaque mala signa, sed aliis respondet, cum sterco super eam appendicem ad inferiora descendere possit.

* Vid. RVYSCHII Mus. Anat. p. 63. fig. 3. Eiusd. Thes. VII. p. 10. T. VII. fig. 2. et 3. H. A. R. Sc. MDCC. p. 384.

† Auctor eius loci est LITTRIVS.

†† Tumii ex herniosis, quibus diuerticulum eiusmodi natum est, tum omnino omnes fugiant voracitatem, flatulentia, frigus, nimiam exercitationem, nimios et asperos corporis succussus, ictus loci affecti, obstructionem alui; satis igitur bibant, utantur lubricantibus et carminatiuis, subinde aluum purgantibus quoque.

§. 830.

Si in bubonocele, et in omni hernia, ea, quae descenderunt, non retro compelluntur, tandem gangraena nascitur, quae hominem breui inter frigidos sudores neruorumque distentionem tollit. Maius vero periculum est, si solum intestinum subest, idque stercore accepto vastius tumet, quam, si cum intestino etiam epiploon deuolutum fuit. Vbi enim utrumque sit, intestinum facilius in ventrem relabi potest. Vbi vero solum omentum descendit, idque comprimitur, vomitus dolorque non ita vrgent, nec inflammatio tam praeceps est, sed magis lenta, quae vero, nisi illud reducatur, etiam morte finitur.

§. 831.

Ergo omne consilium eo dirigendum est, ut ea, quae prolapsa sunt, in ventrem reducantur. Est vero necessarium, ut cutis supra tumorem sollicitius detergatur. Nam si illa humectata et lubrica est, tumor digitis commode tractari nequit. Tum oportet, red-

dita prius vrina, hominem resupinatum et coxis elatioribus esse, a ministro vero, non ab ipso aegro (809), aliquantum leuari caput atque pectus. Femur etiam, supra quod tumor est, chirurgum flectere oportet, et alium ministrum ilia vtrinque sursum versus premere. Tum digitis premendus est tumor, vt discutiatur, si quis intus est, spiritus. Tandem vero supremus tumor oblique et sursum, lineamque albam versus, in illud muscoli foramen, seu sic dictum annulum, cogendus est, ita, vt semper, quae posteriora prolapsa sunt, priora condantur. Quae sic condita sunt, imposito alterius manus digito deprimantur, donec omne, quod prominebat, reuertat. Hoc, si intestinum est, cum murmure fit (809).

† Sunt, qui hominem herniosum eo casu ex pedibus suspendi iubent, vt partes in herniam ingressae, pondere suo nitentes in ventrem relabantur. De aquae frigidae vsu supra a me dictum est.

§. 832.

Si vero ea, quae prouoluta sunt, iam inflammationem acceperunt, et, quia nimium distenta sunt, haud reuertuntur, id quod ex variis occasionibus fieri supra (808) retuli, protinus confugiendum est ad medicamenta, quae molliunt, et quae ipsi tumori superhabentur (810), et alia, quae in aluum immittuntur (811), atque ore sumuntur (812). Periculum enim est, ne, cum diu frustra per digitos tumor agitur, mortifera inflammatio excitetur.

§. 833.

Quo vero repulsa ab inguine scrotoque excludantur et ventri innorescant, vinctura opus est. Fasciarum vero, quas περιζώματα appellant, varia genera sunt, et cuique chirurgo suus fere modus est. Iis, quibus abdomen circumdatur, adsuenda pila est, et huic proxime subiiciendus ille muscoli obliqui sic dictus

dictus annulus, sicque coercendum, tum intestinum, tum epiploon, tum etiam ea diducti atque elongati peritonaei tunica, siue faccus, quo ilia inclusa sunt. Pilae suprema pars aliquantum inniti potest inferiori ossis ilei spinae, nulla vero alia pars, neque os pectinis, ita valenter premi debet, quam ea modo descripta sedes. Huic etiam pila ita accommodari debet, ut eam non solum erecto corpore, sed sub eius etiam et membrorum quocunque flexu aequaliter, et sine intermissione, premat. Periculum enim est, ubi inguina flectuntur, homoque sedet, vel equo, curruque, vehitur, ne, dato inter inguen et pilam spatio, intestinum iterum deuoluatur. Igitur multi utuntur perizomate, quod ex ferro fabricantur, corioque obducunt, et cui pilam affigunt, quae, vel elaterem habet, vel trochulum, ut, adducto etiam femore, pila altius in inguen deprimi possit. Fasciae lineae, vel ex corio factae, vix satis continent, et quouis corporis nixu diducuntur. Accedit etiam lorum, vel habena, per femina traicienda, quae omnibus, praecipue foeminis, perincommoda esse solet. Nihil etiam nocentius periculosiusque est, quam, si sub vinctura non recte aptata, ea, quae retro compulsa erant, aliquantum reuertuntur, et a pila comprimuntur, non reprimuntur. Id enim mouere potest inflammationem, vel efficere, ut illae partes ea ratione, quam supra (804) proposui, inter se glutinentur, sibi inhaerescant, et post retro compelli nequeant. Ea curatione adnota pueros ita restitui, ut vincturam tandem sine pernicie omittere queant, non vero adultos senesque, alibi dictum est (803).

† De compositione idoneorum perizomatum; vid. *Mém. ment. Acad. R. Chir. T. V. Journal de Médecine*, par M. A. ROUX, Tom. XXXXIII. De curatione herniarum usu externo medicamentorum causticorum perficienda vid. *Dissertation sur l'usage des caustiques pour la guérison radicale*

dicale des hernies etc. Par GAUTHIER, à Londres 1774.
 Sed vero etiam ea, quae ab aliis contra methodum cam-
 dicta sunt in *Monum. Acad. R. Chir. T. V. De usu pulve-*
ris tenuissimi corticis quercini ad hernias sanandas vid.
Seances publiques de l'Academie de Chirurgie, à Paris 1779.

§. 834.

Ad scalpelli vero operam decurritur, si, quae de-
 voluta inflammataque sunt, reduci nequeunt, vel, quia
 stercore ac spiritu accepto intestinum vastius tumet,
 vel, quia id et omentum atque peritonaei tunica, nec
 non hoc ac ipse annulus inter se glutinata sunt.
 Festinandum vero est, et haec curatio recenti re adhi-
 benda, neque, cum intestina iam gangraena tenet et
 summa imbecillitas, singultus, neruorum distentio,
 sudor frigidus, aliaque mala signa, ad vltima iam ven-
 tum esse, significant (813).

† Si intestinum vel a faecibus vel flatu distentum est, atque
 haec causa sola subest, quam ob rem reddi in aluum id
 nequeat, ad usum scalpelli non adeo properandum, quam si
 morbus statim ab inflammatione incepit vel iam cum ea
 est. Id intelligimus, si hernia vel ad minorem contactura
 dolet.

†† Anteaquam ad scalpelli operam decurras, aegrotanti et
 adstantibus, quae spes, qui metus subsit, significandum est.
 Prognosis autem varia est. Aut enim elapsae partes parum
 aut vix male affectae feliciter in ventrem redduntur. Aut
 partes eae gangraena iam affectae sunt, et homo hac perit.
 Aut haec, quia in loco non amplo est, vel quia non tam
 gangraena quam suppuratio est, hominem quidem non in-
 terimit, sit vero postea gangraena ex faecibus humoribus-
 que ex superiori intestini aperti nec sat commode cum
 vulnere externarum partium connexa parte in ventrem sub-
 dole stillantibus. Aut erit anus factitius seu succenturiatus
 in inguine. Aut sanatio integra videbitur quidem, quando
 scilicet intestinum parum laesum, iam glutinatum et cum
 vicinis coalitum est, attamen, quia in loco eo contractum
 angustatumque id est, causae ad varios morbos praedispo-
 nentis vice per futuram hominis vitam fungi poterit. Et
 cum nonnulli herniarum, quae reductionem sui adhuc ad-
 mittunt, curationem efficacem secando faciendam nihilo-
 minus proponunt, eorum gratia huc loco commemorandum
 est, herniae non incarceratae operationem chirurgicam
 multo

multo saepius lethalem euentum habere atque periculosiorem esse, quam quae herniae incarceratae, quam vocant, adhibetur, ac praeterea hernias, quae antea sat benignae vitae essent, variis difficultatibus, non praeiis, impediri, sic, vt chirurgiae huius administrationi moram nectent, atque intestini elapsi reductionem retardent; neque hoc tum in his curationibus, tum in aliis rarum esse, vt vel in sano caeteroquin corpore vitia intus recondita lateant, quae, operatione vel felicissime administrata demum euoluantur, et symptomata graua moueant, quae periculum ingens mortemque minitentur; propter haec igitur rationi non congruere sectionem herniarum, quae reduci et adhibito idoneo perizomate retineri queant.

§. 835.

Prius autem oportet aluum lotione ducere, sanguinem ex incisa vena mittere, vesicam exonerare, et inguen, si pube contegitur, raderē. Quod si vero inguen incidendum est, debet homo collocari supinus, ita, vt demisso capite sit, coxis vero elatioribus,isque a ministris contineri. Femur tamen, super quod tumor est, a quodam attolli debet. Chirurgus et minister digitisprehendunt super tumorem cutim, eam plicant, attollunt, atque per eam scalpellum rectum, cuius dorsum tumori obuertitur, traiciunt, et eam sic aperiunt. Vbi cutis ex inflammatione valde intentata est, et plicari atque attolli nequit, ea ab exteriori parte deorsum versus incidi potest circumspectius. Plaga facta, adeps, quae nonnunquam valde induruit, non tam secanda, quam ferramento, scalpelloue reuulso (*dechaussioir*) diducenda est, donec tandem ad herniae tunicam, quae ex peritoneo deorsum versus subest; peruenitur. Rarius enim hanc ruptam et mox sub ea intestinum esse, alias dixi (794). Inter quae si sanguis fertur, oportet illum linamentis obiectis, vel spongia, occupare atque detergere, si vero arteria secta fuit, illam vincire.

§. 836.

Tunica peritonaei, quam vulgo saccum vocant, scalpello, quod leuissima manu teneri debet, eiusque mucrone, non tam secanda, quam paulatim radenda, et ita aperienda est, ne intestinum, quod subest, laedatur. Vbi minima plaga scalpello facta fuit, illa demissa forfice debet latius super digitum aperiri. Plurumque humor exit, qui, si bonus est, non subliuidus, nec mali odoris, securitatem pollicetur. Nam, si omnia, quae euoluta fuere, sicciora sunt, coniectura est, ea cum peritonaei tunica coaluisse. Quo vero commodè possint reduci intestina, ea, si vastiora tument, adduci queunt, quo retentus spiritus et eo delapsus stercus latius dissipentur (688). Si vero ille sic dictus annulus strictior est, et ob id refundi intestina nequeunt, oportet eum incidi et latius aperiri. Igitur minister educta intestina attollat, quo ea semper a scalpello longe sint. Prae aliis huic chirurgiae idoneum est illud scalpellum, quod LE DRAN inuenit. Adhiberi tamen etiam alia scalpellorum et ferramentorum genera possunt (690). Incidendus vero sic dictus annulus est, lineam albam et sursum versus, ne arteria epigastrica vulneretur (692).

§. 837.

Epiploon vero, si id, vel solum, vel cum intestino, prolapsum, et sine noxa est, etiam reduci leuiter suspensa manu potest. Si vero id induruit, vel iam inflammationem accepit, praestat, illud protinus lino deuincire et praecidere, obseruatis iis, quae supra praecepi (683). Si quae peritoneo iuncta sunt, vel si hoc annulo inhaerescit, ea scalpello non abscindi, sed eius manubrio, digito, vel scalpello PETITI (690), resolui debent (816).

§. 838.

Sunt, qui iubent peritoneaei tunicam, ubi ea patefacta est, integram relinquere, et eam, omniaque, quae descenderant, retro compellere. Haec vero curatio non semper tuta videtur. Minimum, si tumor maior est, qualis in oscheocele frequentius esse solet, et si tunicae vetustate frequentique inflammatione occalluerunt, vel, si peritoneum annulo, intestina et epiploon peritoneaeo, inhaerescunt, et, si vitiosa fanies, pus, aliudue alienum, subest, illa prodesse non potest, sed semper nocere.

* Vid. GARENGEOT T. I. p. 311.

§. 839.

Reductis omnibus, ille tendineus sic dictus annulus, praecipue, si is remissus valde fuit, scalpello potest concidi, quo validior fiat cicatrix. Vulneri superdatur illa pila (21. fig. 2), prius in medicamentum ad id accommodatum demittenda. Plerumque solent ouum in vas defundere, idque affuso paucio spiritu ardente agitare, et hac mixtura pilam, vel linamenta, madefacere. Inponuntur panni plures gradati, et iniicitur fascia, quae, quod in inguine spicam describit, inde nomen habet. Videndum ne vasa spermatica pila pannisque premantur.

§. 840.

Necesse est, ut aeger supinus, in alterum latus inclinatus, coxisque paulo elatioribus cubet. Adhibenda est abstinentia. Omnia sollicitius, velut in graviter vulneratis, agenda sunt. Perutiles sunt lotiones, si ea crebrius in aluum immittuntur. Ante tertium diem, nisi aliud quid hoc requirat, fascia resoluenda non est, et eo tempore multa diligentia adhibenda, ne ea, quae retro compulsa fuerunt, reuertant. Curato

rato etiam vulnere, vinctura (833) nihilo minus necessaria est.

§. 841.

Incidere potest, vt aperto tumore et patefacta peritonaei tunica intestinum iam vitiatum sit et gangraena affectum, id quod intelligitur ex colore, et si ex vulnere stercus cum odore malo effertur. Plerumque mors in propinquo esse solet. Seruari quandoque homo potest, cui id, quod corruptum est, tollitur, et intestini finis, qui superne labitur, vulnere adfuitur * (697).

* Vid. quae ad §. 674. adducta sunt. Adde LAVR. HEISTERI: Diss. de Hernia incarcerata suppurata saepe non lethali, Helmst. Anno MDCCXXXIX. Qui etiam ostendit, ita curari posse herniam, a chirurgo, quem tumoris mollitudo et opinio bubonis decepit, incisam. Duo exempla etiam adducit SAMUEL SHARP in the *Treatise on the Operations of Surgery* Cap. III. p. 16.

OSCHEOCELE.

§. 842.

At, si cui intestinum et epiploon in scrotum descenderunt (791), hocque intumuit, id, ne opinionem sarco-vel hydroceles faciat, certiori nota explorari oportet. Magnum enim discrimen in ortu causisque positum est, quas supra (824) retuli, cum oscheocele ex bubonocèle plerumque oriatur (825), vel, id quod rarius incidit, ex vehementiori totius corporis nixu motuque, aut abdominis pressione. Sarcocèle ex testis inflammatione relinquitur, hydrocele vero plerumque, si valentius compressum fuit scrotum. Si sub tumore sunt intestina et epiploon, ea, homine resupinato (831) in ventrem reduci queunt. Si etiam non omne id, quod deuolutum fuerat, reuertit, quia peritoneum annulo inhaerescit, maior tamen

tamen prolapsorum pars digitis repelli potest. In sarcocele tumor duritiam fere lapideam habet, in hydrocele vero is digito cedit, sublato vero digito mox iterum confurgit (conf. 801. 827. 828).

§. 843.

Ratio curationis non alia est, quam, quae bubonocetes. Sunt tamen quaedam observationes necessariae. Non temere ad scalpelli operam decurrendum, si omne id, quod prouolutum est, potest reduci, et admota fascia, cui pila adfuta est (833), contineri. Nec, ubi maior modus intestinorum omentique descendit, atque ideo ingens tumor est, solet tam magnus metus inflammationis esse, quod plerumque annulus diductus atque multum remissus est. In quo casu etiam ipsam sectionem non satis tutam, sed anceps remedium, esse, compertum habemus. Nam quamuis incisa cute omnia in abdomen compulsa atque sine noxa condita fuerint, insuetum tamen illorum pondus grauer afficere videtur hominem, ita, ut is non raro breui et subito rapiatur (819).

† Si oscheocele vetus est et vastior, homo is ne perizomate quidem commode utitur, quia, tanta mole elapsorum in ventrem reddita, male admodum afficitur, statim vero atque iterum in scrotum delapsa sunt, melius habet. His tamen suspensorio scroti commodo opus est.

§. 844.

At, si annulus et peritonaeum inter se glutinata sunt, atque ob id retro agi nequeunt, aeger de salute periclitatur, cum eiusmodi tumor pilae commode subiici nequeat (804). Nonnunquam tamen id fieri posse, observatio docuit, si vtrumque, et intestinum atque epiploon, annulum perripit, et intestinum repelli potest, omentum autem, quod peritonaei tunicae, siue sacco, inhaerescit, inguini immoratur, et ex

E e

hoc

hoc tumor potissimum manet. Nam, si vinctura ita admouetur, ut a scroto excludatur intestinum, epiploon vero parum et minus valenter prematur, hominem fere sine periculo esse potest *.

* Vid. SHARP l. c. p. 15.

§. 845.

Si in oscheocele maior epiploei modus et iuncta intestina prolapsa sunt, eaque nec a scroto excludi atque repelli, nec adnota pila et vinctura contineri possunt, multum leuatur aeger, si magno tumori subicitur fascia, quam *suspensorium* vocant chirurgi, quod is commodè excipitur (132).

§. 846.

At in eo, quem scalpello curari oportebit, incidendus tumor est, ab inguine vel annulo deorsum, ad extremum usque testem. Simul atque ad peritonaei tunicam, seu saccum, peruenit scalpellum, is aperendus est (836), sic, ut intestinum, quod subesse solet, haud laedatur. Exire solet ex plaga humor, qui intus in peritonaei tunicam ut plurimum contractus est, et qui, si melioris generis, haud liuidus, aut malis odoris est, spem ostendit (836). Caeterum haec quidquam noui curatio requirit (conf. 835. 836. 837). Semper incidenda est peritonaei tunica (838). Fascia (839) vero accommodanda, ut ea etiam scrotum suspensum contineatur. Quod si etiam feliciter cessante curatio, vinctura tamen (833) per omnem vitam necessaria est.

§. 847.

Potest interdum euenire, ut praecidatur arteria epigastrica (692. 836), ex qua re magna sanguinis profusio et ingens mortis periculum sequitur. Ea enim deuinciri commodè nequit. Igitur linamenta

ex liquore stiptico (411. 412) expressa arteriae admo-
veri eamque per plures horas ita aequaliter digito
premi (407) oportet.

§. 848.

Hernia cruralis (792) frequens est foeminis, in
quibus grauiditates partusque peritoneum multum
diducere et praecipue ea sede laxare solent (826). Si
intestinum, quod descendit, repelli debet (831), mo-
tus adhibendus est, ut id oblique, sursum; lineamque
albam versus, prematur. In bubonocoele enim repo-
nenda, tumor compellendus est extrorsum et os ileum
versus (809. 831).

† Si cruralis seu femoralis hernia est, tumor est supra os ilium
eo loco, ubi recta supra acetabulum incisura ea est, per
quam psoas musculus et iliacus cum subiectis vasis crurali-
bus ex ventre egrediuntur. Eo loco ad interiora est pe-
ritoneum, ad exteriora pars fasciae latae, adeps et cutis
vna cum infima parte musculi abdominalis oblique descen-
dentis, quae quidem eius expansio vocatur ligamentum
Poupartii. Tumor autem minor est, quam in bubonocoele.

†† In feminis etiam non grauidis a causis iisdem, quae bu-
bonocoelem faciunt, hoc herniae genus fit, maximeque a
vestibus arctioribus.

§. 849.

Vbi vero tumorem inflammatio tenet, et, quae
eo continentur, repelli nequeunt, eum etiam, id quod
per omnia herniarum genera perpetuum est, oportet
incidi. Plures, ut plaga transversa fiat, praecipunt,
alii vero eam commodissimam esse contendunt, quae
linea longa paulo exterius super tumorem deorsum
descendat, qui addunt, metum esse, ne transversa
plaga praecidatur arteria epigastrica (692. 836. 847),
vel vena saphaena, quas iuxta esse ex anatome discitur.
Laedi etiam possunt glandulae in inguine, et, quae
ipsi herniae subiectae sunt, arteria venaque cruralis.
Tumor, postquam apertus est, sedulo considerandus,

num is nouus sit, et num ei haud aliud vitium ex vetustate vel admoto prius perizomate accesserit. Si enim haud ita pridem ortus fuit, non semper necessarium est, peritonaei tunicam, vel saccum (838), incidi, id quod faciendum, si ille iam vetustate occalluit; vel, si is arctius comprehendit atque strangulat intestinum (814), vel, si in eum iam multus humor contractus est (838).

CYSTOCELE.

§. 850.

Vesicam, in bubonoccele, vel oscheoccele, tumori subesse, raro incidit (793). Id cognosci potest, si homo urinam reddere nequit, nisi presso exteriori tumore. Nec alia huius vitii curatio est. Summa cura atque moderatio adhibenda, ne, ubi tumor inciditur, vesica laedatur, quam non peritonaei tunica contineri, sed proxime cuti subiectam in tunica adiposa, vel cellulosa, haerere nouimus.

† De hernia vesicae inguinali, scrotali, vaginali, vid. *Monum. Acad. R. Chir.* Tom. II. et IV. item ANTON. DE HAEN, *Ratio medendi etc.* Tom. III. p. 165. seqq.

§. 851.

Repudianda est illa vulgaris empiricorum medendi ratio, qui in omni bubonoccele et oscheoccele testem praecidunt atque tollunt. Nec aliae curandi viae, in quas diuersas alii processerunt, securitatem aegris praestare possunt.

† De herniis veris scriptores haud contemnendi sunt ANTON. DE HAEN in *Ratio medendi*, pluribus locis. GEORGE ARNAUD in L. supra allegato, idemque in Tractatu gallice conscripto, *Traité des hernies*. Paris 17 AUG. GOTTL. RICHTER, *Abhandlung von den Brüchen*, Göttingen 1778.

ΥΔΡΟΜΦΑΛΟΣ.

§. 852.

His verarum herniarum generibus in conspectum quendam, quatenus scire medentibus necessarium est, adductis, iam etiam ad alios tumores veniam, qui, cum proxime ad herniarum similitudinem accedant, his adnumerari consueuerunt (795). Et quidem nonnunquam umbilicus prominet, quod in eum humor irrupit, id quod crebrius iis incidit, quos aqua inter cutem male habet. Humorem etiam in peritonaei laxati diductique tunica crebrius reperiri, si in omphalocele per umbilicum epiploon et intestina prolapsa sunt, alibi retuli (796). Cognoscitur sine opera, humorem intus esse, quia is, si tumor digito premitur, circumfluit. Huic vitio, si cum hydropse est, non alia ratione subueniri potest, quam eo percurato. Nam, si tumor perforatur, et humor effunditur, is breui reuertit *.

* Vide figuram in PYRMANNI Chirurgia curiosa, Cap. VII. P. 330.

ΣΑΡΚΟΜΦΑΛΟΣ.

§. 853.

Umbilico interdum carnes increscunt, quae saepe, carcinomati similes, cum periculo tractantur. Accidere id solet pueris, quorum umbilico laxior iunctura post partum iniecta fuit. Nonnunquam corrupta caro oculis, et latius patet, ac nocenter increscit, aliquando vero ea sub cute est, quae inaequaliter tumet. Interdum locus mollior, interdum asperior, est, qui tactus aliis dolorem affert, in aliis vero non habet. Tumor vero, ubi homo resupinatus est, nunquam relapso intestino desidit, nec prementi cedit,

quem vitiata caro in eadem figura tenet. Nonnunquam plura vitia esse solent, vt et intestinum atque omentum prolapsa sint, vtque cum his etiam humor peritonaei tunicam distendat, et quoque membranis vitiata caro increseat. Si tumor cum malo vlcere est, valdeque durus, cum magno dolore, is omni curatione, praecipue admotis medicamentis adurentibus, irritatur. Nec is sine periculo scalpello exciditur. Si vero tumor malus non est, is vtraque ratione tolli quandoque potest *. Caro etiam, quae sub cute increuit, hac incisa, resoluenda eximendaque est.

* Vid. IOBI A MEEKREN Obs. Cap. XLVII. p. 200.

Σ Α Ρ Κ Ο Κ Η Λ Η.

§. 854.

Huius vitii duo genera esse, retuli (798). Vtrumque nascitur, si, vel testiculus, vel, quae ad eum pertinent, arteriae venaeque, et membranae, quibus haec partes comprehenduntur, compressae, vexatae et inflammatae fuerunt, praecipue, si testiculo, qui ex his et aliis causis, ex impura venere et gonorrhoea suppressa (129) inflammatus est, non opportuna curatio fuit adhibita (254 ad 258) *. Observatio docuit, testem tumere, et sarcocelen oriri posse etiam ex ea causa, ex qua aliae veraeque herniae nascuntur, si, retento spiritu, vel sub graui fasce, vel alia occasione, homo valentius et diutius nititur, vel, si is praecipiti saltu in terram fertur **. Inter rariora est, testiculum osseum fieri ***.

* Sarcocelen ex acu in testiculum infantis infixam describit SAVIARD Obs. LVI. p. 253.

** Vid. LE DRAN Obs. LXXI T. II. p. 132. Inflato abdomine et sub fortiori nixu adducitur musculus obliquus externus abdominis, et contrahitur annulus, quo processus peritonaei, seu vasorum spermaticorum velamentum, quod ex tunica

tunica cellulosa peritonaei habent, comprimitur. Sub praecipiti saltu vero accidere potest, ut a colo, fecibus durioribus pleno ac tumido, peritoneum super annulum istum atque inflammationem accipiat. Haec vero, si incidunt, impediunt, quo minus sanguis per venas minores permanere queat, et intumescit ac inflammatur testiculus. Haec res mihi haud ita pridem confirmata fuit, cum, ut hydrocele curari posset, longa magnaue plaga incisa esset tunica vaginalis. Ipsius enim testiculi grauior inflammatio, orta fuit, cum tumore, non aliam ob causam, quam, quod ab inflammato illo vasorum spermaticorum velamento comprimerentur venae, et quod per eas sanguis permanere haud posset.

*** Vid. H. A. R. Sc. MDCC. p. 47.

† Testiculus sarcocoele affectus modo laevis est extrinsecus, modo non est, sed exstantibus quibusdam hispidus; alio tempore non dolet, alio dolet; interdum funiculus spermaticus simul durus est et epididymis tumet, interdum haec vitia absunt. Intelligitur ex his, qua data e conditione testiculus vel benigno vel maligno morbo laboret.

§. 855.

Si testiculus occalluit, licet ante scalpellum prius experiri medicamenta, quae glandularum tumoribus ac scirrhis resoluendis quandoque idonea esse retuli (113. 267). Necessaria vero cum his est fascia, quam suspensorium vocavi (845), qua testiculus excipiendus et semper sustinendus est. Parum valent medicamenta, quae ore sumuntur. Victus sit tenuis et parvus et alius subinde ducatur.

§. 856.

Si his vero per plures dies admotis nihil ex tumore minuitur, et aegro, cui testiculus indecore, vel etiam cum dolore, dependet, vltima experiri statutum est, testiculus excidendus est. Protinus vero considerari et diligentius admoto digito explorari oportet arterias et venas spermaticas, ubi illae ex sic dicto annulo educuntur et ad testiculum feruntur. Illae enim si multum tument duraeque sunt, chirurgia, in qua

caeteroquin multa genera ac tempora periculi sunt, sine perniciē adhiberi non potest, cum eae tuto, nec praecidi, nec deuinciri, queant. Nonnunquam aliud vitium accessit et per laxiorem annulum etiam omentum atque intestina descenderunt, quae supra durum tumentemque testiculum haerent. Id ex eo cognoscitur, si in inguine, vbi modo dictae arteriae venaeque descendunt, tumor est, non vero ita durus, sed magis aequalis, et si refupinato homine pars quaedam ad ventrem reuertit, vel pressa retro pellitur. Et haec res curationem recipere potest, si, repositis iis, quae deuoluta erant, arteriarum venarumque funiculus lino adstringitur, et testiculus excinditur.

† Sarcocoele, quae dolorem iam mouet, atque adeo iam scirrhi maligni indolem prodit, vix tuto resectione curatur; plerumque enim mors maturatur; quod et fieri solet, si funiculus spermaticus speciem duri tumoris prae se fert. Illi igitur, qui chirurgiam efficacem procrastinant, dum dolor accedat, morbum sanabilem non attingunt, insanabili malo malum addunt.

§. 857.

Quod si vero res scalpello agenda est, ante aliquot diebus corpus victu vinique abstinentia praeparari oportet, vt aeger modicos salubresque cibos assumat et ptisanam bibat. Sanguis praeterea mitti et aluus duci debet medicamentis satis valentibus, minus autem acribus (63). Ipso autem die, inguen, si pube tegitur, radendum, homo supinus collocandus, et plaga, quae recta deorsum fertur, inguen et scrotum aperiendum, donec ad scroti infimum peruentum sit. Hoc enim nisi fiat, metus est, ne quid sanguinis concreti in scroto maneat. Rectus scalpellus ita admo- veri debet, vt dorsum vasis spermaticis obuersum sit, et is prius solam cutem digitis chirurgi ac ministri plicatam sublatamque cum pinguedine secet (835). Vbi autem ad tunicam, quae vasa illa tegit, peruentum fuit,

fuit, inclinandus mucro est, vt et hanc fecet. At enim scalpellus quam leuissima manu teneri debet, summaque cura adhiberi, ne arteriae, venae neruique attingantur (836). Minor vero plaga facienda, vt intrare digitus possit. Super hunc enim in vulnus demissum hoc commodè forfice ampliatur. Si etiam intestina descenderunt et super testem haerent, maiori diligentia opus est, ne ea, quae prolapsa sunt, violentur. Quae, si patefacta fuerunt, protinus reponenda sunt (736). Omentum vero deuinciri atque praecidi potest. Videndum tamen sedulo, ne omento, quod intestinum, praecipue coeci appendix, cui a vermiculo nomen est, comprehendatur, id quod fieri potest, si tumor ab inguine dextro dependet (683. 837).

† Cum fieri possit, vt testiculi hydrocele paulo durior aliquando habeatur pro sarcocoele testiculi, antea quam alia agere occipias, tumidus testiculus perforandus est, vt pateat eius status. Nam si sola hydrocele fuerit, seruari poterit testis, sin aut nil effluxerit, aut vna cum humore peccante praua conditio testis solidi fuerit, reliqua, quae in sequentibus praecipiuntur, ex arte fiant.

§. 858.

Patefactis sic omnibus, modo commemoratus tunicae cellulosae processus, qui plerumque induruit et tumet, a vasorum spermaticorum funiculo resolui, et lino incerato separatim a reliquis ad annulum deligari debet. Alio vero lino vinciri oportet vasorum spermaticorum funiculum, a quibus testiculus dependet. Linum ex quatuor filis debet esse compositum, non tortis, sed sibi ad latus positis, mediaque cera ita inter se glutinatis, vt ligulae similes sint. Lini duo capita inter se connexo nodo adstringuntur, primum simplice, post, vbi linum iterum funiculum comprehendit, duplici, quali chirurgi plerumque vtuntur. Inter lini etiam capita, antequam adstringuntur, ponendi sunt panniculi minores ex linteo incerato, quo

id melius infideat, et, ne arteriam venamque abrum-
pat. Capita vero extra plagam relinquenda sunt.
His peractis, testiculus a tunicis suis digito, scalpelli
manubrio, ferramentoue resoluitur. Si tumor ingens
est, etiam ex scroto aliquid excinditur. Tandem ille
funiculus, ex quo testiculus dependet, scalpello ab-
scinditur, ad quartum circiter digitum, ab injecto vin-
culo. Praeciditur quoque illud velamentum, quod
alio lino adstrictum fuerat, ad alterum circiter ab hoc
digitum, et totus testiculus demitur. Alia sectione
vero ampliari debet annulus, ne, superueniente in-
flammatione, tumentes arteriae, venae neruique, cum
illo velamento, quod haec vasa ex tunica cellulosa
habent, a minori et strictiori annulo strangulentur.

† Alii, ut PERCIVAL POTT solvunt arteriam spermaticam ab
vase deferente digito mediante, camque seorsim vinculo
constringunt, quo injecto testiculum a funiculo haud pro-
cul a loco vinculi, fere spatio dimidia vel quartae partis
pollicis refecant, et tum demum eum a scroto separant.
Vid. de his aliisque non paucis omnino *A Treatise on de
Hydrocele* etc. By PERCIVAL POTT. *The third Edition.*
London 1773. Germani versum hunc librum ex editione
secunda, legere possunt. Translator fuit IOH. CLEM.
RODE. Librarius ROTHE Hafniensis.

†† Sunt etiam, qui, vinculo constrictis vas, curationem
reliquam differunt in id tempus, quo testem vident reddi-
tum esse flaccidum et nutrimento orbem atque corrumpi,
hoc enim doceri putant, recte vineta esse vasa, neque de
sanguinis profusione quicquam esse metuendum; atque
tum testem sub vinculo refecant.

§. 859.

Super vulnus linamenta eatenus dari debent, do-
nec id tegant atque impleant, ea vero non fulcienda,
sed leuiter tantum ponenda sunt. Caetera, quae ad
reliquam curationem pertinent, supra (834. 839. 840)
comprehensa sunt. Vbi metus est, ne hominis loti-
um fasciam conspurcet et vulnus irriter, accommodari
potest scroto velamentum ex linteo incerato.

§. 860.

§. 860.

Ad hanc curationem festinare, cum praeceps sit, nullo modo conuenit. Ac neque in omni vitio illa experienda est. Si enim arteriae venaeque spermaticae, a quibus testiculus dependet, occalluerunt, illa deuinciri nequeunt (856). Nam si illae lino altius et in ipso abdomine adstringuntur, sequi solet peritonaei, vel potius tunicae cellulosae, quae sub eo est, inflammatio, quae hominem interimere solet. Ea quoque curatio esse debet, si testem ex ictu, aliaue occasione, grauis inflammatio tenet, et haec in gangraenam tendit (133). Superuacua est illa, si serius adhibetur, et ubi iam arteriae venaeque saepe commoratae, ex quibus testiculus dependet, gangraena affectae sunt. Interdum tamen etiam temeraria medicina profuit *.

* Vid. LE DRAN T. I. Obs. LXXIV. p. 149.

Υ Δ Ρ Ο Κ Η Λ Η.

§. 861.

Humor, qui fere semper inter mediam, vulgo vaginalem dictam, et imam testiculi tunicam, seu albugineam, consistit *, effertur ex ruptis lymphae accommodatis venis. Etiam confluit, vt videtur, si humor, quo illae partes, ne inter se coalescant, humidantur, haud iterum suis venulis absorbetur.

* Raro euenire arbitror, humorem inueniri inter erythroideam et vaginalem. Vid. qui optime de hydrocele scripsisse videtur SHARP'S *Treatise on the Operations* Cap. XI. p. 32. Pluribus autem Autoribus opinionem huius hydroceles fecisse videtur tumor, qui in tunica vaginali et dilatata per confluentem humorem cellula oritur, et ubi humor, velamento quasi suo, et cystide inclusus, inter vaginalem et erythroideam reperitur. Hoc vero si incidit, ut plurimum humor etiam est inter testem atque vaginalem tunicam. In entero- et epiplooele non raro etiam in peritonaei tuni-

tunicam, seu faccum, humorem destillare, alibi retuli (836). Humor vero sub ima vel albuginea testiculi tunica esse non potest, nisi hic vitiatum sit, induratusque, qualis in sarcocoele esse solet. Hydrocelem, in qua humor tribus locis deprehensus fuit, describit LE DRAN T. II. Obs. 75. p. 159.

† Hydrocele dicitur familiarior esse incolis regionum australium; frequens quoque est inter Britannos, vid. WARNER in *An Account of the testicles*, London 1774. KAEMPFER quoque commemorat hydroceles speciem inter regni Cochini incolas endemicam; *Malabaricam* vocat, vid. *Amoenit. Exot. Fasc. III. Obs. 7*. Scriptorum de sede varia hydroceles opiniones enarrat PERCIVAL POTT in *Treatise on the hydrocele*, London 1773. p. 6. seqq. Item BONHOEFFERVS in *Dissert. de hydrocele*. Argent. 1777.

§. 862.

Certis et supra positis indiciis (844) cognoscitur, humorem subesse. Si humor digito premitur, is, vel circumfluit, vel, si vehementer increuit, tumor renititur, sicut vter repletus et arcte adstrictus, in quo tamen plerumque testiculus, neque visu, neque tactu, sentitur. Tumor sine omni dolore est, qui, si quandoque leuior sit, se nunquam ex toto remittit, nec pressus desidit. In inguine vero eaque sede, vbi arteria venaque, ex quibus testiculus dependet, ex annulo educuntur, tumoris vel nihil est, vel parum, pro magnitudine illius, quo inferius scrotum intenditur. Si etiam humor, qui intus est, multum increuit, nullum vero vitium contraxit, is tanquam in vitro cornuue per scrotum apparet: qui vero, si foeculentus est, percrausus, colore luridus et ater, ita haud distinguere potest. Causas praeterea, ex quibus varia herniarum ac tumorum genera nascuntur, etiam indicia diversarum specierum ostendere, supra retuli (842).

§. 863.

Sunt alia indicia, quae sedem humoris ostendunt. Non parum enim hydrops scroti ab hydrocele discrepat. Nam si tunica illa cellulosa, quae sub scroto est,

et

et quae illam membranam, quam *δακτύον* vocant, vtrinque tegit, humore intenditur, scrotum sine rugis est aequale albidius et magis omni sua parte tumidum. Vitium autem plerumque cum hydrope per vniuersum corpus oriente esse solet. Tumor mollis est, qui prementi digito cedit, et se eo sublato tardius attollit. Intumescit etiam cutis, quae super glandem est, adeo, ut ea fistulam quoque urinae intercludat. In hydrocele tumor prementi magis renititur, remoto digito, subito attollitur. Scrotum vero rugosum, coles minor est et contractior, qui fere sub tumore delitescit. Tumor etiam non nisi vnum scroti latus plerumque occupat.

† Hydroceles nomen diuersis morbis ab Auctoribus impostum est. Hydrocele vera est ea, quam PLATTNERVS paulo antea descripsit, estque hydrocele testis, vbi aqua inter vaginalem testiculi tunicam, qua testis vbique laxè comprehensus est, colligitur, tanta tandem mole, ut testem eius lateris nullum esse opineris. Alia hydrocele est funiculi spermatici, vbi aqua vel per omnes cellulas cellularis processus peritonaei, vascula funiculi connectentes diffusa est, vel cellulis eius quibusdam in speciem sacculi aut hydatidis mutatis continetur. Illam vocant anasarcam funiculi spermatici, hanc dicunt hydrocelen cysticam funiculi spermatici. Est aliud genus, reperiendum in sacco herniae scrotalis, quod igitur complicatum est cum ea ipsa hernia vera. Huic analogon est id genus, quod in infantibus tenerioribus nonnunquam obuium est, quando scilicet a descensu testiculi ex abdomine in scrotum relicta fuit cavitas in processu peritonaei, quem testis ex hoc eduxerat; in ea enim tum interdum aqua colligitur; quae quia per hiatus eiusdem processus communionem habere potest cum cauo imi ventris, subinde evanescit et reuertitur. Quamobrem hoc genus cognomen *pneumatocelen* meruit.

§. 864.

Hydrocele oritur, si venae lymphae accommodatae rumpuntur, vel, si compressis arctatisque sanguinis itineribus humor libere reuerrere nequit. Igitur, si testis, id quod equum conscendentibus, vel effreno equo vectis, quandoque accidit, femoribus submittitur

tur, et is hac aliaue occasione allatoque iēſu valentius premitur; Si arteriae venaque, ex quibus teſticulus dependet, aliquid ſuperimponitur, et illae a deuolutis inteſtinis atque indurato omento, a veſtibus vel viſtura, bubonocēles cauſa admota, premuntur; Si alius tumor, ex oſcheocele, vel ſarcocele, ortus, ex iis dependens, eas multum adducit et venas multum coarctat, hoc vitium naſci ſolet. Ex his etiam intelligitur, quandoque id per ſe oriri, quandoque id eſſe cum aliis herniarum generibus.

§. 865.

Hoc valetudinis genus ſine dolore et fere ſine periculo eſt. Si humor vehementer increſcit, quandoque is perrumpit per intentas membranas et effertur glutinato autem vulnere is iterum circa teſticulum increſcit, id quod etiam euenire ſolet, vbi is incifo tumore effunditur. Non ita timenda eſt hydrocele quae non facile ad gangraenam aliaque vitia, quae maius periculum habent, ſpectat. Nec ea, ſi modicus tumor ſcēcia exceptus ſuſpenſus teneatur, prohibet quo minus ad vltimam ſenectutem perueniant homines. In corpore, quod mali habitus eſt, et ſi humor intus ex admixto ſanguine putris eſt, is teſtem cutimque erodere poteſt, ita, vt mala vlcera fiſtulaeque oriri quandoque poſſint.

§. 866.

Superuacua ſunt plerumque medicamenta, quae extrinſecus admouentur, ſi humor penitus inſedit. Quo minus vero tumor ad maiorem molem increſcat prohibet ſcēcia (132.845). Scalpelli opera neceſſaria humorque effundendus eſt, qua tamen curatione morbus non tollitur, ſed ad tempus leuatur, cum tumor poſt interuallum vtplurimum rurfus aſurgere ſoleat. Tumorem plures aperiunt illo ferramento, quo aſcite labo

laborantibus aqua ex abdomine emittitur (756). Praestat vero, scalpello vti ancipiti, quo alias, si sanguis mittendus est, venae inciduntur. Chirurgus sinistra prehendere debet tumorem, ita, vt humorem, quantum valet, a superioribus et teste ima versus propellat, et post audacter transuersas membranas secare, donec perueniat ad humorem. Plaga facienda est in parte inferiori atque externa tumoris. Nisi cum periculo laeditur illa membrana scroti, quae testiculos diducit, et quam in scroto linea, quam ἑσφὴν vocant, indicat, quippe arteriam comprehendit, ex qua sanguinis profusio timeri potest. Vbi omnis humor effusus est, linamenta eatenus imponi possunt, vt vulnus tegant, et id glutinari.

§. 867.

Si nihilominus vel scalpello praecisa vel rupta fuit arteria, et sanguis cum impetu ruit, quod vitium alii αἱματοκῆλην vocant, sine mora omnis humor euocandus, vulnus latius aperiendum, idque purgandum est, vt rupta arteria oculis pateat. Sanguis deuincta compressaque arteria vel admotis medicamentis cohibendus, et vulnus percurandum est. Si vero is non quiescit, vel, si testiculus ictu, aliaue re, ita laesus est, vt seruari non possit, id quod humor, qui exit, significat, si is ater, faeculentus et mali odoris est, promendae sunt arteriae venaeque, ex quibus is dependet, illaeque lino deligandae et praecidendae, testiculusque tollendus est (857. 858. 859).

§. 868.

Si incisus superioribus membranis humor non omnis effluxit, et eius maior adhuc modus subesse deprehenditur, altius demittendum scalpellum est, quo is, qui inter mediam imamque tunicam concurrat, etiam exeat. Sedulo videndum, ne quod ex secti-
one

one periculum sit, quod esse potest, vbi cum liquor etiam intestinum subest, quod sine pernicie vulnera nequit.

§. 869.

Si vero effuso sic humore sanitas ex toto reddita haud fuit, et is iterum renascitur, et si vehementi malo vehementiori auxilio succurrendum est, medentes etiam in varias curandi vias processisse legimus. Quidam praecipiunt, vt acus linum trahens ex pluribus filis compositum tortumque per tumorem traiciatur, vtque id linum, quod in vulnere relinquitur bis in die sic ducatur, vt tumorem subeat pars, quae superior fuit. Linum vero aliquo medicamento illinendum esse addunt, ex iis, quae callum exedunt atque aliis, quae pus alunt. Moto enim pure testicul. membranas, quas callus obduxit, purgari, callum resolui et illud humoris profluuium tandem vinci.

§. 870.

Alii, qui idem moliantur, tumorem facta patentiore et ab inguine ad imum scrotum descendente plaga aperiunt, testiculi membranas, vel scalpello, vel si aliquis medicamentum mauult, adurentibus exulcerant, atque etiam suppurationem excitant. Vtrique vero vlcus, vbi per plures dies nihil humoris ex eo effluit, illudque penitus siccescit, ad cicatricem perducunt. Nec desunt, qui, tumorem non scalpello sed impositis adurentibus aperiendum esse, existimant, cum iis protinus pus citari possit.

§. 871.

Curationibus vero his difficultatem facit inflammationis vehementioris timor. Nam non solum incisis et exulceratis tunicis, sed ipsi etiam testiculo, inflammatio superuenire solet, quae, si cum magno dolore atque febre est, aegrum in malis esse ostendunt.

Testi-

Testiculus enim cum inflammatione intumescit, vt videtur, eam ob causam, quam supra adduxi (854). Id vero significat lumborum dolor, si is aegrum etiam molliter cubantem affligit, qui, si increbrescit, pessimum signum est. Qua ratione his succurri possit, tibi proposui (130. ad 133), vbi etiam executus sum, quae scroto, si id inflammatum est, idonea sunt (134).

§. 872.

Vbi autem tumor maiori plaga incisus, orae etiam exulceratae fuerunt, id quod sine inflammationis periculo haud fieri potest, et vbi nihilominus vulnus adiuu madet, multum proficiunt cataplasmata et emplastra, quae plurimum emolliunt atque pus citant (91. 12), si ea diutius et sine intermissione superhabentur. Quandoque enim illa ea sede, vbi humoris exitus est, ouum tumorem doloremque faciunt et suppurationem excitant atque felicem curationis exitum ostendunt *. In omnibus vero curationum generibus liamenta leuiter et ita imponi debent, ne iis arteria et ena spermatica premantur (132. 854. 855). Homo semper supinus in lectulo contineatur, et fascia, siue suspensorium, subiiciatur tumori.

* Sectione et facta patentiori plaga, admotis etiam non solum propter inflammationem, sed etiam propter pus mouendum, cataplasmatibus et emplastris haud ita pridem hydrocele curata fuit, ex qua iam liquor bis frustra emissus fuerat. Vitium ortum erat ex compresso valentius inguine per arcubalistam, qua sagittae emittuntur.

† Curatio hydroceles varia et multiplex inde ab antiquioribus temporibus reperta est. Si morbus tantummodo localis est, neque recentior, medicamenta intus sumenda fere superuacua sunt. Si ab vitio quodam vniuersi corporis ortus fuit, aut id progressu temporis accessit, medicamentorum id vitium corrigentium tollentiumue vsus necessarius est, quacunque via medendi locali vtendum esse videatur. Aduersus hydrocelen recens ortam, quae nullum alium morbum, seu causam seu comitem, habet, medicamenta extrinsecus adhibenda, efficaciora quidem discutien-

tia, experiri licet. Iis autem nihil proficientibus, morbu
 simplex, non nimium increfcens, trahi debet, vsum rerum
 non naturalium apte instruendo, atque fufpenforium ido-
 neum adhibendo. Si quod vitium testiculi fimul fubel
 immedicabile, refectio testiculi fiat, nifi quid fit, quod pro
 hibeat. Vbi vero hydrocele fine alio morbo eft, eaqu
 mole fua moleftiam aegrotto creat, efficaci chirurgia opu
 eft, fiue morbum radicatus tollendi, fiue minuendi et le-
 vandi animus fit. Palliationem, quam vocant medici
 descripfir PLATTNERVS; quae, quamvis raro, tamen tan-
 dem aliquando concitata inflammatione fanationem radi-
 calem efficit. Hanc autem certo perficere fi statutum eft
 ex diuerfis illis viis curandi eam eligere rationi conuenit
 quae et efficacior, et tutior, et fimplicior fit. Laudes ea
 meretur ea ratio, qua et fcrotum et tunica humorem com-
 prehensens incifione longa (§. 870.) diuiduntur. Ita enim
 nihil alieni retinetur, et testiculi habitum fanum morbi
 dumue dignoscere datur. Incifio autem tunicae vaginali
 a quibusdam forfice, ab aliis fpecillo fulcato et cultro pro-
 ducitur. Alii vero in incifam eam cystidem protinus e-
 anteaquam omnis humor effluat immittunt manus finiftrae
 digitum, vt eo duce mucro cultri tuto dirigatur, dum
 facta fit fufficiens tunicae illius dilatatio. Reliqua curatio
 fpectat doloris lenimen, febris moderamen, inflammatio-
 nem futuram etc. Atque methodum hanc laudant vel illi
 qui alia via lubentius incedere folent, v. c. POTT, cui in
 hoc genere multi multum tribuunt. Quodfi magna aqua-
 rum collectio eft, tunica igitur vaginalis et fcrotum nimi-
 um extenfa, recte agitur, fi antea facta pertufione tumoris
 aquae emittuntur, ipfa autem feftio in futurum tempus
 differtur. Nam emiffis aquis chirurgus de conditione
 testiculi tactu iudicare potest, partes vero antea nimium
 tenfae iam relaxatae moram nancifcuntur, fele contrahend
 et robur aliquod recuperandi. Facta post noua aquarum
 collectione, at mediocri, feftio et curatio radicalis felicio-
 rem profectum habet. Siue autem praemiffa pertufione,
 fiue non praemiffa, cultro feftio facta eft, et tunica vagina-
 lis crassa et dura, quam fuppuratio abfumere nequit, quic-
 quid eius fponfe non fecedit, cultro, fed magna modera-
 tione adhibita feparari debet. De hac ratione vid. SA-
 BATIER in *Monum. Acad. R. Chir.* T. V. Curatio autem
 radicalis eo fit, quod inflammatione et fuppuracione me-
 diocri mota tandem cystis cum ima testiculi tunica con-
 crefcit, atque adeo noui humoris collectio fieri nequit.
 Cum vero multi aegrotantium tam longam fcroti fectionem
 horreant, chirurgi omnium aetatum de aliis medendi ra-
 tionibus cogitant, quae inflammationem et fuppuratio-
 nem mouere pollent. Nonnulli igitur v. c. RVYSCHIVS in

Adversar. Anatom. Decad. III. et WARNERVS l. c. In minorem plagam, qualis palliandi causa sit, turundam indunt, irritandi causa; alii, ut MONROVS in *Medical Ess. and Obs. Vol. V. P. I.* eodem consilio cannulam acus triquetrae in loco puncturae relinquunt. Verum vehemens dolor et gravis inflammatio postea saepius, nec tamen saepius, quam volunt, perfecta curatio sequitur. Fuerunt quoque, qui iniectis liquoribus variis, tanquam spiritu vini, vel vino rubro, aqua vulneraria, camphora, inter se remixtis vterentur qua de ratione vid. SABATIER l. c. Paucis via haec probata est. Setacea veteres ut GALENVS *Method. medend. L. IV. GVIDO DE CAVLIACO Chirurg. Tr. VI. Doctr. II. C. I.* dudum adhibuerunt. Eos duces nostra aetate secutus POTT fere nimius est in celebrandis huius methodi laudibus; quem vide l. c. Medicamenta caustica quidam, ut docet PLATTNERVS, ad cystidem exulcerandam et suppurationem excitandam, aperto antea scroto, admoerunt. Longius progressi aetate nostra sunt Britannorum quidam, in primisque ELSE, chirurgus peritus, qui in *Essay on the cure of the hydrocele of the tunica vaginalis testis, London 1770* edito libro usum causticorum scroti parti inferiori anteriorique impositorum caeteris medendi rationibus praefert. Lapidis autem infernalis seu caustici alius particalam nummo Britannorum, qui ipsis *Schilling* dicitur aequalem eo loco scroti applicatam per quinque et horas amplius, aliquando per nycthemeron relinquit, ut non modo scrotum sed et tunica vaginalis testis aduratur, fiatque inflammatio, suppuratio, destructio tunicae vaginalis, testisque coalitus cum scroto. Plura vid. in Libro eo ipso vel in RICHTERI *Biblioth. Chirurg. T. I. P. I.* Si fides habenda est ELSIO, tuta admodum haec curatio est; nam ex multo tempore in *nosocomio ad D. Thomas* sine haesitatione adhibetur. Virum ea ratione curatum quidem vidi, quem tamen tussis protinus superueniens, et ex ea orta tabes, ex viuis sustulit.

†† PLATTNERVS de hydrocele funiculi spermatici nihil dixit. Eius genera duo sunt. Aliud vocari potest *anasarca funiculi spermatici*, quando scilicet aqua per omnes cellulas eius tunicae, quam vulgo tunicam vaginalem funiculi spermatici nominant, diffusa est. Aliud nominatur *hydrocele cystica funiculi spermatici*, ubi aqua collecta est in tumore seu cystide formata ex vna vel pluribus cellulis tunicae illius. Prior illa hydrocele tactu mollis est et diffusa per totum funiculum, immo vero aliquando per annulum abdominalem porrigitur in cellulas eas, quae vasa spermatica in imo ventre concomitantur. Potest tum esse opinio de epiplocele. Hydrocele cystica tumorem seu quasi vesicam offert tactui scrutantis medici, oblongam, eam, et ouo

F f 2

maiori

maiori minoriue similem. Haec plerumque est morbu localis, neque a vitio reliqui corporis genitus. - Sed anasarca fere semper ab hydropica corporis constitutione efficitur. Neuter eorum tumorum pertusione sola certo curatur. Sectio igitur facienda est, qua facta et aqua effluunt et suppuratio consequens radicalem sanationem promittit. Interdum opus esse potest membranularum iponte non secedentium separatione cultro vel vno vel pluribus actibus peragenda. Nonnulli etiam ad abscidendas membranulas adurentibus vtuntur. De hydrocele haec vid. DOUGLASS in *Treatise on the Hydrocele*, London 1755. PERCIVAL POTT in l. c. SCHMUCKER L. saepius cit. T. II.

HYDROPS SCROTI.

§. 873.

Ad scroti vero tumorem (733. 863), si is cum hydrope in adulto est, vtendum est iis, de quibus alibi dictum est (739. ad 743), et de quibus medici praecipiunt. Si tumor concidendus est, vt humor exeat, vtendum est scalpello tenui atque bene cultellato. Post magna cura adhibenda, ne gangraena nascatur, id quod etiam accidere solet, si humor per se tenuatam cutim perrumpit, vel erodit (737).

§. 874.

Quandoque pueri nascuntur, quibus scrotum intumuit, quae res oriri videtur, si infans in vtero ita compositus fuit, vt verenda pressa fuerint. Tumor saepe per se dissipatur, opitulantur vero vegetabilia, quae resoluunt atque discutiunt (49), si ex vino rubro, vel aqua, cui acre acetum adiectum fuit, coquuntur, et panni ex liquore bene expressi calidique imponuntur. Nec inutilia sunt emplastra, de cumino, diaphoreticum, si ei aliquid ex emplastro de meliloto adiicitur. Tenerior vero cutis saepe emplastrorum impatiens est, quae, si id deprehenditur, protinus tolli oportet.

† Scroti

† Scroti hydrops adeo interdum increfcit, vt, nifi aquae emittantur, gangraenae et fphaceli timor fit. Emissio fieri paulatim debet, ne partes natura fua laxae, morbo autem magis relaxatae fphacelo corripiantur. Itaque nec longa profundaue fectio, nec plures fcarificationes fiant, alioquin omni humore fubito effluente partes folidae flaccidiores omnem humorum per fefe motum protinus fuflaminant, ideoque emortuae fiunt. Aut paucae incisiones in fuperficie cutis aut pertufio acu triquetra facta eum metum minus parit quidem, vt nihilominus poft amaris et roborantibus diligenter vtendum. Ab emiffione aquarum fanationem integram fieri perquam rarum eft. Intus funtorum medicinarum actio iuuatur.

K I P Σ O K H Λ H.

§. 875.

Superest, vt de genere vitii dicam, quod olim Graecis *κισσοκήλη*, Latinis ramex *, dictum fuit. Interdum enim venae crebrius commemoratae, vbi per inguen ad testiculos descendunt, intumescunt, et, quasi conglomeratae, tum inguina, tum scrotum, implent. Vel oculis patent, vel, si magis conditae non aequae quidem cernuntur, habent aliquid tumoris provenarum magnitudine et modo, qui prementi etiam renititur. Vitium nascitur, si sanguis in corpore malus est, crassus, ater atque concretus, qualis interdum esse solet litterarum cupidis, et quibus studii ratio omnem corporis curationem exercitationemque detrahit. Nec minus hoc aliis frequens est, quibus totus corporis habitus ex scorbuto, cachexia, aliisque diuturnis grauibque morbis, vitiatus est. Non raro etiam venae iis tument, qui concubitus nimis concupiscunt, vel, qui inflammato animo venereis cogitationibus immorantur. Solent etiam interdum hae sedes ex illato ictu intumescere, vel, si venae perizomate, aliaue vincitura, compressae fuerunt.

* Vide de hac voce IOH. BEVEROVICII Epistolicae quaestiones p. 99.

† A testiculo venereo ramicem relinqui rarum nostra aetate non est; saepe autem medicamenta intus forisque adhibita nihil quicquam proficiunt. Ramicem facit interdum fluxus haemorrhoidalis impeditus repressusque, nec non viscerum inferiorum obstructio; aut certe haec et ramex ab eadem causa, quae in prauitate humorum cernitur, efficiuntur. Plerumque ipse testis et epididymis habet aliquod vel euidentius vel occultius vitium, quod facit, quò minus sanguis per arterias expedite promoueri et per venas prompte reuerti possit. Aliquando ramex tantae molis est, ut, quia quoque mollis est, epiploceles suspicionem moueat, maxime si vasa funiculi non in scroto tantum sed et in loco annuli et ultra hunc in ventre tument. Hoc postremo casu annulus ita ampliari potest, ut ramex herniae verae causa fiat. Plerumque quidem ramex dolore molestus non est. Iusto maior tamen dolorem mouet modo obscurum modo acutum sursum per lumbos, deorsum per femoris internam regionem ad genu usque tendentem.

§. 876.

Hoc vitium inter initia facilius auertitur, quam, si id vetustate confirmatum est, tollitur. Illud causae aestimatio soluere aliquando potest. Si vitium in toto corpore consistit et sanguis abundat, is mittendus est, et cum corporis exercitatione adhibenda dilutissima et frigida potio. Multum solent his prodesse aquae minerales. Aliis cum his victus subtrahendus est, et cibus dandus, qui minus alimenti praestat. Hi etiam monendi sunt, ut animum a libidinosis cogitationibus abducant. Si vero venae, vetustate iam occalluerunt, vitium haud facilem curationem recipit. Autores multi sunt, incidendas esse tumidas induratasque venas, et sanguinem concretum ex iis educendum, vulnera vero iterum ad sanitatem perducenda. Sed hoc vix sine periculo fieri poterit, nisi remissiores laxioresque venae fuerint. Nam in aliis, quae occalluerunt, sectio non sine periculo est. Metuendum etiam, ne ex vulnere relicta cicatrix venas magis devinciatur prohibeatque, quo minus sanguis in cas permanere sine impedimento possit.

† Ramicis curationes ab A. C. CELSO L. VII. C. 22. commemoratae hodie vix administrantur. Ramex maior et dolorem creans vix curatur, nisi resectione testis, quae tamen, si tumor per annulum abdominis in ventrem protenditur, non tuto administrari potest.

ΦΙΜΩΣΙΣ.

§. 877.

Si glans ita contacta est, ut nudari non possit, *Φίμωσις* dicitur. Quod vitium aliquando urinae iter praecludit, crebrius etiam prohibet, quo minus medicamenta, si his opus est, inter glandem et cutim ingeri possint. Hoc pueris interdum naturale et a natiuitate est. Caeteroquin hoc iis, quibus maius et spatiosius praeputium est, crebrius ex aliis occasionibus incidit, praecipue, si vel hoc, vel glandem, illud malorum ulcerum atque verrucarum genus, quod ex tabo venereo nascitur, infestat. His enim verrucis subduris, et ulcerum, si illis callus inductus fuit, oris callosis, premuntur venae per cutim discurrentes, ut humor per eas reuertere nequeat; id quod praecipue incidit, si ulcera frenum et glandis elatiorem circulum occupant. Acris praeterea ac purulentus humor, qui gonorrhoea laborantibus ex urinae itinere fertur, si inter glandem atque praeputium confluit, has partes rodit, inflammationes mouet et exulcerationes excitat. Neque dubium est, ex alio humore subpingui, qui ex glandulis in glandis circulo positus exit, et quo, et cutis, et ipsa glans, naturaliter circumliniuntur, si is, vel vetustate, vel ex venereo tabo, acrior fit, prurientem exulcerationem fieri; et interdum *Φίμωσις* nasci *. Etiam obseruatione notatum legimus, eadem sede, inter glandem atque eius cutim concreuisse plures calculos, qui his partibus inhaerentes

tes etiam inflammationem mouerunt et hoc vitium attulerunt **.

* Est peculiare gonorrhoeae genus, si vitiatus humor in rara et spongiae affimili glande haeret, et haec cum quasi exsudat. Vide BOERHAAVI Praefat. in Aphrodisiacum, et Celeb. ASTRVCCIVM de Morbis venereis L. III. Cap. III. §. 2. p. 190.

** V. H. A. R. Sc. MDCCVI. p. 30.

† Mala etiam curatio vlcera cancrofora a contagio venereo ortorum interdum pessimum genus huius morbi relinquit, idque immedicabile. Quale ego vidi quondam in iuvene alioquin sano, iucundo et honesto, quem imperitum focii sui in lupanari cum scorto commiserant. Ex concubitu eo igitur contraxit vlcuscula venerea et in glande et intus in praeputio. Quae cum ab imperitissimo chirurgorum ministro medicamentis externis digestiuis et acrioribus quoque purgata essent, praeputium et glans vndique et arctissime concreuerunt, sic vt vrina vix liberum exitum haberet, nulla prorsus mobilitas praeputii esset, et, quod complementum malorum erat, concretio ea non laevis esset, sed iacturam substantiae per cauas cicatrices euidentissime proderet.

§. 878.

Nonnunquam hoc vitium medicamentis remoueri potest. Emollientes herbae ex lacte coquantur et decocto eiusque vapore foueatur coles. Super hunc etiam panni collocari possunt bene calidi ex hoc liquore expressi. Is etiam mediante siphone crebrius inter cutim glandemque inferendus est. Homo desidere debet in aqua cum mollientibus incocta. His enim efficitur, vt relaxata extenuataque cutis reducenti pareat, id quod vi quoque experiendum est. Tum superdari medicamenta possunt, quae vlcera ad sanitatem perducunt, de quibus dicam, cum ad vlcera peruenero.

§. 879.

Si vero his parum profectum est, cutisque haud sequitur, malum, quod medicamentis non cedit, manu curandum, et glans scalpello aperienda est.

Sunt,

Sunt, qui cutim, quae super glandem est, adducunt atque extendunt, eamque protinus forfice praecidunt. Sed praestat, cutim ab inferiori parte recta linea glandis circulum versus incidere, et sic glandem nudare. Ad id idoneus est minor et admodum tenuatus scalpellus, isque aliquantum falcatus. Huius mucroni adfigitur cera, quo is, sine offensione inter cutim glandemque ad huius circulum usque possit demitti. Hoc ubi factum est, mucro inclinatur, ut is per ceram compulsus transuersam cutim a summo glandis circulo ad extremum usque secet. Commode etiam res forfice agitur, cui alter mucro retusus est. Necessarium vero est, ut ante sectionem minister cutim super collem digito prehendam, et quantum potest, pubem versus trahat, quo glans tota hac sectione aperiatur.

§. 880.

Discindi vero solet cutis ea parte, qua occalluit. Nam duritia ostendit, eo loco potissimum ulcera subesse, quae incidi commodissimum est. Si vero inferior cutis inciditur, glans non satis pateferi potest. Melius res succedit, si superior cutis secatur, ubi tamen metuenda est grauior sanguinis profusio, quam suppressere non ita facile est. Commodius igitur cutis e latere inciditur. Si aliquae membranulae prohibent, quo minus cutis a glande diduci queat, illae scalpello resoluantur, donec tota glans ante oculos sit. Ne etiam sanescente vulnere cutis cum glande cohaerescat, interponenda sunt linamenta, quae id prohibent.

† Si cultellus vel forfex inter glandem ac praeputium per loci angustiam inferri nequit, sectio ab exteriori cute praeputii ordianda est, et magna prudentia adhibita paulatim cellulositas et interior praeputii tunica persequenda sunt, nisi fortasse cute exteriori diuisa reliquum praeputium laxetur sic ut iam cultellus inter glandem et praeputium dari facilius et liberius possit. Quocumque loco praeputii dissectio-

dissectionem feceris, absoluta curatione pars praeputii diuisi non modo nullius vsus est, sed et congressum cum foemina impedit. Quam ob rem optimum videtur, flaccidam eam partem protinus sectione orbiculari ita praefecare, vt ne culter fraenulum vlla ratione laedat.

OEDEMA PRAEPUTII.

§. 881.

Hoc vitium, quod alii tumorem, vel bullam crySTALLINAM, appellant *, et quod frequentius priori vitio accedit, ex similibus causis oritur, si lymphae per ei accommodatas venas in alias sanguini idoneas reuertere nequit. Id, nisi ei minime distans curatio adhibeatur, ad gangraenam spectat. Aduersus id vero etiam auxilium in emollientibus est, ex quibus fomenta, epithemata atque cataplasmata fiunt et superhabentur. Si vero tumor iam gangraena affectus est, emollientia ex aqua, quae calcem viuam exceperit, coqui, et iis adijci possunt alia, quae vlceri purgando idonea sunt, radix ireos Florentinae, aristolochiae, herba rutae, absinthii. Aliena sunt omnia, quae lympham cogunt et inter haec praecipue alcohol cum camphora.

* Vid. Celeber. ASTRVCCIVS l. c. T. I. L. III. C. VIII. p. 361. Edit. nou.

ΠΑΡΑΦΙΜΩΣΙΣ.

§. 882.

Contra, si glans, quae naturaliter longiori, atq; nimis arcta, cute contacta fuit, ita nudata est, vt haec rursus induci nequeat, παραφίμωσις vitium dicitur. Esse solet cum magna inflammatione, ex qua omnia magis intumescunt, praecipue, si inflammato freno, siue illa membranula, qua praeputium coli inferius adstringitur, hic retrahitur, vel, si is inflatis corporibus cauernosis tentigine rumpitur.

§. 883.

§. 883.

Id ex varia occasione nascitur, frequentius, si ex inflammatione coles intumuit, et praeputium, quod quandoque in iunioribus valde angustum est, vi adhi-
ta fuit diductum. Inflammatio saepe oritur, si vlce-
ra, vel in glande, et ultra eam in cole, vel in praeputi-
i posteriori parte, sunt, illaque latius altiusque serpunt.

§. 884.

Si coles ex tentigine intumuit, interdum expedi-
tior curatio est, si ei frigida imponitur, vel, si homi-
nis haud opinantis lumbis frigida affunditur. Cum
his et glans et cutis oleo inungi et haec circa glan-
dem, vel digitis, vel fascia vnientē, prehendi et rursus
induci debet. Si vero vlcera, vel glandem, vel cutim,
affestant, iisdem rationibus (878) adhibendum lactis
omentum est, et acris humor eluendus. Nec alie-
nus est cremor ex semine cydoniorum et psylli (173.
888).

§. 885.

Si autem coles vehementer ex inflammatione in-
tumuit, incidi potest vena, quae superius per tergum
colis fertur, et per quam sanguis ex corporibus cauer-
niosis reuertitur. Si autem nec hoc modo malum
victum fuit, minime differendum, sed protinus inci-
denda et ipsa cutis ea parte, qua illa colem arctius
comprehendit, et quasi strangulat, sic, vt prius cutis,
quantum fieri potest, versus pubem reducatur. Vulnus
ita glutinandum, vt cutis increseat et latitudo cicatri-
cis satis velamenti praestet. Videndum etiam, ne cu-
tis glandi agglutinetur (880). In omnibus his cura-
tionibus necessaria est potio dilutissima atque victus a-
liame propior. Coles etiam semper sursum et ad
ventrem deligari debet.

† In illa cutis incisione diligentius cauendum est, ne scapellus iusto altius imprimatur, neque tunica aponeurotica qua corpora cauernosa vestiuntur, laedatur. Eius enim vulnus cicatrice non coalescit; itaque postero tempore quoties membri genitalis tentigo est, tuberculum aliquod erumpit, quod progressu temporis mole sua congressum cum foemina impedit.

Fit autem ex paraphimosi aliquando glandis gangraena quae non semper corpora cauernosa corripit, sed glandes flaccidam, marcidam reddit, sponte casuram. Partem colli anteriorem seu ob gangraenam seu vlcus cancrum profundius amputatam curaturus prouidere debet, ne vrethrae meatus cicatricem contrahat claudaturque.

V E R R V C A.

§. 886.

Super varias corporis sedes, praecipue super faciem atque manus, verrucae interdum eminent, quorum diuersa nomina sunt. Ἀγκροχρόδονα vocant, si tuberculum durum est et asperius, ad cutem tenue supra latius. Ἀγκροθύμιον vocatur, quod ad cutem latius, supra tenue, subdurum et in summo perasperum est, et in quo summum colorem floris thymae repraesentat. Μυρμηκία humiliora durioraque sunt: infra lata, supra tenuia *. Pessimae verrucae in obsoenis nascuntur ex venereo morbo. Quibusdam porri dicuntur. Saepe finduntur, et aliquantum sanguinis fundunt.

* Vid. CELSVS L. V. C. 26. §. 14.

§. 887.

Nascuntur ex papillis nerueis, quae in cute, labris, penisque glande, sunt, si hae intumuerunt atque induruerunt. Hoc accidere videtur, si illarum radices varia occasione ita premuntur, ut humor, quo illae aluntur, reuertere nequeat. In hominibus lue venerea aegris hoc accidit crebrius in glande penis, in qua plures et exquisitum sensum habentes papillae sunt,

sunt, vel, quod tenerior et cellulosa tunica, quae in glande penis sub cuticula est, et qua papillae conteguntur, ab acri humore exesa fuit *, vel, quod radices papillarum a virulento humore affectae induruerunt **. Id quod etiam in cute fieri a vero propius est. Ex his intelligitur, cur excisae etiam vel medicamentis adustae verrucae renascantur, nisi etiam tollantur radiculae, quas quandoque altius exigunt.

* Vid. BOERHAAVE Praefat. in Aphrodisiacum.

** Cel. ASTRVCCIVS l. c. L. III. C. IX. p. 280.

† Verrucae saepius quidem a causis leuioribus externis, immunditie etc. efficiuntur, non raro tamen a vitio quodam humorum, quamuis non venereo, originem habent. Cuius suspicio est, si plures oriuntur. Atque id genus aliquando contagio nocet, neque nisi purgatis humoribus curatione, quae in loco fit, tolluntur. Correctio saepius quidem ea fit mutata victus ratione in pueris et liberiori vsu aeris puri atque exercitationis corporis; aliquando tamen medicamentis opus est. Si scabiosa vel venerea affectio subest, neque quod contraindicans est, subinde aliquid mercurii dulcis et decoctum radicum demulcentium; si acido mucosa materies, sapo cum extracto quodam amaro profunt.

§. 388.

Nonnunquam per se finiuntur verrucae, ex quo incidit, vt plures alia atque alia auxilia aduersus eas proposuerint, vt magis appareat, quid quisque sibi persuaferit, quam, quod euidenter compererit. Tolluntur, si, adhibita prius frictione, scalpello raduntur atque praeciduntur, et radiculae etiam conciduntur, super plagam vero dantur medicamenta adurentia. Ex horum numero reliquis praeferri debet lapis infernalis: Adhiberi etiam potest butyrum antimonii, spiritus vitrioli, nitri. Si verruca parum dura est, illa quandoque succo esulae et chelidonii obedit. Ne, quae circa sunt, exulcerentur, ea contegi possunt emplastro, quod in medio foramen habet, vt ex ea verruca emineat. Etiam cura habenda est, ne adurentia sub-

subiectas alias partes, praecipue tendines, laedant, graues inflammationes moueant. Cuius rei maior metus est in palpebris, quae summam teneritatem habent *.

- * Quamdiu haec medicamenta palpebris admouentur, oculum inferi debet axungia, quo eius membranae custodiantur. Hominem oportet pronum cubare, ne acre medicamentum inter palpebras defluat. Vide historiam infelicitationis in BIDLOO Exerc. Anat. et Chirurg. IX. in Op. pag. 114.

§. 889.

Quidam verrucam, si in cute est, multum et per plures dies perfricant, illique emplastrum imponunt atque sic molliunt, post circum circa cutim incidunt et tuberculum vossellaprehendunt, atque ita euellunt ut etiam radícula sequatur, nihilominus plagae adurentia illinunt. Ἀρροχόεδον, si lino vehementius adstringitur, emoritur. Verrucae, quae ex venereo morbo enatae sunt, si tolluntur, reuertere solent, nisi vitium quod in humidis est, idoneis medicamentis elidatur. In maiori vero vetustoque malo maior vis necessaria est. Percurato vero morbo venereo ad tollendas verrucas satis lenia medicamenta proficiunt.

- † Exiguam guttulam cantharidum tincturae aliquoties die verrucis admotam facile et commode eas tollere a medico quodam inter Belgas scriptum est. Vanum eius usum fuisse aliquando compertus sum. Verrucae durae, liuidae ab erodentibus saepius ita exasperantur, ut in cancrum degenerent, inprimis illae, quae in labris germinant. Neque alia ratio medendi locum habet, nisi resectio, qua quicquid duri circa verrucam est, una cum ea auferitur.

C L A V V S.

§. 890.

Claui in pedibus maxime nascitur, qui dolorem impatibilem ingredienti mouet. Radiculam habet, quam etiam quandoque altius, et ad digitorum tendines, imo ad periostium vsque exigit. Nascitur, si pedes horumque digiti arctioribus vrentibusque calceis comprimuntur. In cute enim, vel etiam tendine ac ossis membrana, compressis ea ratione minoribus fistulis, humor per eas reuertere nequit, sed effluit et inter minores fibras occalescit. Huic etiam, pressu, si manet, quotidie et incrementum et maior duritia accedit, ita, vt tandem compressis etiam sanguini accommodatis arteriis venisque cutis atque tendo et membrana, qua os contegitur, inflammationem accipiant, vehementerque doleant. Ipse enim clauus sine dolore est, sed, quia eius radícula plerumque tendini vel periostio altius inhaeret, is etiam scalpello non sine metu tollitur.

§. 891.

Prohibentur clauī, ne in pedibus nascantur, neque, si adsunt, dolorem moueant, si homo laxioribus calceamentis vtitur, et si is tibialia ita induit, ne etiam haec digitos pedis stringant. Vbi vero clauī iam eminent, commodissimum est, eos balneo, inpositis idoneis emplastris, emplastro de cicuta, malactico, viridi, vel cera viridi, mollire, illosque scalpello ita radere, vt callus diducatur, hoc vero diducto, iterum illa emplastra et imponere et diutius superhabere. Cura adhibenda est, ne scalpello tendo vulneretur, cum ex minori etiam plaga quandoque grauissima et funesta inflammatio orta fuerit. Vetus clauus, quamvis sic excisus, saepe reuertitur, qui vero tandem sub
repe-

repetita curatione paulatim emoritur. De condylomate et aliis tuberculis, quae ad anum oriuntur, eam infra, ubi alia vitia, quae anus recipit, exponam.

† Clavis pedum laborantes abstineant a calceamentis cothurnatis, a statione, adhibeant post pediluvia adipem suillum recentem, qui fere omnibus emplastris vel laudatissimum praestat.

V L C V S.

§. 892.

Vlcus dicitur, si in qua corporis parte molli laesio seu continuitatis solutio, est, ex qua, nec sanguis nec bonae notae pus, sed alius humor corruptus, exit et quo humore partes solidae vlceri iunctae roduntur tandem etiam fluida, quae in corpore sunt, vitiantur. Talis vero corruptus succus prohibet, quo minus vlcus per se, ut vulnus, sanescere possit, quod igitur aliam curationem requirit. Hoc apparere cuilibet ex prioribus (336) potest.

§. 893.

Per omnes corporis partes vlcera oriuntur. In ossibus vero illis alia nomina sunt. Praecipue vero illa infestare solent adipem illamque cellulosam tunicam, qua non solum carnes, sed carniuum etiam fibrae glandulae, aliaeque partes, continentur.

§. 894.

Vlcera plerumque fiunt, si corpus mali habitus est, et in eo humida corrupta sunt. Itaque per se illa nascuntur in homine, quem scorbutus, venerealues, cacochymiae et cachexiae varium genus, ne non aqua inter cutem, male habet. Sed vero etiam in vlcera degenerant vulnera atque aperti abscessus. Hoc accidere potest in homine integro et sanissime

si minora laceratarum arteriarum venarumque ora rebus extrinsecus admotis ita immutantur, ut ex iis, nec sanguis, nec pus bonae notae, exire possit, sed faecies, vel tenuis atque cutim aliasque huic iunctas partes erodens, vel crassior atque glutinosior. Nam talis humor haud aptus est, ut ex eo vulnus, vel glutinari, vel impleri, vel ad cicatricem sanitatemque perducere possit (348. 351).

§. 895.

Negligentia igitur medentium hoc fieri potest, si impositis linamentis turundisque, fascia etiam adstrictiori, vulnera atque aperti abscessus valenter premuntur: si vulnere colliso nondum per digerentia purgato superdantur balsama, vel alcohol, nec non si super omne vulnus iniiciuntur nimis acria atque rancida: Si pus, quod corporis calore et aere corrumpitur, non extergitur, sed in vulnere relinquitur; quibus omnibus et aliis arteriarum, per quas vitalis succus permanat, ora adstringuntur, Pus vero etiam crassius atque glutinosius fit. si medentes in usu medicamentorum diutius persistunt, quae materiam digerunt atque pus citant, nec non in usu fomentorum, quibus partes, quae iunctae sunt, et praecipue illarum arteriae, remissiores fiunt. In corpore vero corrupto vitiosoque etiam corruptum humorem ad vulnera permanare necesse est, qui naturaliter, tum corporis calore, tum aere, multo acrior fit. (Conf. 236. 340. 348. 388. 389. 391. 392. 402). Omnia, quae in vulnere atque abscessu, si iam pus alunt, novam inflammationem movent, facere solent, ut in vlcera serpentina degenerare possint.

§. 896.

Genera vero nominaque vlcerum plura sunt. Multum enim inter se distant, ratione sedis, quam

infestant, si in cute, quae capillis contegitur, in adipe, glandulis, musculis, tendinibus, ligamentis, articulis, vel qua caua sede, fiunt, nec non, quae circa oculos, nares, aures, fauces, tonsillas, linguam, palatum, gingiuas, labra, mammas, aluum, genitalia, fiunt. Aliquid etiam in figura et magnitudine est, si illa altius penetrauerunt, vel breuia sunt. Etiam aliquot tempus confert, cuius ratione vlcus vetus vel recens esse solet. Vlcera, quae angusta sunt, et vel recta vel flexa, et tortuosa, intus feruntur, et saepe in pluri diuiduntur, sinus, vel vlcera sinuosa, vocantur, quibus, si callus accedit, nomen fistulae est. Si vero vlcus rotundum oras duras, tumentes, crassas, habet, id callosum appellatur. Quin etiam vlcerebus alia nomina imponuntur, si illa a quodam vitio, quod in corpore est, a malo venereo, scorbuto, cacochymia orta sunt. Aliquid confert humor, qui ex his exit, qui, si copiosus est, vlcus humidum, si exiguum et glutinosus, aridum et durum dicitur. Humor etiam tenuis, glutinosus, crassus, subalbidus, muco similis, liuidus, pallidus, aut niger, quasi vnguinosus, atque cum malo odore esse solet. Interdum aliud vitium accessit, et vlcere os vitiatum subest. Nonnunquam vlcus inaequale est, et ei vitiatum caro superincrescit. Vlcus malum, et quod, quia humida in corpore corrupta sunt, vel quia fibrae, tum circa vlcus, tum in omni corpore, laxae ac resolutae sunt, difficilius sanescis, κακοηθές δυσάπλωτον Chironium * ac Telephum ** vocatur. Quod fere desperatum est, quale in senibus quandoque esse consuevit, malum mortuum nonnulli dicere solent. De carcinomate, quod pessimum vlcereum genus est, et glandulas inprimis occupat, supra retuli (264. ad 274).

* Vid. CELSVS L. V. C. XVIII. §. 5.

** GALENVS de methodo medendi L. XIV. Cap. XVII. T. X.
p. 339. conf. PLINIUS H. N. L. XXV. Cap. V. T. II.
p. 365.

§. 795.

Genus etiam humoris, qui ex vlcere effertur, docet, quas corporis partes illud perferat. Humor ille tenuis et rodens esse solet, si is ex cute exulcerata exit. Vlcerata vero, quae in summa cute fiunt, sine altitudine lata esse solent, et quae, falso pruritu molesta, crebrius accedente inflammatione exasperantur. Ex locis, qui multa et pinguiori lymphā abundant, velut in capillis, praecipue infantum, nec non in facie aliisque locis, ubi glandulae sebaceae copiosiores sunt, exulceratio mucosa esse solet, et humor percrassus in crustas subpingues concrevit, quae surgunt, interdum madent, saepius siccae sunt. Si ad epe vlcere tentatur, quam principem et frequentissimam sedem esse dixi (893), oleum rancidum fit et rodens, et quod tenue, subalbidum, quasi vnguinosum, pinguitudine oleo albo non dissimile, ex vlcere prouenit, hoc etiam vtplurimum in plures partes et altius penetrat ac non raro in sinus diuiditur, qui, si vetustate callosi fiunt, in fistulas degenerant. Si salina in glandulis ei secernendae accommodatis vlcere corrumpitur, humor copiosus, tenuis, valde rodens, cum multo pruritu ac dolore, exit, qui etiam glandulas et is iunctas partes vorat et vlcerata profunda, κακὸν θάλασσαν, callosa relinquit. In carnibus si vlcus fit, id putre esse solet et male olere. Sanguis enim, si corrumpitur, nunc odorem excitat. Si vlcus in articulo est, humor exit multus, subcrassus, subalbidus, albo oui similis (Conf. 357). Intolerabilis odoris foetidas est in vlcere, cui os vitiatum subest, quod etiam sentitur, si id picillo contingitur. Extracto etiam specillo id patet, nippe in quo, si ex argento est, corruptus humor

nigrorem excitat. Caries quibus notis cognoscere possit, infra docebo.

§. 898.

Vlcera, quae in exterioribus sedibus fiunt, oculi subiecta sunt, in ea etiam demitti specillum potest, quod docet, quo tendant, et quam alte perueniant. Ex renifu etiam et ex ipsa sede patet, ad quam partem peruentum sit.

§. 899.

Vlcerum omnium commune est, ea non facile per se sanescere, etiam longe difficilior, quam vulnera curari. Si ea ex malo corporis habitu et vitio, quod in humidis est, ex morbo venereo, scorbuto, cachexia nascuntur, ea nunquam facile sanescunt, nisi corruptus humor, qui intus nocet, congruis auxiliis euocatus et corporis habitus mutatus fuerit. Nam etiam in corpore vitioso vi adhibita cicatrix inducitur, illa vel iterum rumpitur, vel vlcus iuxta eam renouatur. Multum etiam mali vlceribus accedit, si ea vetera sunt, et eorum iam consuetudo facta est, praecipue in corpore senili. Nam non solum illorum difficilior curatio est, sed etiam, si idoneis medicamentis eo peruentum est, vt glutinari possint, id plerumque sine magno periculo fieri nequit *. Nam esse etiam aliquam corporis therapiam per vlcerum, id genus docet, quod arte, et data opera, fieri solent, de quo protinus dicam. Nec tutum est, vlceribus medicari, quae in foeminis fiunt, quibus menstrua non proueniunt. Vfus enim ostendit, tales, quibus malae vetustaeque vlcerum ita curatae fuerunt, aliis grauioribusque morbis, apoplexia, asthma et catarrho suffocatio, inflammationibus viscerum, corripitur, et non raro subito rapi. Eadem mors, vel graue mortis periculum, senibus denuntiatur, si vlcus, quod, aut ante

aut

aut in ipso morbo, natum est, subito aridum et aut pallidum, aut liuidum, factum est **. Longe difficiliora vlcera sanescunt, quae circa cutem, membranas tendinesque atque articulos fiunt, nec non, quae in aliam sedem cauam, veluti pectus, vel articulum, penetrant. Nec vlcera vincuntur, nisi pars, quae laborat, contineatur atque quiescat. In corporibus integris beneque valentibus, aut assiduus laboribus exercitatus, quandoque vlcera, etiam vetusta, celerrime, et fere per se, sanescunt, si sola adhibeatur quies, id quod in cruribus maxime accidere solet, quae prae aliis desiderant, ut aeger in lectulo contineatur. Caeterum humor, qui ex vlcere exit, docet, quid sperandum sit. Pessimus est nimium aut tenuis et rodens aut crassus et glutinosus, colore liuidus, niger, et qui male olet. Carcinoma nullam curationem recipere, nisi excidatur, supra dixi. Si vlcera ossibus vitiatas supernascentur, nec ea curari possunt, nisi prius sanitas ossibus reddita fuerit. Et quae iam sana videntur, iterum exulcerantur. Haec enim vlcera saepe non a cute, sed ab interioribus partibus atque periosio incipiunt.

* Vide HILDANVM Cent. III. Obs. 29. LE DRAN T. I. Obs. 33.

** HIPPOCRATES Prognost. Sect. IV. T. I. p. 450. et in Coacis p. 581. CELSVS L. II. C. VI.

§. 900.

Vlcus haud sanescit, nisi fuerit ita purgatum, ut a recenti vulnere haud discrepet, quod si factum est, illud, ut caetera vulnera, impletur, atque ei tandem cicatrix inducitur. Purgatur vero vlcus, si, tum intus datis, tum extrinsecus admotis, medicamentis efficitur, ut bonus et ad vulnus implendum idoneus succus ex disruptis arteriis in id fluat.

§. 901.

Si vero de prioribus incipiendum est, non omnibus aegris eadem medicamenta conueniunt. Sedulo considerari debet homo et totius corporis habitus, praecipue, si vlcera a vitio intus orto nata fuerunt. Animaduertere enim oportet medentem, quidnam sit in quo laboratur. Si enim corpus integrum est, et vlcus ex vulnere per imposita aliena enatum fuit, medicamenta, quae ore sumuntur, fere superuacua sunt, et saltem abstinentia vtendum est atque quiete. Si vero aliud vitium, venerea lues, scorbutus, cachexia, in humidis est, si foeminis menstrua, viris haemorrhoides, olim fluere solitae, suppressae sunt, danda sunt medicamenta, his morbis profligandis idonea. Nam iis leuatis vlcera facilem curationem recipiunt. Diligenti etiam animaduersione opus est, ne valentioribus medicamentis, quae ad humida purganda dari consueuerunt, sanguis nimium cieatur, et inflammatio moueatur, qua vlcus multum exasperari quandoque solet. Medicamenta, quae nimis calida sunt, vel morbo, ex quo vlcera orta sunt, minus apta, illud efficere non raro solent. Purgantia non prius utilia sunt, quam, vbi necesse est, vt auertatur nimius humoris ad vlcus aditus. Nocere ea possunt eo tempore, quo digerentibus vlcus purgari debet. Saepe igitur medicamenta, quae ad discutiendum malum a medicis dantur, vlcera irritant, semper vero multumque prodest quies et abstinentia, atque si aeger modico cibo vtitur, sibi que omne acre, falsum, acescens, imo carnem omniaque iurulenta subtrahit, a vino etiam et omni valentiori potione abstinet atque aquam vel ptisanam bibit (Conf. 402).

† His, quae PLATTNERVS de victus ratione et medicamentorum intus sumendorum usu dixit, multa quidem subiungi possent, nisi et breuitas, cui studendum est, et libri chirurgici natura et habitus vetaret. Doctrina enim haec paucis

paucis proponi nequit, cum non modo propositiones pathologicae et semioticae, atque praecepta diaetetica, et therapeutica, generalia illa, sed et morborum quoque singularium historiae et varia atque diuersa methodus iis medendi ab experientis comprobata in eo chirurgo, qui medici consilio uti non vult, desiderantur. Itaque haec pauca tantum adiicio. Humororum prauorum acris natura diluentibus, obuoluentibus; tenuitas incrassantibus; spissitudo diluentibus et resoluentibus; acrimonarum species diuersae remediis cuique propriis; abundantia victu parco, haud opiparo, potu aquoso, somno breuiori, euacuantibus, aucto, nisi quid vetet, motu corporis aucto; defectus quiete, somno longiori, nutriente cibo potuque; motus nimis abstinencia, quiete, potu aquoso, euacuantibus, nitroliis; motus iusto minor exercitatione corporis, victu pleniori, potulentis medicamentisque cardiacis, curatur; ut de solidis partibus rigiditate, flacciditate, spasmo peccantibus nil dicam. Multo minus curationes morborum diuturnorum in humoribus haerentium pro dignitate satis exponi possunt. Paucissimis igitur reliqua attingam: Vlcus curatio praecipue poscit boni humoris in loco affecto secretionem et habitum partis eius perspirabilem, absentiam inquinantium, ergo munditiam, aerem purum, calorem naturalem partis, eiusque fotum per lintea, pannos et fascias, subinde etiam concalescentia; quietem partis; medicamenta pauca conditioni vlcis, sicci, nimium humidi, laxi, callosi, fungosi, insensilis, dolentis, inflammati, serpentis, foetentis accommodata. Quodsi haec et quae de generali therapia paulo antea dixi, recte et sedulo adhibentur, vlcera ad priores curationes rebellia ad cicatricem saepe perducuntur, etiamsi curatio specifica dicta omittatur. Non raro tamen ea quoque necessaria est. Praecipua huc pertinentia medicamina haec fere sunt: Si purulentum humoribus admixtum est, serum lactis acidum, lac ipsum animalis herbis pasti, cum aqua calcis viuæ, vel sine ea, decocta farinosa acidula. Labes siphylitica, scabiosa vsum decoctorum modo mitiorum, modo acriorum, diureticorum, medicinarum antimonialium, mercurialium, iisque adiuncti corticis peruiani, extracti cicutæ requirunt. Vlcera a scorbutico vero genita in melius mutantur adhibito victu ex vegetabilibus, brassica praecipue omnis generis, eademque sale condita, iisque, quae vulgo antiscorbutica vocantur, ex malto paratis potulentis, pultibus et pane, (de quibus RVPPE in libro *de morbis nauigantium*, et LIND in Tract. anglice conscripto *de scorbutico*,) vsu aquarum mineralium acidularum. Hydrops curatio multiplex. Cachexia, siue vlcus causa fuerit siue effectus, excretiones blande iuantibus et cortice chinae, puluere anticachectico Quercetani

tand etc. curatur. A serophulosa labe deriuata vlcera dotibus exiguis tartari emetici, mercurio dulci, additis horum alteruti roborantibus et aromaticis aperientibusque, praecipue chinae cortice, cicutae extracto vel puluere, cortice winterano, decoctis radicum aperientium; sed simul abstinendum a farinosis nimis, potentia frigidis, relaxantibus vtendum vero moderata fasciarum applicatione, et post haec omnia balneis frigidis. Fluxus foeminarum menstruus, vel virorum haemorrhoidalis, arthritis, tinea capiti repressa etc. remediis quaeque suis curentur. Ad vlcerum ab acri pendentia et aliis remediis non sanabilia multum potest vsus lactis cum pane candido bis cocto pro omnino cibo, in acre campestri. Praeter haec scire licet, curatio nibus per medicamenta efficaciora administrandis non iuste diutius insistendum esse; nam diu vexatae fractaeque vires naturae cum non sufficerent sanandis vlceribus, denuo collectae sine medicamentis sanationem efficiunt.

§. 902.

Haec vero circa victum et medicamenta intus danda obseruanda sunt. Propriam etiam et haud mediocrem animaduersionem desiderant medicamenta, quae extrinsecus super vlcera dantur. Vsus enim ostendit, saepe haec superdatis medicamentis valentioribus adconquisitis agitari atque plurimum intendi, ita, vt altius latiusque serpent, quae nulla vi adhibita, sed impositis, nullis, vel lenibus tantum, medicamentis, quae quasi blandiuntur, per se finita fuissent. Vlcerum autem purganda esse, supra proposui (900). Id quod extrinsecus fit, si tollitur omne, quod in vlcere impurum est, et quod ora minorum arteriarum praeccludit, sicque impedit, quo minus bonus et ad carnes alendas idoneus succus possit ex iis exire. Pro modo vero illius humoris, qui vlceri inhaeret, adhibenda medicamenta sunt. Si enim minori malo maior vis adhibetur, et vlceri non adeo impuro super imponuntur ex rodentibus adurentibusque vehementiora, haec altius et latius atque in id, quod integrum est, penetrant, imo nouam non raro inflammationem concitant, qua vlcus semper plurimum intenditur, ita, vt

ea,

ea, quae circa sunt, intumescant. Nec vero etiam proficere possunt his contraria; Nam, si vlcus malum vetustumque est, et valde impurum, nimis lenia medicamenta, quae, haud satis purgant, nec prohibere possunt, quo minus vlcus sub his continuetur.

§. 903.

Etiam illud ante sciri necessarium est, non satis esse, ipsas medicamentorum facultates intueri, sed etiam, quomodo misceantur ea, quae ex his fiunt. Multum enim interest, si acre, rodens, atque adurens medicamentum aridum contusum contritumque super vlcus inspergitur, si tale, quod liquari potest, super vlcus relinquitur, vel, si madefactum per breue tempus super id tenetur, et, vbi adussit, iterum submouetur, si vlcus aqua, aliove liquore, quo tale medicamentum dilutum fuit, eluitur, vel, si validum medicamentum cum aliis mixtum et oleo, axungia, cera, exceptum illinitur.

§. 904.

Neque vero in medicamentorum misturarumque generibus tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis locis, quibus illae admouentur. Si enim locus neruosus est, is aegrius fert vehementiora, quibus si agitur vlcus multum intenditur. Si vlcus in cute est atque in glandulis, desiderantur exedentia, ast, quae etiam reprimunt. Si locus musculosus est, imponi possunt cum exedentibus adurentibusque medicamenta, quae pus mouent, vt cum hoc id, quo vlcus corruptum est, exeat. Saepe, si omnia parum proficiunt, expeditissimum est, vlcera, quae valde impura sunt, callosaque atque vetusta, vsque ad sanam carnem excidere, et, vlcere ablato, superdare medicamenta, quae pus citant, et quae implent. Si commode totum vlcus excidi nequit, concidendae sunt orae callosae. Si in vlcere aliquid durum est, atque eminent, id

etiam scalpello exulcerandum est et superdandum medicamento digerens et quod pus mouet. Praecipuum ad id aptum est emplastrum diachylon compositum. Veteres etiam igne vlcera adusserunt, id quod crudum est et a nostra aetate alienum videtur.

§. 905.

Vlcus igitur, quod in adipe, vel loco musculoso est, et quod nec valde impurum nec humidum in corpore integro est, non aliam curationem desiderat quam, quae vulneri colliso, vel abscessui aperto, necessaria est. Satis proficiunt medicamenta, quae pus mouent, digerunt, atque sic purgant, tandemque implent. Omnia diligenter facienda sunt, quae in vulnorum curationibus praecepi (384. ad 402).

§. 906.

Aduersus vlcera autem magis sordida adhibenda sunt medicamenta, quae ad purgandum paulo valentiora sunt. Quale est, si radix aristolochiae, ari, ireos Florentinae, herba agrimoniae, scordii, absinthii, sabinae, peti, ex aqua coquuntur et vlcus hoc decoctum praecipue, si id profundum cauumque est, eluitur. Huic commode mel adilicetur, si vlcus in partibus musculosis, idque aridum, est. Si vlcus humidum est, vtendum est ad decoctum aqua, quae calcem viuam exceptit.

† Vlcus simplex, non nimis vetus in corpore non adeo impuro, vocatur iam impurum, si materies naturam boni puris non refert, sed vel saniosa, vel ichorosa vel tenax et mucosa est. *Sanies* vocatur humor tenuis, pellucidus, quandoque viridescens, atque copiosus. *Ichor* vero est humor paucus, tenuis, subrubellus et acris. *Materies tenax* et mucosa, fere sordes refert, et modo ex flauo alba, modo ex rubro fusca atque quasi ex cruore et sero mixta est. Omnes odorem aliquem spirant. Vlcus tum dolore molestum atque coloris fusci est. Fiunt ab irritantibus intempestiue adhibitis, organa secernentia mutantibus, neglectu quoque. Si dolor quamuis non adeo acris est, aut pruritus

aut

aut aliqua inflammatio est, adhibeatur vel epithema vel cataplasma ex chamomilla et lupulo ter, quater die; post diem vnum vel et alterum imponantur lintea carpta admodum mollia, tenuiter illita vnguento mollioriue cerato, parato eo ex cera alba, seuo aut spermate ceti, et oleo, recentibus iis quidem; et desuper cataplasma minime humidum, crebro renouandum. Sed simul victu bono vel paraciori, si homo non imbecillus est, et potu vix spirituosovtendum est; at homo vel ex vlcere vel alia causa imbecillior opus habet, cibo pleniori et cortice chinae. Dum inflammationis signa sunt, cortex is utilis non est; victus tenuis, refrigerans, quies, purgatio antiphlogistica, nitrosa profunt. Nitrum quidem Britannorum quidam ad curationes vlcenum perficiendas proposuerunt, at eius vsus promiscuus laudari nequit. Quodsi per illa pus versum est in laudabile, et carnes melioris consistentiae colorisque sunt, simplici ratione deligandi, quam modo dixi, vtendum est curandumque, vt calor partis conseruetur. Si netum quidem pus paulatim minuitur, neque igitur sanatio sequitur, fonticulus haud procul a loco vlcenis excitetur, pars affecta fasciis moderate constringatur. Si dolor est, alia quaedam circumspectienda sunt et inquirendum, sitne alieni quid in vlcere remouendum, fueritne medicamentum foris adhibitum acre, omittendum in posterum eluendumque aquosis; an vero fasciae arctius constrictae dolorem mouerint, relaxandae igitur; an ab ichore vel sanie cutis quaedam excoariatio sit, quae et erysipelas excitare solet; quibus medetur aqua vegetali minerali Goulardi, solutio sachari saturni. Si nimius dolor est, narcotica vel specie cataplasmatum vel epithematism admota eum leniunt.

Vlcera humidiora possunt decocta meraca, amarissimorum quorumlibet, corticis chinae praecipue, ex aqua calcis viuae, quibus et spiritus vini aliquid adici potest, quaeque splenis et fasciis subinde adspargantur. Vlcus ipsum contegatur sat multis linteis, non discerptis iis, sed rasis, aut spongia marina; quae bis die nouata sat bibant saniem. Intus sumantur cortex chinae, atque, si plenum id corpus est, subinde medicina aluum purgans, vrinam augens, decoctum ligni guaiaci praecipue, cibis parcus, minime iurulentus, aromate mediocriter conditus, aut antiscorbuticis. Si vlcenis orae flaccidae, perpallidae, oedematosae, robore nouo indigent, eadem, quae modo dixi, profunt; ac praeterea puls ex cortice chinae, vel absinthio atque oxymelite parata, spissior quidem, liquores spirituosos et aromaticos, partibus vlceni vicinis, itemque aliqua frictio, adhiberi debent. Vlcus ipsum puluere aluminis vti, cui etiam aliquid mercurii praecipitati rubri adici potest, solutione diluta admodum vel mercurii sublimati corro-

corrosiui vel lapidis infernalis curatur. Partis affectae contractionem fasciis faciendam non tam utilem quam necessariam esse nemo non videt.

§. 907.

Si vero vlcus adeo impurum est, vt, nec tactum nec medicamentum, ei admotum, sentiat, illud validiora desiderat. Apti sunt sales, vitriolum vsum, alumen, aerugo. Etiam non aliena sunt horum salium liquores, phlegma vitrioli, vel aluminis. Longe magis adurunt alii liquores, etiam chemica arte parati, oleum et spiritus vitrioli, nitri. Ad vlcera callosa ipsasque fistulas purgandas plurimum potest spiritus salis ammoniaci, qui, si admouetur, dolorem subitum acerbumque adfert, se vero protinus remittentem, cum ex alio medicamento, praecipue ex illis vnguentorum compositionibus, is diutius remaneat. In hos vero liquores, qui vehementer adurunt, demittendum specillum linamentis inuolutum, et super vlcus huiusque callum tenendum est. Ex frequentissimis compositionibus sunt vnguentum Aegyptiacum et Apostolorum, quae in locis nervosis glandulisque fere aliena sunt, et vlcera etiam, quia varia admixta habent, sordida reddere consueuerunt. Proprie autem mala vlcera aduruntur, etque tanquam igne adustis crustas inducunt, lapis causticus chirurgorum, qui ex calce viua et cineribus clavellatis constat, et, qui maximi effectus est, lapis infernalis. Haec vero ita admouentur, vt super vlcera earumque oras callosas per breue tempus teneantur, non vero imponantur. Crusta, quae ab adurentibus relinquitur, linimentis digerentibus impositis resoluitur, quae trahit secum, quicquid corruptum erat, ita, vt puris sinus implentibus curari queat.

Novam vlcera callosa ipsosque scirrhus adurendi rationem proposuit EDVARDVS BARRY in *the Medical Essays of Edinburgh* Vol. IV. Obs. IV. p. 30. Super locum iubet prius tenere lapidem infernalem, breui autem, et post temporis minutum, id, quod illo medicamento adustum est, desiccare

care mediante oleo vitrioli, quod adhibito bacillo ferreo in illud demisso admoueri debet. Sic enim locus satis aduri, mox vero omnem dolorem leuari asseuerat.

† Callosa vlcera vocantur, quorum orae non contrahuntur, sed manent, quales erant, ac praeterea inaequales, crassae, eminentes et duriores fiunt. Circa ea autem saepe venae varicosae sunt. Causae calli sunt vel in humorum prauitate, vel in praua curatione per intempestiue applicata irritantia, siccantia, comprimentia. Cuiusmodi sit harum causarum remotione, igitur succorum correctione etc. si alia praeterea necessaria sunt, callus recens imposito cataplasmate emollitur; vetustior vero adurentia, exedentia set desuper cataplasma, item scalpellum exposcit. Si venae circa varicosae sunt, idonea fasciarum applicatione opus est.

§. 908.

Ad vlcera autem mucosa, quae ex venereo morbo nascuntur, maiorem usum praestant, quae ex hydrargyro parantur. Lenissime exest mercurius dulcis, si is inspergitur. Generis vero vehementioris est et magis idoneus mercurius praecipitatus ruber, qui vero non inspergi, sed vnguento, linimentoue, exceptus admoueri debet. Is aliquantum mitescit, si alcohol ei superinfusum admota flamma incenditur, et super eum deflagratur, idque aliquoties repetitur. Longe vehementius idem facit mercurius sublimatus, qui, cum inter acriora et praesentanea venena sit, non ita tuto vlceribus admouetur, cum etiam per haec et vulnera corporibus nostris venena inferantur. Si igitur interdum necessarius videtur mercurius sublimatus, eius tamen usum temperatum rarissimumque esse oportet. Arsenicum, quod magis virulentum est, nunquam sine perniciie corpori potest admoueri (488).

* Vid. DEGNERI Relat. de casu singulari, quo per mercurium sublimatum in emplastro applicatum mors inducta fuit.

† Ulcera a causa siphylitica nata purgato et correcto humore flumine universo plerumque sponte quasi sua purgantur et ad cicatricem festinant. Si externis opus est, hydrargyros vnguento digestiuo vel et vnguento rosarum remixtus saepius tum sufficit. Non raro etiam ligni guaiaci decoctum meracum cum linteis carptis prodest. Praeparata mercurialia non omnes ferunt: mercurius dulcis, quam

quam inter ea mitissimus, dolores aliquando admodum vehementes mouet. Si lues non confirmata, sed gonorrhoea maligna curatione repressa ulcerum causa esse videtur, haec refrigeranda est. Si ulcera venerii generis aut multa aut a profunda usu externo medicaminum mercurialium curantur, videtur ne ptyalismus, fortasse haud necessarius, cieatur. Si secundo buto homo simul laborat, ab eo antea liberetur.

§. 909.

De his omnibus illud, quod supra praecepi, sedulo tenendum, vim pro magnitudine vlcis partisque corruptae adhibendam, et non prius ad eas compositiones veniendum esse, quae vehementius exedunt et adurunt quam, ubi validioribus opus est. Quamprimum etiam omne id, quod corruptum erat, resolutum et vlcus purum est, finis horum medicamentorum esse debet. Si quis nervus, vel tendo, nudatus est, is contegi linimentis vel superinungi linimentis debet, ne is sub iis medicamentis aduratur. Si his non protinus omne quod impurum est, soluitur, et, propter sensum doloris, vel metum inflammationis, validiora adhiberi nequeunt, diuina curatio potest in ea, quae mediocriter exedunt, atque etiam adurunt, et ea, quae pus mouent, donec vlcus satis repurgatum sit. Vlcis vero purae eadem notae sunt, quae vulneris (395). Necesse vero est, ut aequale sit. Si enim vlcus, quod inaequaliter purgatum, et non vndique rubet atque naturaliter sentit, implentibus curatur, putris caro superincrescit; sub qua ultra serpere vlcus solet.

§. 910.

Ad putrem vero carnem supercrefcentem continendam eamque exedendam plurimum valent ille sales (907), maxime vitriolumustum, nec non adurentia, et, qui primo loco est, lapis infernalis. Idonea etiam est compositio, quae lapis diuinus dicitur (314). Quandoque tanta vis necessaria non est, sed id, quod excreuit, tollitur aqua phagadaenica chirurgorum. A victu ratione.

ratione ordinandum est, vt aeger a cibo valentiori, praecipue a carnibus, omnibusque iurulentis, abstineat. Vlceri etiam obiiciendi sunt densiores panni, et vinctura adhibenda, quae quidem nihil offendit, ast tamen satis continet, et, quantum res permittit, adstringit. Omnia medicamenta, quae digerunt, nec non ea, quae carnem alunt, in hoc casu aliena esse, ex prioribus intelligitur.

† Fungosa caro crescit, si ulcus simplex negligentius curatur, nimia mollientia et balsamica adhibentur; si quis sinus lateralis est; si pars corrupta relicta est, ac praecipue si os subiectum affectum est. Hae igitur causae remoueri debent. Ex medicamentis siccant et roborant decoctum mercurii corticis chinae ex aqua calcis viuae; unguentum aegyptiacum. Magis valet alumenustum et si exedens desideres alumini adiectus mercurius praecipitatus ruber. Lapis infernalis promptius agit in pollinem tenuissimum contritus et fungo adpersus, vel aqua solutus, et penicilli adminiculo admotus. Quodsi fungus in altum accreuit ex angustiori pedunculo, facile vinculo constringitur; sin basis latior est, per hanc acus filum duplex trahens traicitur, et filis illis utrumque latus fungi constringitur. Si vlcus autem sinus aliquem lateralem habet, is incidendus, si quid alieni subest, id tollendum est. Utroque casu postea vix adurentibus opus habueris.

§. 911.

Praeter haec, quae intus in vlcera infunduntur inlunturque, sunt alia quaedam, super illum locum ponenda, quae ad felicem curationem plurimum facere possunt. Si enim ea, quae circa vlcus sunt, aliquid inflammationis habent, haec leuanda et eo concurrens materia auertenda est super iniectis medicamentis, quae discutiant. Locus duplicibus triplicibusque pannis, in spiritu vini, qui camphoram exceperit, tinctis, contegendus est, vel admoeri possunt epithemata ex vegetabilibus amaris (79). Emplastra, quibus plures vtuntur, non ita opportuna sunt, etiamsi iis camphora admisceatur (76). Cum his abstinentia et quies imprimis necessariae sunt. Si pus mouendum est, humor vero

ex vlcere fertur tenuior, plurimum valent emplaffi (385), quae et pus citant et aera auertunt (402). Sed lo confiderandus, tum totius corporis, tum ne uo u et loci, in quo vlcus est, habitus. Nam, fi locus rari est, remiffus et fere refolutus, cutis etiam relaxa est, quod, et oculis patet, et digito, fi pars contingitur fentitur, praeter medicamenta, quae roborant atque r primunt, fascia iniicienda est, quae non vlcus tantum fed vtrinqe totum membrum amplexa paulo magis astringitur, qua, fi vlcus in cruribus est, prae caetero opus effe folet (168. 735). Si vero circa locum aliquo duriora funt, quam effe naturaliter debent, fuperdantia funt emollientia (91), et praecipue illa emplafta (168. 385). Fascia vero ita iniici debet, vt ea, quae impoffibile funt, contineat, minime vero adstringat. Caetera, quae pertinent ad implendum, ad cicatricem inducendum conueiunt vulneribus, et fupra expofita funt. His omnibus diligenter obferuatis, plerumque feliciter coedit curatio. Nonnunquam tamen vlcera fatigare mudentes folent, et cum difficultate curantur, atque etiam quaedam infanabilia reperiuntur.

† Quae de utilitate fasciarum recte applicatarum et hoc aliis locis a PLATTNERO dicta funt, ea prolixius a THOMAS DENIO et qui eum fequuntur, noftra aetate laudantur. Si rationes medendi cauffis et corporis conftitutioni accommodatae nihil profuerunt, et ulceris tamen curatio neceffaria est, aliquam ex empiricis fupra ad caneros laudatas periclitari licet.

§. 912.

Sed haec communia funt, propria vero quaedam in cruribus vifenda funt, in quibus frequentius vlcera nafci compertum eft. Illa praecipue in cute latius ferpunt et igitur defiderant medicamenta non pingua, fed, quae leniter purgant, atque fimul modice reprimunt. Nobiliffima compositio eft aqua phagadaenica chirurgorum, fi parum mercurii fublimate, adiecta paulatim aqua calci.

calcis, teritur, et post huius aquae maior modus ei adii-
citur. Haec linamentis excepta imponitur, cui etiam
essentiae succini, vel myrrhae, paululum adiici potest.
Pastillum etiam quidam componunt ex lapide calami-
nari et lithargyrio, quae in oleo oliuarum coquunt
et post olibanum et massichen adiiciunt. Hunc pastil-
lum, quem alii ad emplastra referunt, oportet affusa
calida prius liquare atque mollire, et sic super vlcus
dare, qui reprimat et satis aduersus humida vlcera pot-
est. Ante omnia vero sciri oportet, hominem, cuius
crura vlcus habent, ita continendum esse, vt is in le-
tulo iaceat, vtque crura, neque moueantur, neque de-
pendeant. Magnum enim ex quiete praesidium esse
solet (899).

§. 913.

Si vero vlcera qua parte sunt *κακονθέα*, et, quae vel
nullam curationem recipiunt (896), vel, quae sanari
tutum non est (899) illa tamen quotidie purganda sunt.
His superdari debent leniora, ex quorum numero aqua
ista phagadaenica fere prima est (912). Huic etiam, si
vlcus putre sit, et ex eo humor exit mali odoris, vel
aqua vulneraria, vel essentia myrrhae atque succini,
commode adiicitur. Vlcus eiusmodi, si aridum sit, id
quod quandoque accidere solet, si corpori vltima infir-
mitas imminet (899), concitari debet atque exasperari,
quo iterum humor ex eo exeat. Id praestant radix
ellebori albi, ireos Florentinae, aristolochiae rotundae,
additis etiam cantharidibus, quae omnia, vel arida in-
perguntur, vel melle et digerente medicamento ex-
cepta, illinuntur. Vtilia etiam sunt emplastra (385),
nec non epithemata, si iniiciuntur. Haec vero fieri
debent ex amaris discutientibus, quae commode in vi-
no decoquuntur. Si ex grauibz vlceribus, quae vel
etustas occupat, vel quae negligenter curata fuere,
vel in corpore mali habitus sunt, humor fertur male

Hh

olens,

olens, vtendum est alcohol et medicamentis, quibus putredo cohibetur.

§. 914.

Non raro exulcerantur tonsillae, id quod frequentius iis accidit, quibus humida ex venereo morbo corrupta sunt. His praeter ea, quae ad humida purganda mutandumque corporis habitum idonea sunt, paranda debet ad gargarizandum decoctum ex herba agrimoniae, salviae, floribus chamomillae, hyperici, ligno saesfras, radice pimpinellae albae. Prodest etiam nix cum rosa, cui, si exulceratio mucosa est, adiaci potest aliquid ex vehementioribus, ex alumine vsto, ex phlegmate aluminis, aqua viridi Hartmanni. Specillum linamento molli inuolutum in eiusmodi medicamentum demittendum et super vlcus tenendum est. Cum vero pura vlcera esse coeperunt, adiaci his potest balsami Peruuiani paululum, quo tempore etiam proficua essentia succini et pimpinellae, si frustulo sacchari acceptae ore continentur.

§. 915.

Iisdem fere medicamentis vlcera linguae curantur. Vitari tamen oportet acria, cum non raro in hac parte vlcera, si imprudentia medentis agitantur, periculum carcinomatis adferant (260), quod nullam curationem recipere potest. Si in latere linguae vlcera nascuntur, eaque diutius durant, videndum, num contra dens alius acutior sit, qui sanescere saepe vlcus eo loco non finit, ideoque limandus vel eximendus est.

§. 916.

Si vero malum vlcus palati membranam exest, ossi etiam vitium adfert, id quod non raro venereo morbo aegris incidere solet, ad id putgandum proferuntur medicamenta, quae ossi vitiato opportuna sunt.

essentia myrrhae, cui addi potest essentia aristolochiae et aliquid ex oleo caryophyllorum. In horum usu tamdiu perseverandum est, donec squama ab osse secedat, et os integrum fiat. Si, id quod crebrius incidit, caries alte descendit, quod vitiatum est, ab alio osse, quod integrum est, soluitur sinusque relinquitur. Videndum, num sinus, quo deglutitio multum impeditur, carne possit impleri, id quod quandoque fieri potest, si is exiguus est. Ob id orae eius crebrius conciduntur, iisque medicamenta illinuntur ex myrrha et aliis, quae carnem alunt (388). Si vero, id quod multo maxima ex parte fieri solet, sinus manet, obtusamentum, ex auro, plumbeo, factum, in eum demittitur, quod et vocem et deglutitionem adiuvat*.

* Vid. GARENGEOT *des Instr.* T.I. p.387. FAVCHARD *Chirurgien Dentiste* T.II. Cap.XX. Tab.XXXVIII. p.298.

§. 917.

Genitalia utriusque sexus his temporibus mala vlcera ex venereo morbo recipiunt, quae cancrofa dicuntur. Ab initio in glande, cute, qua ea contegitur, et erendis etiam mulierum, pustulae oriuntur, una, vel lures, varis similes, subalbidae, et quasi pingues, cum pruritu. Vbi hae ruptae sunt, infra quasi exulceratio mucosa apparet, quae breui latius serpit, et cui callus inducitur, ut circum orae crassae atque callosae lineant. Hoc vitium, vel mox post impuram veneremurritur, quod illa loca virulento humore respersa fuerant, vel nascitur ex vitio, quod iam per totum corpus diffusum in humidis est. Vltimum genus difficilius nescit.

§. 918.

Si protinus post coitum pustula ardens in illis sebus exurgit, auerti quandoque exulceratio potest, fomentum adhibetur ex lacte, quod radici altheae

Hh 2

mol-

mollientibusque herbis inferbuit. Si vero nihilominus vlcus oritur, illud exedentibus (907. 908) aduretibusque curatur, quibus etiam orae callosae tolluntur. Hoc vlceris genus, etiamsi purum fuerit, diu medicamentis digerentibus et pus alentibus percurandum non vero protinus glutinandum est. Curata etiam vlcera, praecipue, si ea ex vitio fuerint orta, quod per totum corpus diffusum et in humidis est, hominem tuto esse a lue venerea haud sinunt, nisi isumat medicamenta ad eam discutiendam idonea satisque valentia.

† De ulcerum curationibus librum singularem lingua anglicam conscripsit et edidit BENIAMIN BELL, quem in veritatem versum legere Germanorum chirurgi possunt. scriptus est: BENIAMIN BELLS *Abhandlung von den Geschwüren etc. deren Behandlung etc.* Lipsiae 1779.

E P Π Η Σ.

§. 919.

Cutis etiam frequentius variis pustularum generibus exasperatur. Varia et his nomina sunt, tum a perfectis autoribus, tum a recentibus, imposita, de quorum significatione etiam non omnes consentiunt. Commune fere nomen est *ἔγρηξ*, Gallis *le Dartre*, quod in vlcera serpendo procedunt, ita, ut nonnunquam quae primum vitiata erant, sanescant. Sed et huius diuersa genera sunt. Herpetem miliarem vocant, quo exiguae, fereque continuae, pustulae in summa cute sunt cum aspritudine et pruritu, quarum nulla nec altera, nec milii semine, maior est. Interposito tempore pustulae rumpuntur, et quasi squamulae scinduntur, farinae similes. Si vero bullulae paulo maiores sunt, quae rumpuntur, etiam maiores squamulae et quasi crustulae, relinquuntur. Hoc genus medicamentis et in summa cute procedit. Proxima enim cutis, quae vitium receptura est, semper tumidior est et rubra.

rubra. Interdum medium fanescit extremis procedentibus, frequentius etiam id, quod sanum videbatur, iterum exulceratur. Plus vero mali est in eo, quod *ἐσθλητα ἐσθιόμενον* Graeci vocant, quia celeriter serpendo penetrandoque usque ad ossa corpus vorat. Dempstis in hoc squamis, profluit humor albidus, quo cutis magis exulceratur. Ad *τῆ ἐσθλητος* varias species nonnullis quoque referri solet exulceratio, quae cum inflammatione vehementiori ac febre est, atque abdomen comprehendit, et quae ob id supra, ubi de erysipelate dictum est, descriptione explicata fuit (166). Herpes enim ab erysipelate in eo potissimum discrepat, quod in hoc maior inflammatio est et febris, atque tiam celerius finitur. In herpete vero cutis magis rasperatur, quam in erysipelate.

§. 920.

Haec vitia difficillime tolluntur. Saepe enim, et ubi corporis habitus corruptus est, eum prius mutari portet. Summa vero diligentia adhibenda est, ne ulceratio intus datis medicamentis intendatur, id quod frequentius accidit, si calidiora, quae humidis argandis idonea vulgo creduntur, ei opponuntur. Et ius docuit, non omnibus eadem auxilia proficere. Opus est alui ductione frequenti per medicamenta non acria, satis tamen valentia, inter quae sunt rhabarbarum, tamarindi, mercurius dulcis, manna. Dari possunt decocta pro cuiusque hominis natura alia, quae alia, quae aduersus illud vitium sunt, quod in humidis esse ex certis signis intelligitur. Lenissimum quoque opus est, et quae pedetentim noxium humorem sumunt. Interdum proficiunt iuscula, si cum herbas ac radicibus ad id idoneis coquuntur. Senili corpori iuscula prodesse quandoque solent, quae viperis serbuerunt. Ab his curationibus vero et victus ra-

tione interius ante non facile desistere oportet, quacumque in melius mutari, apparuerit, praecipue, si tium penitus insedit et eius iam consuetudo facta. Interdum in salutaribus fontibus, interdum in asini lacte, praesidium est, quibus potis nonnulli, cum quasi ex toto eluissent, hoc malum tandem euicerunt. Parum proficiunt medicamenta, nisi cum his adhibetur abstinentia et modica corporis exercitatio, et victu paulo subtilior observatio.

§. 921.

Vbi autem corporis habitus mutatus fuit, malum nonnunquam sine extrinsecus admotis medicamentis finitur. Leues pustulae, si ieiuna salua quotidie fricantur, sanescunt. Caeterum imponenda sunt media non acria, sed quae, quasi blandiendo, leni reprimunt. Hanc facultatem habet cremor ex semipsyllii et cydoniorum paratus, cui parum mercurii dulcis atque cerussae adiici potest. Cerussa etiam aqua rosarum excipitur, paulum mercurii dulcis additur et pustulis illinitur. Ad reprimendum siccandumque magis potest illa aqua, quae recens paratum stibium diaphoreticum elutum fuit. Etiam proficit compositio, quae lapis medicamentosus Crollii dicitur, si ex paulum multa aqua diluitur et imponitur. Sunt, et decoctum radice lapathi acuti et chelidonii extollunt quo locum crebrius lauant. Alii succum citri et acetum vini, quod plurimum lithargyrii excepit, inter aequis portionibus miscent, et coagulum, quod his inuicem mistis subsidit, protinus loco exulcerato admouent. Hoc per tempus superhabitum, ubi caecus locus aqua abluendus, et nouum coagulum receptum imponendum est. Plurimum etiam valet emplastrum, quod album coctum dicitur, si id recte compositum fuit. Nonnullis hominibus cutis est rerum omnium

omnium impatientissima, et quae fere ab omnibus, quae imponuntur, exasperatur. In his per extrinsecus admota sanitas frustra quaeritur, quae saepe sine his a solo medicamentorum intus sumendorum usu et vitus ratione redditur. Nec ignorari oportet, in omnibus eiusmodi vitiis, quibus cutis infestatur, sedulo adhibendam esse munditiam.

* Vid. VILARS T. II. p. 47.

† De hoc morbo nihil habeo quod addam. Otium mihi fecit ANN. GAROLVS LORRY in *Traſtatu* de morbis cutaneis, Parisiis 1777 edito, vir laudatissimus, cuius laudes celebrare si vellem, viderer velle ipsi invidiam creare. Micat inter omnes. Legi quoque possunt, quae scripta sunt in *Recueil d' observation de Medecine des hospitaux militaires* par Mr. RICHARD DE HAUTESIERCK. A Paris 1766 - 72. T. I. et II. Nonnulla quoque non contemnenda leguntur in SCHMUCKERI *Vermischten chirurgischen Schriften* T. II. Contra eorum scriptorem hoc tantum dicendum est, PLATNERO curationes variorum generum herpetis faciles visas haud esse. Nemo vel parum in arte versatus, herpes aliaque cutis vitia curari facile posse dixerit. vid. §. 920 initium.

P O R R I G O.

§. 922.

Porrigo, alii tineam, fauum, achores, vocant, vitium est, ubi inter pilos quaedam quasi squamulae exurgunt, quae interdum madent, interdum siccae sunt, aliquando sine ulcere, aliquando etiam exulcerato loco. Neque id bene integro corpore nascitur, quod ex toto inutile non est. Nam saepe, si in humidis, praecipue in capite, alius morbus est, non incommodum est summam cutem potius corrumpi, quam, id quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Praestat igitur subinde caput peſtendo repurgare, quam porriginem ex toto impositis variis ex sulphure et mercurio paratis prohibere. Danda sunt medicamenta, quibus vitium, quod in humidis est, discutitur et lymphata tenuatur. Extrinsecus nihil vtilius est, quam ca-

Hh 4

put

put saepius radere et squamulas etiam crassiores radendo ita tollere, vt etiam vlcera cruententur, et imponere medicamenta ab initio nulla, post, quae leniter reprimunt. Parum ab initio haec proficere videntur, si vero saltem paulum iuuant, in eorum vsu perseuerandum est, quia et in his casibus profectus temporis expletur.

† Morbus hic, vt alii cutanei, raro tuto externis curatur, sed eius curatio a medicis requirenda est. Causam in lymphatico quodam esse satis docent glandularum lymphaticarum tumores, qui aut ante eruptionem crustarum exsurgunt, aut repressionem earum consequuntur. Quo altius in adipi causa crustarum radicata est, eo difficilior est curatio. Huiusmodi autem vitia cum varia et diuersa sint, remedia quaeque diuersa sint necesse est. Aliquando si corpus omni modo per medicamenta intus sumta vexatum fuit, proponitur omnium capillorum euulsio, qua etiam plerumque morbus sanatus videtur: Verum post aliquod tempus saepe reuertitur, aut in aliis externis partibus similis eruptio fit, aut quod peius, interdum lethale est, internarum partium morbi fiunt. Quae vel mediocriter in arte versatus ignorare non potest. Itaque nec medendi rationi illi fides protinus habenda, cuius reuelationem a Monacho quodam Magni Dux Heturriae magno pretio redemit. vid. *Mercurius a France. Octobre 1774.* et VNZERI *Medicinisches Handbuch.* Num pulueri bufonum testorum multumtribuendum sit, paene dubito, et eo carere curaturum posse credo.

A Φ Θ A I.

§. 923.

Aphthae dicuntur oris vlcera minora mucosa, quae oriuntur, si minores fistulae, per quas varius humor in os defluit, a lento vitiatoque humore exulcerantur. Non solum os, sed quoque fauces, stomachum, ventriculum atque etiam intestina infestare solent. Sunt quandoque cum inflammatione malaque febre, praecipue, si ventriculus atque stomachus inflammantur, in quibus casibus illae mortem denunciant, maxime si aphthae in elatiorem crustam degenerant,

nerant, et haec ab inferioribus faucibus quasi adscendit. Saepe igitur etiam aliis febribus accedunt, et tabidos quoque ac phthificos non parum excruciant. Si vero alienum obscurumque colorem accipiunt, plerumque gangraena subest, quae mortis index esse solet. Nec sine periculo sunt, quae resolutae celerius renascuntur. Morbus in locis paludosis, maxime in Belgio, frequentior et quasi endemius esse solet. Infantes crebrius iis laborant, si lacte vitiatō aluntur, et hoc in ventriculo coacuit.

§. 924.

Si aphthae ex mala ardenteque febre nascuntur, huic ante omnia succurrendum est. Plurimum valent omnia, quae corporis humida nimio aestu coacta diluunt atque tenuant. Dari et crebrius in ore contineri debent decocta ex emollientibus atque hordéo, cui adiiciuntur syrapi de althea, violarum et capillorum veneris, vel loco horum oxymel. Sunt, qui rapas contritas coquunt, bene despumant atque aegrodant, quem monent, ut ea, antequam deuoret, quam diutissime in ore contineat. Etiam radix glycyrrhizae, sarsaparillae, herba capilli veneris, flores verbasci, malvae, ex aqua vel lactis sero coquuntur. Profunt etiam cremores ex amygdalis et semine papaveris parati, ut et gelatina ex cornu cerui, cui quamplurimum succi acidi adiici debet. Gelatinas tamen ardentibus febribus non satis idoneas esse, medici non ignorant.

§. 925.

Haec omnia vero, quae emolliendi facultatem habent, profunt, si in ore diutius continentur. Ex iis etiam recte sunt gargarizationes, nec non lotiones subter in aluum dandae. Inter remedia etiam est nitrum et sal prunellae, si multa aqua diluuntur. Praeterea satis efficax ad mucum ex faucibus detergendum

medicamentum ex moris, vel ex nucibus, roob diameron et dianucum nostratibus dictum, quod melle cum rosa excipi et mediante penicillo vlceribus illini potest. Et his commode pauciores guttulae spiritus vitrioli adiiuntur, vt ad purganda haec vlcera et resoluenda mucosas crustulas medicamentum validius sit. Infantibus, si aphthae sine febre sunt, proficit rhabarbarum, et si victus lactantis mutatur.

VLCERA, QVAE ARTE FIVNT.

§. 926.

Cum observationibus cognitum esset, vlceribus in cruribus et aliis corporis sedibus ortis, multos atque fere desperatos morbos tolli, ars, naturam imitata, etiam vlcera excitare instituit. Quia autem veteres hoc frequentius ferramento candente cuti impresso executi sunt, haec vlcera inde nomen traxerunt; quae a recentioribus saepe cauteria vocantur. Nec pauci inter nostrates ea fonticulos appellant, quod ex iis, veluti ex fonte, mala materia fluere creditur.

§. 927.

Non vero omnes corporis sedes his vlceribus, siue fonticulis, opportunaesunt. Vitandae enim sunt venae atque arteriae, nerui etiam et tendines. Optime ea recipit tunica adiposa, quae inter musculorum carnes media est, et has inter se iungit. Si enim vlcus super ipsam carnem excitatur, illud frequentius, vel aridum fit, vel inflammatione cingitur. Sedes etiam eligi debet, cui homo manum admouere potest, quo is, si vlcus purgandum est et obligandum, aliorum auxilio haud indigeat. Locum vero inter musculos medium nosse licet ex diligenti horum in anatomicis exercitationibus contemplatione et ex motu, quem im-

imposito digito chirurgus percipere potest, si membrum mouetur. Musculi enim cuiusvis, qui motu cietur, caro, sub impresso digito mouetur et quasi gliscit, labatque, tunica vero adiposa, quae inter musculos media est, cum haud moueatur, attrectantis digitum haud afficit. Locus, si is repertus fuit, atramento notari potest.

§. 928.

Haec vlcera vero non vna ratione excitantur. Pauci reperiuntur, qui hac aetate cutim admoto ferramento adurunt. Plures medicamentum imponunt, quod adurendi facultatem habet, et illud tam diu relinquunt, donec super cutem quasi igne adustam crusta ostendatur, quam digerentibus, butyro recenti, vnguento aureo, et similibus, resoluunt, in sinum vero pisum, aliumue ligneum globulum, demittunt, illumque impositis pannis iniectaque fascia, vel vinculo ad id accommodato, valentius adstringunt. Ex adurentibus primo loco sunt lapis infernalis et lapis causticus chirurgorum (97. 907). Haec ita cuti admouentur, vt prius huic imponatur emplastrum, quod in medio foramen habet. In hoc foramen super cutem, quam prius salua humectari oportet, demittitur medicamentum, quod alio superimposito emplastro contegitur, et iniectis pannis fasciaque, quae arctius circumdari debet, continetur. Hoc per sex circiter horas relinquatur, donec crusta cuti, quasi igne adustae, fuerit inducta. Haec postea modo dictis medicamentis, quae per aliquot dies ei superunguntur, resoluitur. Ea resoluta, in sinum pisum vel globulus demittitur.

§. 929.

Expediitissimum vero est, cutim protinus scalpello incidere, et in vulnus pisum conicere atque super id fultis linamentis pannisque densioribus et fascia, quae
etiam

etiam arctius circumdari debet, continere, quo vuneris orae comprimantur, et hoc in vlcus vertatur (895).

† Fonticulus etiam fit, si paruum emplastrum vesicatorium fiat acre, cuti imponitur, et eleuata epidermis remouetur, pisumque adhibita fascia paulo valentius apprimitur.

§. 930.

Hi vero sic dicti fonticuli nonnunquam in summo capite excitantur, eo loco, vbi futura, quae ab occipite per medium caput procedit, in coronali futura finitur. Hic locus in pueris *fontanella* dicitur, quod ibi ossa deficiunt ita, vt cerebrum non nisi membrana contegatur. Eum inueniri difficile non est, cum is depressior sit, et tactu cognoscatur. Sunt tamen qui, vt illum reperiant, duas lineas ducunt a media aure ad mediam alteram aurem, deinde a naribus ad verticem, et vbi lineae committuntur, cutim incidunt, vel, quod maioris efficaciae est, candente ferramento adurunt, quod vehementer et ita infigunt, vt os etiam squamam remittat. Hoc valentius auxilii genus quandoque iis opitulatur, qui intolerabili et longa ac fere desperata cephalalgia laborant.

† Fonticuli in locis futurarum non decliuibus excitati cum duram matrem corrumperent, necem aliquando intulere. Quamobrem tutius excitantur in illo additamento futurae temporalis, ita iudicante BROMFIELDIO, l. c. p. 20. Neque vsus ferramenti candentis in capite satis tutus est. Vis enim ignis per os ad duram meningem transit. De hoc vid. DE HAEN in *Ratione medendi* etc.

§. 931.

In nucha opportunior his vlceribus sedes est inter alteram tertiamque colli vertebram. Videndum, ne vel ferramentum, vel, quod adurendi vim habet, medicamentum, vertebrarum spinas adurat. Per vlcera in hac sede facta quandoque siccescunt oculi lippientes et

et semper tenui humore madentes, nec non, qui caeteroquin ficci, ex leuibus momentis inflammantur.

§. 932.

Crebrius in brachio excitari solet fonticulus, cui in hoc membro opportunior locus is esse videtur, qui est inter deltoideum musculum et bicipitem medius. Aliis magis placet locus super infimam deltoidis partem, vbi is in tendinem degenerat. In femore supra genu ad quartum circiter digitum locus est depressior inter musculum vastum-internum atque gracilem, in crure vero ad quartum digitum infra genu inter musculum soleum et gasterocnemium externum.

§. 933.

Vlcus quotidie repurgandum atque pus extergendum, pisum etiam, quod in eo relinquitur, fascia adstringendum est et indies mutandum. Quod si super vlcus putris caro increuit, id respergendum est alumine, vel vitriolo vsto bene trito. Si vlcus aridum est, videndum, num ei subiecta sit musculi caro, et, si id repertum fuit, praestat, vlcus glutinari et aliud loco magis opportuno excitari. Si vero ex alia causa nulum pus ex vlcere arido effertur, quod homo febre laborat atque languore, illud idoneis medicamentis moueri oportet. Igitur in vlcus demitti potest globulus ex ligno sassafras tornatus, vel illud respergi puluere ex radice aristolochiae, gentianae albae, herba sabinae, addito pauxillo euphorbii, vel cantharidum bene tritarum.

§. 934.

Nec de his vlceribus omittendum, ea, si vetustatem adepta sunt in corpore, non sine periculo sanari (899). Quare oportet ea, nec temere excitari, nec, si vetustas et consuetudo accessit, in qua magnam vim esse nouimus, fiducia confirmatae a vetere morbo valetu-

letudinis facile glutinari. Ea autem prae caeteris multum profunt, si a qua nobili parte, cerebro in primis atque oculis, impetum materiae, qua vexantur euocari oportet. Praeterea, si quam partem, v. g. crura, mala manantiaque vlcera diu infestarunt, hi vero tandem cicatrix inducta fuit, per fonticulos, ii in propinquo fiunt, malae materiae olim fluere solitae exitus datur. Nec tamen iis noxia materia exhauriri potest, si morbus, veluti pituitae in oculis curfus, longior fuit et fere totam hominis vitam infestavit, cum iam partes, quae laborant, resolutae et infirmae factae sint; in quibus casibus, nec fonticuli nec alia auxilia, plerumque proficere solent*.

* Vid. III. HOFFMANNI Diss. de Fonticulorum vsu medico Halae, MDCCXXVII. Conf. GLANDORPII Gazophylacium Polyplasium.

§. 935.

Veteres consueuerunt varias corporis sedes semel iterumque admotis ferramentis adurere, id quod haec molliori aetate fere remedio esse desiit, cum pluribus nimis acerbum videatur, in viuum corpus igne saeuire. In Chirurgorum vero armamentariis eiusmodi ferramenta, quae variam figuram variamque magnitudinem habent, reperiuntur. Neminem securum esse, si arteriarum sanguinem periculosius fundentium ora impresso candente ferramento adusta fuerunt, alibi relatatum est (413). Nec mala vlcera et sarcomata atque carcinomata igne tuto curantur, si altiores egerunt radices, quae potius non parum eo concitari observatio docuit. Si vero haec vitia non nimis alte infra fitas carnes aliasque partes descenderunt, illa excidi commodius est. Non ita graue est, ossa, si illa supernatis malis vlceribus et fistulis vitata sunt atque cariota, candentibus ferramentis adurere, quoniam ea, si modo subsecta carne patefacta fuerint, minus sentiunt.

ant. De quibus satis alio loco dicam. Efficaciorem hanc medicinam veteres adhibuerunt aliis diuturno morbo laborantibus, praecipue hydropicis, quorum ventres atque pectora ferramentis candentibus pluribus locis exulcerauerunt et vlcera diutius seruauerunt *. Hoc auxilio et nostra aetate etiam veterinarii vtuntur, si articulus e sede sua non prorsus excidit, parumper tamen emotus iniuriam accepit, ita, vt humor in eum conflueret, quo os pedetentim ex sede sua expellitur **. Si enim ex his vlceribus igne factis copiosum pus effertur, id etiam humorem, qui intus coiuerat, quandoque secum trahere solet. In graui apoplexia homini, qui sine sensu et quasi dormiens acet, pedes horumque plantae ***, vel, id quod alii nalunt, caluariae futurae, aduri possunt ****.

* Vide HIPPOCRATEM de internis Affect. Sect. XXVII. T. II. Lind. p. 229. Conf. Sect. VI. Aphor. 27. p. 100.

** Vid. de Articulo humeri et coxendicis PAVLVM AEGINETAM L. VI. Cap. 114. p. 102. et Cap. 118. p. 103. Edit. Ald.

*** Vide MISTICHELLI Tractatum de Apoplexia, quem adducit HEISTERVS Chir. P. II. Sect. I. Cap. 22.

**** De eximio vstionis vsu vid. M. AVR. SEVERINI Pyrotechniam Chirurgicam.

† De noxa cauteriorum in calua vid. not. §. 930.

§. 936.

Iam olim veteres cutim varia materia, quam super a accenderunt, adusserunt *. Orientales populi erbae cuiusdam lanuginem, quam *Moxam* appellant, igitis premunt, in conum torquent, et super cute accendunt, quam vstionem praecipue iis, qui articulari morbo laborant, opitulari asseuerant **.

* HIPPOCRATES vsus est spongia oleo madente, de Visu T. II. p. 352. Lino crudo, *περί παθῶν* sect. 30. et 42. T. II. p. 180. Fungis, *περί τῶν ἐντὸς παθῶν* sect. 26. p. 229. sect. 28. et passim. Confer M. AVR. SEVERINVM c. I.

** Vide TEN RHYNE de Arthritide p. 86.

§. 937.

§. 937.

Exulcerari etiam cutis solet impositis cantharidibus, quae vel panis fermento, vel emplastro quodam excipiuntur, quod super alutae frustulum ducitur. Priusquam vero hoc, quod variam magnitudinem habet, imponitur, locus linteo asperiori fricandus, summaque cutis hac fricatione emollienda est, quo ea facilius capax materiae ex emplastro fiat: Emplastrum sexta vel octaua circiter hora tollitur, summa pellicula vel epidermis, quae in bullam leuata est, forfice inciditur, ac humor, qui intus coit, emittitur. Imponitur super cutim sic exasperatam butyrum, vel oleum. Parum quandoque prodesse solent haec vlceramenta nisi per plures dies seruentur: Hoc efficiunt cantharides, quarum si paululum butyro vel axungiae adiicitur, quae quotidie vlceri induci solet, pus mouetur, quod tandem etiam album crassumque nascitur, et ex vlcere fertur (297). In hac suppuratione tamdiu perseverandum est, donec morbus, cui per hanc curationem opitulamur, conquieuerit.

§. 938.

Cantharides vero super varias corporis sedes dantur solent. Crebrius super nucham, super vtrumque processus mastoideum, super tergum inter homoplatas (297), in artubus, super carpum atque suram, quandoque etiam olecranon. Profunt vero aduersus lipititudinem, praecipue illam, quam humidam vocauimus (277. 279), aduersus lethargum, et si inexpugnabilis dormiendi necessitas hominem vrget. Etiam si varii generis exanthemata, quae cum febre acuta oriuntur, latent tardantque, vel subito fuerunt repressa. Nocent in phrenitide, ac si homo crescente intentione febre desipit*. Renes atque vesicam offendunt, quare, si haec urinae itinera calculum, vel vlcus, habent;

bent, alienae sunt. Nam accidere solet, non tantum, si intus dantur, sed etiam, si extrinsecus diutius superhabentur, ut vesica laedatur, adeo, ut vrina cum summo dolore reddatur, et nonnunquam cum ea sanguis descendat. Aduersus id vero auxilium est in lacte epoto, vel in amygdalis et papaueris semine, si ex his cum aqua contritis cremor, vel sic dicta emulsio, paratur (124) *.

* Vide BAGLIVII *Praxin Med. Lib. I. in Operibus p. 102.*

† Vesicas quoque admotis aliis non paucis, eleuari in cute vulgo nota res est, vid. HERM. BOERHAAVII *Institut. §.* Nostra aetate multum cortici Mezerei tribuitur.

§. 939.

Setaceum nomen traxit a fetis, quod olim chirurgi pilis ex equorum caudis ad id vterentur. Vlcus est, quod fit in cutè, si per eam, quae, vel digitis, vel forcipe, leuatur, acus latior pleniorque incurua, vel calpellum, aliudue ferramentum, traicitur. Transmitti vero per vlcus debent lina plura xyлина, ita torta, ut in iis vnitas sit. Hoc linum ita tortum, vel protinus in acum coniicitur, qua cutis perforatur, vel, si vulnus mediante scalpello factum est, acus obtusa linum illud trahens per viam prius perfectam traicitur. Veteres ad id ferramento candente vsos esse legimus *. Hoc linum bis in die ducendum est, sic, ut subeat vlcus pars, quae pura est, altera vero pars pure infecta praecidatur. Illud, quod in vlcus immittitur, tiam medicamento circumliniri potest, ad pus citandum, vlcus etiam exasperandum, idoneo. Vbi linum efficit, ad vltimum veteris caput alterum recens linum lligandum, vel hoc mediante acu retusa iterum traiciendum est.

* Fere ad HILDANI tempora Vid. Cent. I. Obs. 40. Conf. tamen GLANDORPII *Gazophylacium p. 102.*

§. 940.

In nucha plerumque haec vlcera excitantur, raro in aliis sedibus. Nonnulli acum linumque per longum traiciunt, id quod aegre ac difficulter fit, alii pertransuerfum inter ceruicem et alteram colli vertebrae alii oblique *. Priusquam ferramentum immittitur cutis digito lauari et locus atramento notari debet.

* Vide GLANDORPIVM c. l.

§. 941.

Haec curatio, quamuis acrior fit, quandoque requiritur in longa, et quae nullis aliis auxiliis expugnari potuit, lippitudine, nec non, si aliis vitiis, oriente suffusione, vel amaurosi, videndi facultas laeditur etiam in hydrocephalo, lethargo, et vbi humor non aque materia longa magnaue suppuratione exhausta est.

F I S T U L A.

§. 942.

Fistula, quae ex abscessu atque vlcere fit, est vlcus altum, angustum, callosum. Nam vlcus, quod ab angusto ore orsum altius penetrat et intus cauum ampliatur, si sine callo est, quamuis a pluribus quae ad fistulas referri consueuerit, sinus, vel vlcus sinuosum, vocatur.

* Vide Diff. meam de Fistula lacrymali MDCCXXIV. Vlcus quod magnum est, non vero profundum, oras tamen duras atque callosas habet, vlcus callosum vocatur. Sinus, qui sine callo est, Graecis κάλπος, si vero ei callus inductus est, σύγερξ vocatur. Vide GORRAEVM. Confer HENR. STEPHANI Expos. Vocab. Med. p. 377. et 478.

† Fistulae notionem PLATNERVS ita, vt et multi alii, interpretatur, vt callum ab ea abesse non posse putet. Verum CELSUS ipsissimis definitionem concepit. Verum CELSUS in alio loco eiusdem Cap. 28. Lib. V. se ipse vel corrigi vel explicat, vbi dicit: *Vetustate callosa fit fistula.* Ergo
callo

callosa non est, dum recens est, fistula. Consequens igitur est, ut fistula vlcus angustum et paulo longius procurrens recte dicatur.

§. 943.

Callus tunica est alba, aut pallida, dura, quae sine sensu est, ita, ut etiam specillo tacta, dolorem haud adferat. Ea nascitur ex vario humore, qui ex vlcere effertur, ex quo, si is non abstergitur et vlcus haud purgatur, quasi limus subsidit, qui vlceri adhaerescit et tandem crassior duriorque factus in callum vertitur.

† Neque calli genesin semper ex humore purulento, non absterfo eo, partes spissas demittente, deriuandam esse facile patet. Nam fibrosa calli natura satis docet, eum ex solidis partibus a varia causa mutatis existere. Interdum et saepius quidem fistulae parietes interni inflammatione quadam affecti duritiem quandam contrahunt. Interdum loci vlcerosi compressio callum efficit. Iniecta spirituosa, adstringentia, siccantia non raro symbolam suam conferunt. Inflammatoriam conditionem fistulae et ipsae causae, et iniecta acria, et ipsius materiei purulentae irritatio creant.

§. 944.

Fistularum aequae, ac vlcerum (893), propria sedes in adipe est. Nihilominus solent, si altius et ad alias partes, carnes, membranas, cartilagineas, ossa, penetrant, etiam eas violare. Plura caeteroquin earum genera sunt, quae inter se non parum discrepant. Quaedam sub cute transversae feruntur, aliae rectae tendunt, aliae breues sunt, aliae longiores, quae et altius penetrant. Aliae simplices sunt, aliae multiplices, quae ab vno ore orsae intus in plures sinus iuuantur. Aliae rectae sunt, aliae flexae et tortuosae. Aliae intra adipem, vel carnem, desinunt, aliae ad ossa, aut cartilagineas, penetrant. Interdum ad interiora, pectus, abdomen, intestinum, etiam articulum, perueniunt, et has cauas sedes perrumpunt.

§. 945.

Scire licet, quo fistula tendat, et quam alte, specillum in eam demittitur. Necesse vero est, ut si fistula intra adipem carnesque fertur, omnes muscoli, qui iuxta sunt, quiescant, qui, si agunt, sinus premovent et prohibent, quo minus in hos specillum compelli possit. Quia etiam saepe in tortuosis varii flexus reperiuntur, quos chirurgus non omnes protinus specillo persequi atque inuenire potest, necesse est, ut dum hoc demittitur, aeger aliter atque aliter collocetur. Scire etiam possumus ex modo puris, quae nam sint fistulae spatia, cuius, si plus fertur, quam ut minori et simplici spatio conueniat, maiores pluresque sinus esse, significat. Etiam in fistulam, mediante siphone, aqua, vel quaeuis lotio, immittitur et ex modo aquae, quem illa recipit, illud discitur. Si sinus sub cute feruntur, ii, si callum habent, tactu admoto cuti digito, sentiuntur. Saepe non nisi longa atque repetita inquisitione fistula recte explorari potest. Vbi iam fistula incisa et sinus apertus est, eo vero alii sinus, et quasi riuuli, procedunt, id ostendit minutus admodum et candidus pauloque elaticus orbiculus, in quo exitus noui sinus est. Is vero nonnunquam tam angustus esse solet, ut nec tenuissimum specillum admittat.

† Fistulae ductus quoque in conspectum prodeunt, si exitum immissa turunda obstruit, atque sic humor purulentus colligitur, ductusque eo turgent, non altius sub cute conditi illi. Dolor quoque, mutatus cutis color de tractu fistulae aliquid manifestant.

§. 946.

Etiam, si specillum in fistulam demittitur, sciri possumus, quo usque ea penetrauerit, et quatenus nocuerit. Nam, si molle est, quod ultimo specillo contingitur, et aeger dolorem sentit, vitium intra

carnes est, et callus nondum induruit, qui magis renititur et sine sensu est. Maior renifus est, si fistula ad os penetrauit. Ibi, si specillum dilabitur, os adhuc perioftio contegitur, et nondum carie vitiatum est, si vero specillum non dilabitur sede, qua innititur, et si inaequale atque asperum subest, os iam vitium contraxit, idque carie exesum est. Etiam sanies, quae ex fistula fertur, docet, quaenam partes perrosae sint (897).

§. 947.

Quemadmodum ex abscessibus variis atque vulnorum generibus vlcera oriuntur (894. 895), sic profundiores sinus atque vlcera, praecipue si in adipe sunt, in fistulas degenerant, id quod ex similibus fere causis accidit; Si vlcera non recte purgantur, et in ea, vel nulla, vel leniora, vel nimis acria, medicamenta lemittuntur, si vlceri impuro admoventur alia ex alcohol parata, si orae vlceris linamentis, turundis, panis atque fascia nimium comprimuntur, fistulae nascuntur. Corruptiora etiam vlcera fieri et difficilius purgari, si in corpore mali habitus sunt, ex supra dictis intelligitur (894), quorum etiam promptior transitus in fistulam est.

- † Fistula vetus, qua corpus hactenus tanquam fonticulo perpuratum fuit, non tuto ad cicatricem perducitur. Fistula recentior, a nulla humorum prauitate effecta vel nutrita, solam curationem extrinsecus adhibendam poscit. Quae vero a vitio in humidis deriuata est, vix nisi illis mutatis, ab externis opem accipit; aliquando purgatis humoribus sponte purgatur et ad cicatricem quasi festinat. Quod praecipue fieri assuevit, si lue gallica infecti recte et feliciter ab ea liberantur.

§. 948.

Facilem curationem recipit fistula recens, simplex, quae sub cute fertur, quam plurimum adiuuat corpus, si iuuenile, integrum et firmum est: Vbi vero

fistula altius descendit, eaque os, cartilagines atque membranas et tendines laesit, vel, si ad articulum, arteriam venamque maiorem, stomachum, asperam arteriam, tendit, si in cauum, in pectus atque ventrem penetrat, difficilior sanescit, et saepe insanabilis est. Nec facilem curationem admittit illud genus, quod incisa propter calculum vesicae, in perinaeo relinquitur. Pessimae etiam sunt fistulae, quae intestina perforaverunt (§. 674. 841).

§. 949.

Nec alia earum curatio est, quam ulcerum (900). Vbi vero purgari debent fistulae et in vulnus reconverti, necesse est, ut callus tollatur. Is vel scalpello exciditur, vel validioribus medicamentis eroditur, donec vlcus purum sit et undique aequale. Nonnumquam etiam callus, si excidi non potest, vincitur, si scalpello conciditur, et impositis, tum rodentibus, tum emollientibus ac digerentibus, liquatur.

§. 950.

Medicamenta, quae callum vincunt, non alia sunt, quam valentiora ex iis, quibus ulcera purgari docentur (901. ad 910). Ex primis fere est spiritus salis ammoniaci (907). Sunt etiam quaedam aliae medicamentorum misturae efficaces. Varii generis emplastris, v. g. diasulphuris Rulandi, stictico Crollii aeruginem, alumenustum, aliaque valentiora rodentia adiiciunt, illaque calore cogunt, ut inarescant et per se stilli crassitudinem habeant. Hos pastillos figurant, ut sint altera parte tenuiores, altera paulo pleniores, atque ea parte, qua tenuiores sunt, in fistulae profundiores sinus coniiciunt, qui in his mollescent ac liqui fiunt, tandemque callum exedunt. Cum vero haec medicamenta, quamvis liquecant, non semper ad intimam fistulam et alios, qui altius procedunt, sin-

fera

ferantur, alii varios liquores componunt et mediante siphone in fistulam immittunt. Nec desunt, qui variis vnguentorum compositionibus vtuntur, quas turundis et linamentis superillinunt et in fistulam coniciunt.

§. 951.

Quod si autem fistula ad os aliquod penetrauit, et hoc iam vitium contraxit, omnis curatio superuacua est, nisi omne, quod ex osse corruptum est, tolli possit. Hoc saepe, si vitium latius, vel profundius, est, ac satis patefieri nequit, perdifficile est, ac nonnunquam effici nulla ratione potest; quales etiam fistulae sanari nequeunt.

§. 952.

Vbi vero fistula ad neruum, vel neruosum locum, tendit, quem subesse, et anatome, et humor, qui effertur, et ipse dolor docent, metus esse potest, ne ab his acrioribus medicamentis illae partes grauem offensionem accipiant. In his casibus rodentia et exedentia aliena sunt, et magis proficiunt, quae vlcus aridum reddunt, aqua calcis, aqua phagadaenica, essentia succini, elemi, mastichis. Haec gummi etiam cum terebinthina ac oui vitello misceri et immitti possunt, quibus quandoque etiam callus, si is paucus est et tenuis, vincitur.

§. 953.

Si fistula sub cute transversa fertur, in illam, si longior est, et aeger scalpelli operam reformidat, demitti potest specillum et fistula contra huius caput altera parte incidi. Per fistulam traici potest linum medicamento idoneo illitum, quod indies adducitur, donec purus fuerit sinus, qui, vt vulnus, glutinatur (Conf. §. 478). Ad quam rem idoneum est ferramentum Petiti, quo et sinus altera parte perfoditur, et linum commode traicitur.

* *Le Troisquarts a Contréouverture* v. GARENGEOT T. I. p. 491. f. 2.

§. 954.

Longe tamen maius certiusque in manu praesidium est, quam in medicamentis, quae raro ad ultimas fistulas arctioresque earum sinus perueniunt. Fistula vero si aliquid corruptum relinquitur, id quod, si ea solius medicamentis purgatur, crebrius incidit, vel glutinare nequit, vel cicatrix, si inducta fuit, breui iterum rum pitur. Expeditissimum igitur est, specillum, quod sulcum habet, in fistulam demittere, et hanc super id recta incidere. Oportet vero omnes sinus persequi et, si illi intus tendunt altiusque descendunt, illos latius etiam duabus, aut pluribus, lineis incidere, ut unus sinus oculis digitisque pateat, ex quo callus minori negotio maiori securitate auferri potest. Si fistula transfversa est et altera parte exitum non habet, in eam coniicitur specillum, cuius extremum excavatum est. Hoc altera parte cutis perforatur, sub id vero omnis caro cutisque, quae super fistulam est, scalpello inciditur. Repererunt etiam alia genera scalpellorum, et inter haec etiam id, quod reconditum elatere mouetur *.

* *Le Bistouri caché ou herniaire*, v. GARENGEOT T. I. Chap. VII, Art. 3. p. 232. et 243. Hunc scalpellum paulum mutauit Cl. SENFFIVS, vid. fig. XVII.

§. 955.

Incisa vero fistula callum etiam tolli oportet, qui ex ea vel totus exciditur, vel scalpello, et, id quod melius est, quia maiorem inflammationem ac suppurationem mouet, forfice conciditur, vel medicamentis, ad id validioribus aduritur, vel pedetentim eroditur. Expeditior curatio est, quae scalpelli opera fit. Ad medicamenta autem veniendum necessario est, si fistula intus aliqua procedit, quo scalpellus tuto per-

venire

venire non potest. Callum veteres candente ferramento adusserunt.

§. 956.

Callus si vel excisus vel erosus est, et se purus sanguis ostendit, in sinum coniicienda arida linamenta sunt, ne per malam curationem orae sanescendo iungantur. Sinus, ut alia vulnera, curatur, donec ad cicatricem perueniat. Nec etiam negligi debent medicamenta, quae ad humida in corpore purganda valent. Haec in primis necessaria sunt, si fistula a vitio, quod per omne corpus diffusum est, enata fuit, aut, si illa corpus, quod mali habitus est, occupat.

† Fistula sub cute progrediens, posteaquam purgata est, curationem quoque accipere potest, si parietes interni idonea compressione per splenia et fascias ad se mutuo adducti, collectionem noui humoris non amplius admittunt. Ita enim conglutinantur atque concresecunt. Quomodo genus quoddam vincturae prodesse possit, in loco de fistula ani dicitur.

†† Fistula breuior et recta ad carnes descendens paulatim amplior fieri quidem potest turundis ex rapa siccata, spongia marina compressa etc. paratis; expeditior tamen eius curatio est, qua scalpellus superiores fistulosi vlceris partes vtrinque incidendo diuidit. Ita enim vlceris ima pars patet et purgari potest.

FISTULA LACRYMALIS.

§. 957.

Sunt etiam plura vitia circa illa itinera, per quae humor ad nares destillat, quo oculi, ne arescant, naturaliter humidantur. Is humor ex variis fontibus in oculum lapsus in eo sub palpebris confunditur. Tenuior halitus fertur e membrana, qua et palpebrae*, et oculus, et cornea etiam**, conteguntur. Limbidus, sed longe copiosior, humor e glandula maiori innominata permanat ad oculum per ductas, admodum

dum vero angustas, vias, quae palpebrae supremæ inhaerent, et ad huius cartilaginem usque pertinent ***

Qui humor, si is redundans se per genas profundius lacrymarum nomine vocatur. Accedit pinguitudo et glandulis ad cartilaginofas palpebrarum oras positis, quibus nomen ab inuentore, Meibomio, impositum est.

* Vide WINSLOW Anat. T. IV. P. II. §. 216.

** WINSLOW c. I. et C. A. R. Sc. MDCCXXI. p. 417.

*** WINSLOW c. I. §. 176.

§. 958.

Id quod vero huius humoris exhalatione haud diffunditur, per directas ad nares vias perlabitur. Ad oculi angulum internum prope palpebrarum cartilagine duo quasi puncta cernuntur, quae sunt osculorum palpebris inhaerentium, seu ductuum lacrymalium, qui ad oculi angulum coeuntes spatiosius receptaculo, quod saccum lacrymalem vocant, inferuntur. Hoc receptaculum enim accipit humorem agitatione et motibus, tum palpebrarum, tum oculi ipsius, depulsum et quasi detrusum. Non parum hunc lacrymarum motum adiuuat caruncula, quae inter ductus lacrymales in eodem oculi angulo posita est, et cui etiam antèr tenior membranula, quasi lunata innectitur. Hac enim caruncula prohibentur lacrymae, ne per oculi interiorem canthum efferantur, id quod incidit, si illa vel per morbum exesa, vel per malam curationem excisa, fuit. Asperior est et hirsuta pilis etiam munita, quibus, si quid siccae aridaeque pituitae in oculo est, inhaeret, ne id se illis viarum osculis opponat et humorem destillare prohibeat. Saccus lacrymalis illigatur ossis lacrymalis parti anteriori, qua sede is exiguum musculus ab osse plano ortum habere dicitur, cuius actione lacrymarum motus ad nares adiuuari videtur *. Hoc enim officium

lum, quod tenue est et admodum rarum, in duas partes excessu quodam, seu linea prominente et deorsum spectante, diuiditur. Pars ossiculi posterior, quae cum osse plano ethmoidei committitur, ad orbitam pertinet, anterior vero, quae sinuata est, lacrymalem faccum excipit, qui illi extanti lineae, quasi per vincula quaedam, medio perioestio innectitur. Hoc lacrymarum receptaculum, quod ea parte amplum est, iterum coarctatur et recurvatum atque posteriora versus paulum inclinatum ad ima dirigitur. Vocatur ductus nasalis, qui per foramen, quod sub osse maxillari ab orbita inferiori parte est, ad narem tendit, in qua sub osse turbinato inferiori finitur **.

* Quem a du VERNEY chirurgus inuentum describit CORN. V. REVERHORST in diss. de Aegilope, Lugd. Bat. MDCCXXXVIII.

* Vid. ANEL *methode de guerir les fistules lacrymales*, BIANCHI Ductus lacrymales nouos, et huius censuram, in MORGAGNI Aduers. VI. Confer de Fistula lacrymali Dissertationes: LAUR. HEISTERI, de Methodo sanandi fistulas lacrymales, Altd. MDCCXVI. meam. Lipsiae, MDCCXXIV. IO. CASP. SCHOBINGERI, Bas. MDCCXXX.

§. 959.

Ex varia occasione accidere potest, vt haec itinera lacrymas non transfinitant. Nonnunquam glutinosior humor iis inhaerescit, vel polypus, qui narem implet, intus se humori defluenti opponit *.

* Vid. LE DRAN P.I. Obs. 6. p. 42.

† Tunica interior viarum lacrymalium quasi reflexa, at teneior tunica pituitaria est, quae mucum ad vias aduersus lacrymarum acrimoniam defendendas secernit. In pueris igitur, hominibusque aliis pituitosis, iste mucus copiosior et spissior secretus obturare et obstruere vias eas potest, sic vt sacco lacrymali impleto, per puncta lacrymalia refundantur lacrymae.

§. 960.

Longe tamen frequentius euenire solet, vt haec lacrymarum itinera per inflammationem intumescant, et lacry-

lacrymas, quo minus delabantur, prohibeant. Nam illa, ex duabus veluti tunicis composita, inter haec cellulofum contextum, interius autem glandulas habent*; quae res non parum confert, ut haec quoque partes inflammationibus pateant. Frequentius eam patiuntur homines, qui simis depressisque naribus sunt.

* Vid. WINSLOW c. l. §. 349. Conf. REVERHORSTIVM c. l. C. p. 19.

§. 961.

Sunt autem varia, quae inflammationem movere possunt. Observatione compertum est, haec vitia crebrius post variolas atque lippitudines oriri. Variolae orientibus, et cutis, et non raro interior oculus, inflammatur exasperaturque. Atque deterioribus variolis subesse solet fanies acrior, quae, ut alias sedes, sic etiam haec itinera, rodit atque exulcerat. In lippitudine id quoque facit lacryma calida atque acrior, quae etiam nonnunquam densa in genis cutis roditur, et qua illae teneriores tunicae inflammari possunt (289). Interdum etiam, sed raro, ex his causis in iis itineribus exulceratis carunculae nascuntur fungis similes, quibus illa coangustantur. Omnia haec magis intenduntur, si corpus corrupti habitus est, et id venerea lues, aut scorbutus, occupat. Non raro enim noxa ab interioribus et ipsis ossibus incipit, si circa haec foeda ulcera sunt, eaque vitiata, qualia esse solent, si nares ozaena infestat. In cutem etiam super lacrymarum receptaculum occasio esse potest, si varii generis tubercula, furunculi, abscessus, tumores tunica sua inclusi (758), nascuntur, si erysipelas, vel per se, vel quandoque iterum facientibus, ob aestus immodicos oritur. Si quacunque vi extrinsecus allata haec sedes vexantur inflammanturque et iis lacrymarum receptaculum premitur atque coarctatur. Nam lacrymae, quae ad narem perlabi nequeunt, in sacco haerent, atque tandem natura sua

sua corporisque calore corrumpuntur, acres fiunt et tunicas rodunt atque exulcerant.

§. 962.

Scire autem licet, haec itinera ita affecta esse et per inflammationem, aliamue causam, coarctata atque compressa, si per puncta lacrymalia humor, cui pituita admixta est, in oculum, etiam perpetuo humore madentem, fertur, et quasi cum impetu erumpit. Per se id fieri solet, quando eius maior vis in lacrymarum receptaculum confluit, vel etiam, si is acrior factus, illud rodit. His enim interior tunica, forte etiam ille minor ei inhaerens musculus (958), conuelluntur, quibus humor ille, qui huc defluerat, excutitur. Crebrius etiam hoc incidit, si aeger vel tussit, vel sternuat. Humor praeterea ex lacrymarum receptaculo exprimitur digito, si eo cutis extrinsecus paulo valentius remittitur. Nam, si vitium non ultra processit, illud oculis non patet, cum nec tumor sit, nec cutis alienata, nec aeger dolorem sentiat.

§. 963.

Sedulo considerari oportet humorem, qui ex osculis, vel punctis, exprimitur. Is enim, si lacrymis similis, tenuis, pauciori albidaque pituita remissus, adparet, intelligitur, malum incipere, et lacrymarum itinera leuiter affecta nondum grauitur laesa esse. Si autem humor exit, qui omnia contraria habet, malum iam alius latiusque processisse ostendit.

§. 964.

Neque difficillimum est, hoc vitium, si illud reus ac simplex est, sanari, quod vero, si singulis noxarum morborumque generibus verum atque proprium nomen dandum est, fistula vocari nondum potest (941); nec, postquam ANELLVS specillum et siphunculum reperit,

reperit, quibus id, quod se his itineribus opposuit, promoueri potest, scalpelli opera necessaria est. Vbi vero inter initia huic non recte succurritur, et vlcus ventositas occupat, id saccum lacrymalem exest, latius serpsit atque tandem callo obducitur, et in veram fistulam eductam generat. Os, quod subest, cariosum quandoque in malo vlcere fieri solet. Oculorum etiam acies tandem illa sanie, quae per puncta effluit, non parum offunditur.

§. 965.

Curatio igitur prima est, in alterum illorum osculorum, vel sic dictorum punctorum lacrymalium, specillum demittere, cuius repertorem ANELLVM fuisse retuli. Specillum vero, quod in punctum lacrymale demittendum est, esse debet ex argento, paululum incuruum, laeue, ab altera parte plenum, ab altera vix tenue, hac tamen exiguo globulo munitum, ne itinere illa laedat.

§. 966.

Homo super subsellium collocatur, Chirurgus pollice atque indice alterutrius manus palpebras deducit easque paululum tempora versus adducit, ita, vt illa puncta, vel oscula, oculis pateant. Per id, quod in superiore palpebra est, specillum minori negotio compellitur, cum iter, quod paulo longius est, minorem fluctum habeat. Ergo per id non tam premendo, quam vertendo torquendoque, specillum demittitur. Vbi autem saccum lacrymalem ventum est, illud paululum inclinari oportet, quo per compressiorem viam, quae in narem pertinet, descendat. Si aliquid se intus opposuit, id paulo maiori vi adhibita promouendum est, vt per narem excidat. Si via aperta est, plerumque aliquis humoris, quandoque etiam sanguinis, per narem defluit.

§. 967.

§. 967.

Perfecta igitur via specillum concuti debet, et iterum recipi, puncto lacrymali autem aptari et in id demitti exiguus siphunculi tubulus. Mediante siphunculo in lacrymarum receptaculum immittitur liquor, quo illa, quae in eo est, exulceratio abstergitur. Alios atque alios liquores extollunt autores, prout ea, quae adhibuerunt, cuique cesserunt. Satis valet, si parum salis thermarum aqua verbenae diluitur. Vbi vlcera sordida latitant, aqua calcis parum nitri et parum camphorae cum saccharo tritae commode excipitur, et ad id adhibetur. Necessesse est, ut liquor tenuis sit, quo is per minorem tubulum possit traici; sub finem etiam parum aquae vulnerariae admisceri potest. Fere melius res succedit, si in inferioris palpebrae punctum liquor immittitur, ut is non deorsum, sed fere per transversum, in punctum lacrymale feratur. Eo tempore, quo liquor ex siphunculo exprimitur, id quod digito indice attingit, minimus et annularis ossi malae innituntur. Haec curatio aliquoties per diem, et tandiu adhibenda, donec vlcera siccata fuerint, et nullus humor ex lacrymarum viis digito pressis exeat.

§. 968.

Hanc curandi rationem, quam plures contemnunt, experiri in his casibus decet, cum ea raro, et vix, nisi minus peritos atque parum exercitatos, fallat. Nec tam acerbos dolores excitat, si provide et ea adhibita diligentia specillum demittitur, ne id itinera, per quae fertur, conuulneret. Si etiam quandoque res minus succedit, id quod in hominibus nasum sinum ac valde repressum habentibus evenire potest, eam nulla pericula circumstant. Nec tamen hanc curationem experiri convenit, si corpus aegrum ac mali habitus est, et si prius ophthalmia, ozaena, aliusue morbus, ex quo hoc

hoc vitium enatum fuit, omnis fuit remotus. Super vacuum est, addere, et ad haec necessarium esse victu tempestiuum, modicum, et, qui omnibus acribus vac

§. 969.

At, vbi lacrymarum receptaculum, quod peruium non est, extrinsecus in tumorem leuatur, alia curatio opus est. Certis vero notis cognoscitur, saccum lacrymalem, non vero solam cutim, intumuisse. Tumor enim plerumque sine inflammatione est, qui, si digito premitur, desidit, quod lacryma pauca pituita remissa ex punctis lacrymalibus effertur; breui autem is tumor affurgit. Sunt, qui hoc valetudinis genus hemorroidalem, et, si itineri, quod ad nares tendit, se aliquid obposuit, et ex eo atque confluyente humore lacrymarum receptaculum intentum est, hydropem sacculi lacrymalis appellant*. Si eiusmodi tumor cum inflammatione est atque ad suppurationem spectat, ἀγγίλωσις nomen est, qui vero tumor durus esse, prementique digito renititur solet. Accidere etiam potest, vt in cute super lacrymarum saccum tuberculum oriatur, quod, si inflammationem accipit, illum intenta cute valentius premit, ita, vt per compressum iter lacrymae destillare nequeant.

* Vid. ANEL de l'hydropisie du conduit lacrymal.

§. 970.

Lacrymarum receptaculo, quamuis tumentis, se intus nihil opposuisse, idque peruium esse, scire licet, lacrymis nihil obstat, quo minus in nares defluant. Res etiam specillo significatur, si hoc nihil inuenitur quod ei oppositum renititur. Id vero indicio est, tunicas illius receptaculi, vel sacculi, ictu extrinsecus illato vel alia quacunque occasione, fuisse infirmatas. In hoc casu sedulo obseruari oportet ipsum tumorem, num integer sit et cuti similis, num vero alienatus, vel de-

rior, factus. Si praeterea nihil vitii habet, is tolli quandoque potest pressione. Super eum charta bibula masticata, et super hanc densiores et multiplices panni imponuntur, superque iniicitur fascia, vel ferramentum ad id excogitatum *; quae omnia per plures dies ita relinquenda sunt. Certus vero modus necessarius est, ne nimia pressione lacrymae prorsus prohibeantur, et ne, glutinatis inter se tunicis, excoecatisque, per quae illae ferebantur, itineribus, grauius malum accedat. Subinde cum his mediante siphunculo in has vias immitti potest aqua veronicae, verbenae, hyssopi, aliae, quae paululum adstringit.

* Vide Dissertationem meam de Fistula lacrymali, fig. 3.

§. 971.

Quod si vero parum sic profectum est, tumorem est, sed exigua plaga, incidi oportet. Commode id fit super specillum minus (965), per lacrymale punctum demittendum, scalpello minori falcato. Etiam, si scalpellus admouetur, super tumorem palpebris imponi potest digitus sinistrae manus, ne humor reuertat, et omnis in oculum effluat, sicque tumor dedat. Vulnus impositis idoneis medicamentis ad cicatricem perducitur, ita, ut tunicae per hanc contrahantur, et receptaculum coarctetur. Cura tamen habenda est, ne nimis arctum fiat illud iter, et ne lacrymae, quo minus destillare possint, prohibeantur. Plurimum iuuat specillum, si id subinde demittitur, et si extrinsecus iniicitur fascia, vel illud machinamentum, quod ad comprimendum saccum fuit repertum (970).

§. 972.

Nec alia curatio est, si lacrymarum receptaculum utrisque caro, vel caruncula, impleuit (960), vel, si se ipsum quid opposuit, quod specillo renititur et eo prooueri nequit. Nam in hoc casu etiam saccus inci-

Kk

dendus

dendus est, et specillum per factam plagam in viam quae ex sacco in narem tendit, demittendum. Rentis vero et exesis carunculis, vulnus curatur.

§. 973.

At, si iam lacrymarum itinera exesa sunt, proxima sedes vlcus, et accedente callo, vera fistula occupat. Atque huius etiam plures species sunt. Nam quandoque vlcus sub cute adhuc integra est, aliquando in angulo apertum oculis patet, quod ultimum genus *αιγίλωψ* proprie dicitur. Aliquando etiam alio ossiumque praecipue vitium, seu caries, accessit. modo autem et genere illius humoris, qui exit, digitumque exprimitur, et demisso etiam, vel per naturam illa horum itinerum oscula, Anelli specillo, vel per apertum vlcus alio, scitur, quam late pateat vlcus, an callus inductus sit, et an etiam os, quod subest, exoperiostio vitium contraxerit.

§. 974.

Verae autem fistulae lacrymali succurri nequit, nisi admota ad eam illi ardui operis et ancipiti curatione qua lacrymarum receptaculum tolli, vlcus purgari, perforata seruataque noua ad narem via lacrymae hanc deriuari oportet. Hanc vero curationem, ne puerilis, nec senilis, aetas, nec corpus recipit, quod aegrum et corrupti habitus est. Neque etiam ea curatione perienda est, si aeger vetustum, grauem, et, vel acutum, vel fere continuum, capitis dolorem, habet, et oculus lippitudine vexatur. Etiam in omnibus ad eam festinare praecipue videtur, cum vtique non raro, facit, et post eam etiam oculus in nonnullis perpetuo humore madeat. Corpus etiam aliquot diebus ante victu, sanguinis missione, et alui ductione praeparandum esse ex alibi dictis intelligitur. Omnia caetera qui

quin necessaria sunt, quae graui-
tunt (389. 390. 399. ad 402).

§. 975.

Curatio ipsa hoc modo ordinatur: Ocul-
us uterque imposito panno minori ex liquo-
re qualem alibi praecipi (292), et super inie-
ctus colloquendus est in loco lucido, lumine
sic, ut medicus contra paulo altius sedeat. Caput a po-
steriori parte manibus ministri validioris contineri et
immobile praestari debet. Inciditur cutis lunata figura,
cornibus eius ad oculum spectantibus. Incipit ea ad
nasi radicem super illum locum, ubi tendo musculi or-
bicularis ossi, et quidem illi processui, qui ab osse ma-
illari ad nasi latera confurgit, inhaeret, finitur plaga
sub inferiori palpebra huiusque medio. Cutis melius
secatur, si illa digitis alterius manus adducitur et inten-
ditur. Magna vero cura habenda est, ut pars quae-
dam cutis, qua in oculi angulo palpebrae inter se com-
mittuntur, integra relinquitur. Nam si illa praecidi-
tur, adurit, vel medicamentis roditur, oritur *ἐκτρο-
χίον* (582), quod nulla curatio restituere potest. Hu-
ius vitii metus haud est, si tendo musculi orbicularis
secatur. Vitari potest vena, quae in angulo interno
oculi ad nasi radicem discurrit. Si vero haec laesa
fuerit, vel, si caeteroquin ex vulnere multus sanguis fer-
tur, curatio commode diuiditur, et sanguis impositis
inamentis atque fascia cohibetur.

* Vid. WINSLOW de Venis §. 88.

§. 976.

Vbi autem is conquieuit, omne lacrymarum rece-
ptaculum praecidendum, et eius, quantum fieri potest,
excidendum est. Nam, si id, quod vitiatum est, relin-
quitur, accidere potest, ut humor post curationem ad
defluat, in eo haereat, et corruptus, partes, quae
iuxta

ſiſta ſunt, iterum rodat atque exulceret. Plurimum confert, ſi, cum is exciditur, Anelli ſpecillum per lacrymalia puncta demittitur, ita, vt eius vltimum caput per vulnus exeat. Lacrymarum etiam reptaculum poteſt admoto lapide infernali erodi, videndum tamen ne aliae partes, praecipue ipſe oculus, eo offendantur et ne illorum itinerum oſcula ſaneſcendo praecedantur.

§. 977.

Deducta tandem cute, et illa etiam membrana, quae os contegitur, os vnguis, anteriori eaque parte, quae ei lacrymarum ſaccum innexum eſſe retuli (958), perforandum eſt, et via lacrymis facienda, per quam in ſinem deriuari poſſunt. Quouis ferremento, quod, ſi modum ſubulae, cuſpidem habet craſſitudinis modice non retuſam, ſed exacutam, os forari poteſt. Idoneum eſt terebellum, quo alia oſſa forari ſolent (592. 2), non ſpecillum, quod acuminatum ſulcum habet (959). Ferramentis, quae pleniora ſunt, nec non retuſis, aliis, quae ab quibusdam laudantur, ſi iis os vrgetur illud, quod tenue eſt atque rarum, totum diffringitur ita, vt membrana etiam, quae intus nares cingit, valde ceretur. Vitandum enim eſt, ne magna in his ſedibus praecipue in orbita, quae plurima pinguedine mollis eſt, inflammatio moueatur. Multo enim pure ortus humor intus in orbita ſubſidit, in pinguedine ſerpit et proxima adhuc ſana rodendo ſinuatur, vt nonnunquam etiam oculus rumpatur. Quare aliena ſunt illa ferramenta retuſa, et alia nouiter deſcripta, quibus totum os vnguis non tam foratur, quam latius confringitur *.

* Inter haec illud eſt, quod in Diſſ. de Fiſtula lacrymali oſſis delineandum curauim, fig. VI. Nec non forceps curua LAMORIERH. Vid. H. A. R. Sc. MDCCXXIX. p. 590.

§. 978.

Certum autem modum adhiberi oportet, vbi ferramentum adigitur, ne id anterius ad ossis maxillae pro-
cessum, qui ad latus nasi adsurgit, neque post os lacry-
nale ad partem planam ossis ethmoidei perueniat. Illud
etiam ita inclinandum est, vt id oblique deorsum et
posteriora versus introrsum, compellatur, cum metus
est, ne id nasi septum et ossa, quae in naribus sunt,
spongiosa, tum superiora, tum inferiora, laedat. Si
ferramentum recta deorsum fertur, illud in sinum ma-
xillarem delabi potest *. Os pertusum esse scitur, si
sanguis ex nare destillat.

* Vid. quae Vir doctissimus ALEXANDER MONRO proposuit
et figura addita illustrauit in *the Medical Essays* Vol. III.
Obs. XV. p. 293. Is etiam cutim non tam magna plaga in-
cidendam esse existimat, sed vel protinus eam cum subiecto
osse illo ferramento aperire iubet, vel facta minori longe
plaga. Superuacuum esse quoque putat os prius deducto
ab eo perioestio nudari. Cutim vero paulo latius aperiri, non
inutile esse reor, quod vulnus diutius feruari oportet, et quod
omnia melius patefunt. Lacerato etiam perioestio, metus
est, ne magna inflammatio excitetur.

§. 979.

Vbi os perforatum fuit, aculeos pungentes, si qui
eo resoluti sunt, protinus eximi oportet, et vulnus
instrumentis atque spongia purgari. Etiam, cum sic ad-
itus via perfecta est, videndum, vt illa maneat, quam
vero callusque increescens, nisi reprimantur, breui re-
tere solet. Etiam hic, medentes in diuersas curandi
vias processisse, deprehendo. Sunt, qui minorem fistu-
lam ex auro, plumboque, in illud foramen compellunt,
vt ea ossi insideat. Videndum vero, ne ea, quae in
hoc sede relinquenda est, prohibeat, quo minus vul-
nus ad cicatricem perducere possit, quare eam minime
operam, nec valde prominentem, esse oportet. Alii
longius turundam, cereum minorem, et, id quod fere
optimum, ligneum bacillum, ad modum coni, altera
Kk 3 parte

parte plenum, altera magis tenuem, in plagam demittunt, et tamdiu relinquunt, donec in osse foraminis ora circumcirca occalluit. Vlcus interea purgandum est, et sinus, si in plures partes diducuntur, aperiri atque etiam purgandi sunt. Si plumbea, vel aurea fistula in foramen coniicitur, vlcus repurgatum citius glutinari super eam potest. Magna vero adhibenda diligentia, vt per apertas illas naturales vias lacrymae in hanc fistulam delabantur et in nares deventur, quare frequentius demittendum specillum. Vbi autem bacillum ligneum, vel cereum, adhibet chirurgi, vulnus tamdiu apertum seruandum est, donec ora foraminis penitus occalluit. Si in oculum inflammatio euocatur, adhibenda sunt fomenta (29. omniaque auxilia, quae aduersus inflammationem maxime possunt. Ossi nudato aera et medicamenta pingua ac humida inimica esse, infra docebitur. Vel maxime necessarius est minorum specillorum vsus (964, 965), ne oculum, excoecatis illis, per quae lacrymae ferebantur, itineribus, post finitam curationem lacrymarum perpetuus cursus male habeat, id quod, si indidit, nulla ope adiuuari potest.

§. 980.

Non alia curatio est aegilopis, vbi fistula in angulo aperta est. Si cutis inciditur, plaga per ipsum fistulosos procedere debet, et callus etiam concidendus est.

§. 981.

Quod si vero os carie vexatum subest, quoniam tium, vel ab ipso osse incepit (961), vel, quoniam a malo vlcere membrana, qua id contegitur, exesa fuerit casus asperior est. Id scire possumus, si foedi odor fanies per vlcus exit, et si specillo, vel illo minori, per lacrymale punctum, vel maiori, per fistulam apertam demisso, os occurrit inaequale atque asperum, et si specillum

cillum fede, qua innititur, non dilabitur, atque in eo nigror deprehenditur.

§. 982.

Intelligi potest, quantum aut sperari, aut timeri, debeat ex humoris, qui exit, modo, ex ipsius etiam fistulae ortu, causa, eiusque magnitudine atque vetustate. Nam, si vitium in angusto est, id curationem accipere potest, Si autem vitium latius altiusque processit, et caries non solum os lacrymale occupavit, sed etiam ad alia, quae iuxta sunt, praecipue ad ossis ethmoidei partem, quae in orbita est, vel ad huius cellulas, transit, curatio perdifficilis, et plerumque ei nullus locus esse solet. Imo, si in corpore corrupto hoc vitium carcinomatis naturam habet, ut venae intentae sint, cutis dura, et quae levi tactu irritatur, id curare periculosum est, cum ea res mortem maturare possit.

§. 983.

Os vero omni vitio liberandum est (899). Oportet igitur carnes subsecare osque nudare, ut omne, quod vitiatum est, oculis pateat. Caries autem tollitur, si os, vel scalpro, vel medicamentis, raditur, vel, si id terrebello foratur, aut aduritur. His enim omnibus corruptum vel tollitur, vel ficitur, ita, ut aridum factum ab eo, quod integrum est, squamae et testae in modum, resoluatur. Si vitium non alte descendit, id non raro tollitur, si os ea ratione, quam supra (525) praecepi, foratur. Nam id etiam impositis idoneis medicamentis squamam remittit. Tutius enim res ita tractatur, quam si visio adhibetur. Vbi enim os admoto candente ferramento aduritur, periculum est, ne etiam lacrymarum itinera offendantur, et, si aduruntur, praecludantur.

§. 984.

Visionem vero exigit vlcus, quod nigrities occupat, et caries, quae totum os perrupit, et si multa foedi odoris sanies ex ulcere effertur. Hanc vero efficacem me-

dendi rationem si experiri statutum est, ad manus esse debent ferramenta, et quidem: 1) lamina argentea ius excavata, qua oculus commodè contegitur *, eum ignis offendat. 2) specillum breue aequale, 3) ferramentum, quod figuram infundibuli habet **, et quod commodè excipi potest 4) aliud ferramentum, quod candefactum per id demittitur ***. Horum ferramentorum duo, et in vasculo etiam frigida, ad manus esse debent.

*. Vid. Diss. meam Fig. 10. et alium eius modum in GARENGEOT *des Instrum.* T. II. p. 11. fig.

** in Diss. fig. 11. in GARENGEOT fig. 3.

*** in Diss. fig. 12. in GARENGEOT c. I. p. 28. fig. 1.

§. 985.

Ratio vero curationis eiusmodi est: Oculus sanus deligatur, vtrique vero oculo prius imponitur pannus ex medicamento expressus, quod reprimendi facultatem habet, et aduersus inflammationem potissimum valet (292). Oculus, qui curandus est, a sinistra contegitur illa excavata lamina (984. 1), quae super alium madentem pannum admouetur. In os fistulae vel etiam in plagam scalpello factam, super os cariosum demittitur specillum (984. 2), quod quasi viam monstrat, et super hoc illud ferramentum, quod infundibulum appellauimus (984. 3). Hoc super os tenetur, et per illud traicitur aliud candens ferramentum (984. 4), quod ante prius aliquantum prominet. Eodem itaque os paulo diutius aduritur iterum atque iterum, quare horum ferramentorum duo in promptu esse debent, quo, vno refrigerato, alterum interea ignitum possit imprimi. Vbi vero ferramentum tollitur, necesse est, vt recipiatur etiam infundibulum, quod, ne incalescat, subinde in aquam frigidam demitti debet. Finis vstionis est, vbi ferramentum os perripit et viam in nares aperuit, id quod scire licet, si compressis naribus et clauso ore spiritus per plagam effertur. Circum-

umpectius vero os adurendum est, ne nasi septum, liaque ossa, quae iuxta sunt, laedantur (978). Os sic dustum aridum fit, et ex eo id, quod vitiatum est, ecedit. Si vero non omne, quod corruptum est, esoluitur, os vel radendum, vel medicamentis, quae duersus cariem valent, respergendum, vel iterum durendum est, donec integrum sit, quod relinquitur.

§. 986.

Vbi omne vitiosum ab osse integro abscessit, caro nrescit et sinum implet. Et hic modo, quem supra praecepi (979), via seruanda est lacrymis, quo illae, um per minores palpebris inhaerentes vias, tum per oramen in osse relictum, possint in narem perlabi. ubinde intus in nares immittenda sunt medicamenta, uae ossibus curandis sunt. De his omnibus, cum enero ad morbos, quibus ossa patent, dicam.

§. 987.

Peculiarem etiam animaduersionem desiderant illa orum saepe commemoratorum itinerum suprema oscula, quae in palpebris esse supra (959) retuli. Illa abere videntur cartilaginofum minorem annulum, uo efficitur, vt semper aperta sint et humorem recipiant. Quia vero etiam haec oscula conteguntur eneriori tunica, illa nonnunquam, si nullus humor d haec itinera destillat, ficcatur, et oscula illa excoecantur. Hoc crebrius accidit vitriariis, qui vitrum d ignem spiritu in plurimos habitus formant, et aliis, qui varii generis metalla vehementiori igne vrunt et excoquunt. Igne enim omnis humor per haec itinera destillare solitus diffunditur, ita, vt oculis periculum it, ne, praeclusis illis osculis, per omnem vitam maleant. Proditum tamen legimus, et huic vitio curationem esse repertam *. Incidendum extrinsecus esse acrymarum receptaculum, seu saccum, in hunc de-

mittendum esse prius tenue specillum retusum et globulo munitum, post vero aliud extrema parte excavatum. Id adigendum esse superiora et haec oscula versus, donec illud per haec exeat. Viam, si illa iterum perfecta fuerit, demisso per illam crebrius priori specillo, apertam seruari debere. Videndum erit, num id, quod ratio docuit, experientia confirmet.

* Vid. MONRO c. l.

* Perspicue ac plene a PLATNERO descriptae sunt rationes viis lacrymarum impeditis medendi. Post eius vero opus multa in hoc genere nouata sunt, atque illa praecipua spes, quam is et HEISTERVS in vsu specilli et siphunculi ab ANELIO inuenti posuerunt, ab aliis tenuata est admodum. Primo, quod sciam, PETITVS, chirurgus, minime magnifice de illis sentit in *Monum. Acad. R. Scient. Paris. A. 1734. 1740. 1743.* quae dissertationes in opere eius posthumo descriptae legi quoque possunt, lectu sane dignissimae. Deinde DE LA FOREST, ad repurgandum canalem nasalem faccumque inuenit specilla solida, h. e. non caua, catheteris speciem referentia, per quae, in orificium nasale ductus nasalalis data, viam aperiret similis figurae catheteribus, seu specillis cauis, per quae, siphone quidem iis adaptato, liquor varius in canalem nasalem et faccum lacrymalem mitteretur. De his vid. *Monum. Acad. R. Chirurg. Paris. T. II. p. 175. et Tab. 13.* Aliud inuentum MEIAN debemus. Est genus specilli seu acus longae, tenuis et flexilis, ex argento factae. Ea foramen habet, quod filum ducit gossypinum vel sericum. Per punctum lacrymale superius et ductum in faccum lacrymale et ductum nasalem demittitur, ut per huius orificium nasale eius caput cum filo in narem descendat. Cum autem ex nare filum istud extrahi debeat, ut species quaedam setaei connecti queat, alius chirurgus Franco-gallus, cui Cabanis nomen est, paraferramentum iubet, quo in nare arripi et ex ea protrahi acus cum filo queat; vid. idem *Vol. Monum. Acad. Chirurg. Paris. p. 193. Tab. 14.* Verum eo facile caremus; obtusum enim hamulo acus sat commode arripitur et protrahitur. Chirurgorum eorum sedulitatem, negotiosam illam quidem et ingeniosam alii vix satis mirari possunt. Quos inter RICHTERVM video in *Commentat. Societat. Goetting.* Vol. I. Is inuenta illa referre ad crepundia haud dubitat. Quod paulo durius pronuntiatum aliis videtur. Quicquid autem alii de eo iudicauerint, perite scripsit RICHTERVS. Modis tribus fieri potest, ut lacrymae a punctis haustae lacrymalibus, et per ductus lacrymales in faccum promotae, in narem

res non descendant. Aut enim tunicae sacci lacrymalis admodum debilitatae non deorsum vrgerent, non promouent lacrymas, neque adeo superant contractionem sphincteris, qui ductus nasalis orificium ornat. Haec conditio vel a morbis sacci lacrymalis praegressis vel ab externis laedentibus creatur, vid. PLATNERI §. 970. Eam autem subesse intelligimus, quoties saccus lacrymalis ita digitis compressus, ut orificia ductuum lacrymalium simul compressa humorem per puncta lacrymalia refluere non permittant, laticem suum in narium alterutram demittit. Vix alia curatio locum habere videtur, quam ut saccus is crebro ita digitis comprimatur, ut sphincteris illius vis constringens superetur, et humor in nares vrgeatur. Compressio sacci a PLATNERO aliisque descripta mihi parum probatur. Nam orificia ductuum nasalium compressione ea simul comprinuntur. Haud dubie, quoque callositas sacci eo saepius enata fuit. Aqua frigida crebro, aut subinde quoque liquores spirituosos et aromaticos prudenter adhibiti, robur quoddam sacco illi addere posse videntur. Liquores mitiores illi, a PLATNERO commemorati, hauriuntur a punctis lacrymalibus, si, homine supino, eorum guttula vna aut item altera in canthum oculi internum destillat; iniectione igitur, qua et punctis et ductibus lacrymalibus vis infertur, opus non est.

Alter modus, quo fit, ut lacrymis via ex sacco ad nares praeccludatur, in eo est, si tunica ductus nasalis interior maxime intumescit, quod fere fit cum inflammatione quadam facta ab humore morbofo huc delato, vel acri catarrho, vel in hominibus scabie, scorbuto, arthritide, labe siphyllitica, scrophulosa, tinea capitis, acido-mucosa puerorum cacochymia, affectis, itemque ac praecipue post maligniores variolas, morbillosque. Hoc autem morbi genus cognoscitur ex dolore quodam sacci lacrymalis maiori minoriue, eiusdemque rubore, ex natura humoris qui per puncta lacrymalia vel sponte ex iis vel pressu sacci exprimitur, puris enim speciem et colore et consistentia is refert, atque sic ab limpido et mucoso humore in aliis generibus differt. Morbus ipse modo mitior, modo vehementior est; in quibusdam quoque, variis temporibus, modo oritur modo desinit. Ex sacco lacrymali digitis ita compresso, ut orificia ductuum lacrymalium in saccum hiantia simul claudantur, humor aliquis in nares exprimitur. Causa autem et ratio, quamobrem saccus lacrymalis non compressus laticem suum per orificium canalis nasalis in nares non dimittit, multiplex videtur. Nam et tunica interior canalis nasalis tumore suo non modo angustiore reddere sed etiam prorsus praeccludere viam eam potest, maxime si humor vel tenacior simul obturat, vel acrior orificium canalis nasalis irritando ad sui contractionem exstimulat atque compellit. Fistulae autem

autem conditionem inflammatoriam a decubitu humori origine tenus deriuandam esse intelligimus, si morbus praedescriptus non ex alio genere fistulae lacrymalis natus est. Si de curatione eius deliberandum est, liquido patet neque explorationem per specilla neque efficaciorē chirurgiam prodesse sed vehementer nocere, nisi morbus vetustate, neglectu, prauis curationibus pristinam naturam suam deposuerit, in aliud genus, vlcerosum scilicet et callosum versus. Cura igitur non chirurgus sed medico demandanda est. Quae multiplex profecto paucis proponi nequit. Diuersae causae diuersa remedia. Modo sanguinis missione modo alui solutione iterum iterumque ac saepius faciundum at leni illa, modo haemato-catharticis, modo obuoluentibus, modo reuellentibus, modo restitutione et refractione praegressi morbi opus esse potest.

Tertium genus fistulae fit ab obstructo canali nasali. Cognoscitur eo, quod saccus tumidus est, atque ita compressus digitis, ut per ductus lacrymales nihil refluere per puncta lacrymalia possit, nihil omnino in nares dimittit. Causa obstruens varia esse potest. Interdum iterum iterumque factae, quam diximus, compressioni sacci cedit, sed ut via ad nares aperiatur, quo casu efficacior chirurgia necessaria haud est, verum saepius repetitae compressiones sacculum vna cum errhinis, apophlegmatizantibus, euacuantibus, in canthum oculi instillatis, ad curationem sufficere queunt nisi fortasse singularior cacochymia medicamenta quaedam intus sumenda indicauerit. Interdum vero causa obstruens immobilis est, quod ex eo ipso intelligimus, quando iterata sacci compressione nil quicquam in nares descendit. Neque prius vitium illud, multoque minus hoc alterum ab iniectionibus siphone Aneliano actis iuuamen aliquod percipere potest. A chirurgia efficaciori auxilium petendum, et, inciso sacculo, canalem nasalem adhibito specillo idoneo operiendum esse iam viderat PETITVS l. c. Vol. I. Accuratius deinde rem persecutus est RICHTERVS. Saccus autem solita ratione et ita incidendus debet, ne paries eius posterior laedatur. Quo facto, sanguinem fluere patimur; eoque quiescente saccus linteis discriptis impletur, et vulnus emplastro contegitur. Post tres quatuorue dies vulnus retegitur, et specillo flexili obrusoque, per vulnus sacci in canalem nasalem dato, hic ipse aperitur, quod nec nisi aliqua vi adhibita, nec sine acerbo dolore fieri consuevit. Patens factum esse ex sanguinis guttula vna alteraue e nare destillante intelligitur. Tum vero protinus tenuior chorda ex intestinis animalium in locumeducti specilli immittitur, satis alte quidem in nares, ut fere eius sescuncia in naribus sit, atque in deligatione noua quaque propelli ex naso possit, dum homo spiri-

tum per nares vehementius proflare conatur; arrepta tum a chirurgo chorda e nare educitur, si caput quidem chordae alterum in vulnere haerens antea resectum forfice sit. Chorda prima post tertium demum diem educitur, et in eius locum alia aequae tenuis datur, quotidieque per sex dies idem prorsus fit, sic ut sexta quaque die paulo plenior chorda adhibeatur, postquam aliqua iniectione generis emollientis immissa est. Quae quidem ante tertiam septimanam vix in nares descendit. Quodsi septimanis quatuor elapsis iniectus liquor liberrime in nares fluit, chorda nulla sed tenuis cylindrus e plumbo factus adhibetur, et iniectione desiccans quotidie fit. Plumbeus cylindrus et iniectiones omittuntur, quando iam is quasi sponte sua in nares decidit, iniectusque humor quam liberrime et pleno riuo in nares venit, atque spiritus, clausis naribus et ore, in vulnere percipitur, neque cylindrus ille amplius pus secum educit. Quae hebdomade octaua fieri solent. Remotis tum aliis, vulnus emplastro contactum breui ad cicatricem perducitur. Cum autem interdum morbus, qui videbatur sublatus, reuertatur, fuere non pauci, qui istud eo fieri putarent, quod canalis nasalis iterum obstructus esset. Qua propter os vnguis pertundi iusserunt. Sed hoc et PETITVS et RICHTERVS vehementer improbat. Morbus autem recrudescit, non quod canalis nasalis denuo obstructus sit, sed quoniam aut curatio causam mali non sustulit, aut, adhibita chirurgia efficaci, ductus lacrymales pessundatae sunt. Conuenit igitur anteaquam vulnus sacci cicatricem contrahat, specillo Aneliano ductuum istorum conditionem explorare. Si clausi fuerint, videndum, num illud MONROI consilium §. 987 sequi possis. *De fistula lachrymali* vide quoque *Dissertat. SCHEFFELII* 1756 Gryphiswaldiae editam.

FISTULA ANI.

§. 988.

Nirca anum oriuntur abscessus, vlcera et venae etiam callumque habentes fistulae, quae vitia omnia a non paucis autoribus communi nomine fistulae comprehenduntur. Ea vero, et genere, et ratione curationis, inter se differunt (54. 892. 942).

§. 989.

Intestinum rectum, in ima directum, finitur ano, si musculos habet sphincterem * et leuatorem, quorum

rum actione reliquiae cibi adstringentibus se, tum laxantibus, intestinis huc usque depulsae continentur et data opportunitate excernuntur. Sphincteris posterior ossi coccygis, vel proxime, vel medio ligamento, quod ex hoc osse eductum in adipe finit iungitur **. Pars anterior in viro, musculis transversis penis, et horum tendini medio, nec non acceleratoribus, in foemina vaginae ostio et cunni contractioribus iungitur ***. Levator ex pelvis inferiori parte ab ossibus pectinis et ischii ortus lateque fusi intestino recto iungitur ****. Nec omittendum est hoc intestinum intra suas tunicas, praecipue externam et carnosam, multum pinguedinis habere, cui etiam extrinsecus plurimum adipis innatum est, quod mollior intestino sedes et opportunitas praestatur, id commodè possit dispani. Hoc iis frequentius accidit, quibus aluus propter exiguam portionem aliaeque causas per plures dies compressa est, ut intestinum stercore plenum interdum maius receptaculum, quasi saccum, repraesentare videatur. Ad id pertinent arteriae, quae duplicis generis sunt. Aliae enim educuntur ex meseraica inferiori †, aliae ex hypogastricis ††. Venae etiam vel ad hypogastricas feruntur †††, et dicuntur externae, vel ad meseraicam inferiorem, et dicuntur internae ††††. Per priorem sanguis ad venam caavam, per ultimas ad venam portae, permanat. Etiam in recto lacunae quaedam reperiuntur, ex quibus pinguior humor effertur, quod veluti axungia, intestinum interius perungitur ††††.

* Hic a WINSLOVIO in *Expof. T. IV. P. I. §. 179. 180. 181.* ad 188 in tres, ab ALBINO in *Hist. Musculorum L. II. Cap. 91. et 97.* in duos diuiditur. Confer figuras in SANTORINI *Obs. Anat. Tab. II. fig. 1. Tab. III. fig. 5. et COWPERI Myotomiam T. XIX.*

** Vid. SANTORIN. c. I. T. III. fig. 5. O. Conf. WINSLOVIVM c. I. 182.

*** Vid.

*** Vid. SANTORIN. cit. fig. R. S.

**** Vide Figuram EVSTACHII Tab. 37. COWPERI c. I.

† Vid. WINSLOVIVM in Expos. T. III. §. 213.

†† Illae etiam duplicis generis sunt. Aliae educuntur ex glutacea vid. WINSLOV. c. I. §. 243. aliae ex pudenda §. 247.

††† c. I. de Venis §. 183.

†††† c. I. §. 262. f99.

††††† Vid. MORGAGNI Aduers. II. Animadu. VI. p. 10. in Tab. fig. III.

§. 990.

Quoniam igitur sanguis in homine difficilius per intestini in ima directi venas adscendere potest, accidit; saepe ora venarum turgentia sint, et sanguinem etiam fundant. Cuius profluuium quandoque purgatio, cum eo graues interdum morbi tolluntur, quandoque vero morbus. Haec ipsa res vero, et quia venae a stercore, si illud multum ac durum in recto est, emuntur, occasionem dat inflammationi. Fiunt itur minores abscessus, furunculis (102) similes. Si is ex his non protinus euocatur, illud acre fit, adhaerentem rodit, et abscessus in vlcera, vlcera vero in fistulas, conuertit.

§. 991.

Suppuratio haec pluribus modis excitatur. Id accidit si medicamentis, tum extrinsecus admotis, tum interne sumptis, ora haemorrhoidum sanguinem fundentium subito suppressa sunt, si sanguis in corpore malus sit, percrassus, colore niger, qualis esse solet hypochondriaco ac hysterico morbo et scorbuto aegris, nec non omnibus, qui exigua portione vtuntur, et corpus durum exercent. His etiam suppurationibus obnoxii sunt, quibus humida venereo morbo corrupta sunt, nec non ebriosi, qui frequentius se vino, praesertim muliere, ingurgitant, quibus aluus sicca atque per longos dies adstricta est, nec non alii, quibus aluus medi-

medicamentis ex aloe, elleboro, colocynthide compositis crebrius ducitur. Id etiam incidit post vehementiores nixus, si sub his a foemina partus editur, vtriusque sexus hominibus aluus deiicitur, nec non illa loca extrinsecus valentius premuntur, quare haec vitia recipiunt prae caeteris illi, qui equo, vel curvesti multum succutiuntur. Nonnunquam haec valetudo ex gonorrhoea maligna relinquitur, si malae materiae profluuium adstringentibus atque ex calido balsamo compositis medicamentis supprimitur, et per in perinaeum atque intestinum inclinatur.

* Fistulam, quae ab officulo deglutito et ad intestinum etum depulso orta fuit, describit LE DRAN T. II. Obs. Ego aliquando in fistula ani inueni minorem et rotundum calculum valde durum. Is intestino recto propior sinu formauerat duriori etiam callo obductum. Probabile visum est illum ortum fuisse a muco, quo naturaliter intestina inguntur, qui forte in aliquo sinu, vel lacuna, duratus fuit.

† De fistulis ani, quas corpora aliena effecerunt, vid. *Oposthumum* PETITI, h. e. *Traité des maladies Chirurgicales* etc. par J. L. Petit. A Paris 1774. T. II. p. 210. seqq.

§. 992.

Cum vero in his sedibus humor profundius coalescat ac in pus conuertitur, id certae notae ostendunt. Dolor esse solet acutus ac vehemens, et maior, quam pro magnitudine tumoris, ei similis, qualem supra furunculo, qui ad suppurationem spectat, oriri dicimus (103). Extrinsecus cutis parum rubet, cum exiguum etiam calore. Accedit vero febris cum siti ac vigiliis. Altius in pinguedine solet esse tuberculum, quod vix digito cognoscitur. Nam quandoque, si altius promouetur, nihil horum in cute deprehendi potest. Hoc tuberculum plerumque ab intestino propius est, quod etiam digito contingitur, si is oleo inunctus in aluum demittitur; id quod vero non sine magno hominis dolore fieri potest. Tandem, ubi pus maturum

illu

lud frequentius intestinum perrumpit et multo cum
 petore per aluum effertur, aeger autem protinus illo
 cerbissimo dolore leuatur. Si vero profundius con-
 ita suppuratio est, et illa non aperitur, inflammatio
 ; manente humore, remittit, qui acrior factus, adi-
 em rodit. Fit igitur vlcus, quod in plures sinus
 uiditur et callo etiam inducitur.

§. 993.

Ne ergo pus intestinum perrumpat, festinandum,
 tumor, etiam crudus, aperiendus est. In hoc enim
 usu, et, si pus altius mouetur, non expectanda est
 maturitas, nec diu superhabenda sunt cataplasmata, vt
 scessus per se aperiatur, sed is, quamuis nondum
 maturuisse videatur, subcrudus altiori plaga incidendus
 ; et humor euocandus (conf. 96).

§. 994.

Igitur ita aeger collocari debet in lectulo, vt cru-
 pus adductis, imo ventri ex latere incumbat, vtque,
 correctis natibus, morbi sedes in conspectu chirurgi
 Id enim in omnibus his curationibus, quae ani-
 iis adhibentur, commodius est, quam, si aeger pro-
 us, transuerso lecto, coxis elatioribus, demisso capi-
 iacet. Nam, si priori ratione collocatur, muscoli
 nnes quiescunt (945), atque etiam, si forte ex prae-
 sa arteria sanguis periculosius fluit, necesse non est,
 grum aliter collocari, sed protinus adhiberi possunt
 xilia, quae aduersus sanguinis profusionem maxime
 possunt (407. ad 417). Nates vero impositis a mini-
 o manibus diducuntur, et scalpellum anceps altius
 tumorem demittitur, ex quo, quia is crudus inci-
 tur, plerumque multus sanguis cum paucis pure fer-
 r (96). Nec scalpellum protinus recipitur, sed vul-
 us latius, etiam tribus, vel pluribus, lineis inciditur,
 imus sinus pateat. Ne orae celerius iterum coe-
 L l ant,

ant, conuenit inum finum linamentis compressis puluillis, vel ellychniis (20), super se etiam fultis, que aridis, impleri, quibus etiam sanguis supprimitur. Vulnus purgandum, deinde implendum, esse, apparatus quilibet ex prioribus potest.

† Ne quis non satis peritus decipiat PLATNERI verum scire licet a puluillis et ellychniis super se fultis, aridis namque, ut ab omni alio corpore alieno, valde irritari locum incisum, indeque nouam fieri inflammationem et amplioris suppurationem. Itaque, nisi sanguis fluat, non fultis super se puluillis, verum laxè immixtis ellychniis (*Bourdonnet*) vendum esse et satis cauere, ne plaga exterior cicatricem contrahat. Quae ratio deligandi et hoc commodum affert ut pus liberius exeat, neque finum ampliorem faciat.

§. 995.

Si vero sanguis cum periculo fluit, adhibenda sunt auxilia, quae supra praecepi (406. ad 418). Quod vero fascia his sedibus ita accommodari non potest, satis contineat, saepe necessitas poscit, ut linamenta pannosque super vulnus fulciendos minister manu sua intermissione vulneri apprimat.

§. 996.

Fascia his vitiis, quae in ano sunt, haec idonea est. Arcte circum inum ventrem dari debet mantile, huic autem affluenda est longior ampliorque habena, quae a media sua et posteriore parte, cui anus subiiciendus integra, veluti pannus quadratus, hunc contegit. Inferius autem habena duo capita habet, quae sub perinaeo per femina antrorsum ad mantile feruntur, et huic adsuuntur. Id, quod habenae reliquum est, per tergum adscendit et fissum aegri caput comprehendit. extremum vero etiam anterius mantili adsuitur. Sunt qui habenam diuidunt, ut alia sit, quae per inguina alia, quae super axillas, fertur.

§. 997.

Nonnunquam ex eiusmodi abscessibus, si ii non protinus, vt primum apparent, etiam crudi inciduntur, et humor, qui intus confluxit, euocatur, vlcera oriuntur, ex his etiam, si occalluerunt, fistulae (99). Harum tria genera sunt. 1) Siquidem aliae ab vno ore in cute orfae nondum violato intestino intra adipem desinunt. 2) Aliae non ad cutim, sed ad intestinum tendunt, et in hoc patent. 3) Aliae extrinsecus a cute orfae etiam ad intestinum penetrant. Non vero solum in generibus discrimen est, sed etiam in multis aliis, prout hoc de fistulis, quae etiam in aliis sedibus oriuntur, supra executus sum (944).

§. 998.

Expedita cognitio est primi generis. Quo vero chirurgus certus sit, intestinum haud violatum esse, in finem specillum, in aluum digitum, oleo prius nunctum, circumcisis etiam diligenter vnguibus, demittere debet, vt, quo fistula tendat, et quam alte perueniat, scire possit. Nonnunquam necesse est, vt si- nus ampliatur, id quod, vel noua sectione fit, et si is pluribus lineis inciditur, vel coniecto in eum illo urundarum genere, quae ex spongia cerata, rapa siccata, aliisque humorem ex vlcere bibentibus, parantur (20).

§. 999.

Vlcus vero, vel fistulam, intus intestinum per- uisse, alia quaedam indicia ostendunt. Si aeger ea parte vehementi dolore cum aliis inflammationis signis fuit vexatus, dolor autem se subito remisit, et eo, quo s conquieuit, tempore maior puris modus cum aluo ex intestino elatus fuit (992): Si etiam quandoque pus, vel sanies, ex intestino exit: Si aeger ea parte colorem, vel pruritum, sentit. Oportet etiam demisso aluum, et digito, et specillo, violatum intestinum

explorari. Extrinsecus admoto cuti digito tumor
tius tactu sentitur, qui, si fistula callum habet, durus
est, ac digito renititur.

§. 1000.

Tertium genus, et fistulam a cute orsam, ad
testinum penetrasse, significat liquor medio siphone
os fistulae immissus, si is per aluum defluit: Si aliquis
stercoris per fistulas effertur; si ultimo specillo
fistulam coniecto digitus in aluum demissus continet
tur. Non difficile est per fistulae sinum in intestinum
coniicere minorem tenuemque cereum, atque huius
caput digito in aluum demisso apprehendere atque ex-
trahere. Hic cereus etiam, si ita in intestino reli-
quitur, saepe cum aluo descendit, qui etiam ostendit
quam alte perueniat fistula.

§. 1001.

Magna diligentia in explorandis fistulis opus est.
Aegrum ea ratione collocari, ac supra retuli (994)
digitum autem alterius manus in anum, specillum in
fistulam, demitti, omniaque seruari, oportet, quae
proxime (645) scripta sunt. Ad id necesse est, ut
ministro nates, impositis vtrisque manibus, diducantur.
Confert etiam, aegrum mox aliter atque aliter
collocari, et nates etiam aliquando a ministro eo tem-
pore, quo specillum demittitur, diduci, aliquando
laxari. Tactu etiam explorari oportet, si qua parte
arteriae ictus percipiuntur. Prius autem, quam spe-
cillum, vel digitus, demittitur, aluus, si ea naturaliter
non reddita fuit, lotionem ducenda est.

† Cauendum est ab errore vulgari, quo non solum modo
homines ex vulgo sed non pauci quoque chirurgorum vl-
cus circa sedem ortum protinus pro fistula sensu strictiori
intellecta, h. e. pro ulcere calloso habent.

§. 1002.

§. 1002.

Aduersus omnes ani fistulas maius certiusque in manu, quam in medicamentis, praesidium est. Minus operae esse solet, si illae breues, simplices atque recentes, et in corpore etiam integro, sunt. Vbi autem his contraria sunt, et vbi fistulae altius et aliquo, quo calpellus tuto peruenire non potest, ad vesicam, vrethram, abdomen, et huius membranam, siue peritoneum, et in foeminis ad vaginam, nec non ossa, sacrum et coccygis, eaque vitiata, perueniunt, si in plures partes diducuntur et inueterauerunt, etiam si corpus senile, aegrum et corruptum est, si intestinum aliori loco violatum est, quam, vt eo digitus ferri possit, illae cum difficultate curantur, atque etiam insanabiles expeririuntur. In fistulis altioribus, si inciduntur, inens periculum esse solet ex sanguinis profusione. Fistulae, quae, post malis curationibus suppressam menorrhoeam, in perinaeo oriuntur, plerumque ad rostatam, et corpora cauernosa penis, et in ipsam vrethram, tendunt, et difficilius sanescunt. Raro etiam fistulae in iis, qui venereo morbo aegri sunt, prius incuntur, quam illud vitium, quod in humidis est, sit leuatum. Nam, si tales solis medicamentis extrinsecus impositis curantur, illae raro non ultra proedunt, ita, vt iis etiam putris caro superincrescat *. Quod vero ad illa fistularum tria genera attinet (997), primum et vltimum genus minori negotio curatur, quam secundum, in quo non cutis, sed solum intestinum violatum est.

* Vid. LE DRAN T. II. Obs. §4. p. 216.

† Quanquam praecipuum auxilium a manu chirurgi et medicamentis extrinsecus applicatis petendum est, multum tamen, praecipue in lue gallica, etiam promittit medicinae pars ea, quae victu et medicamentis intus assumendis morbos curat. Sed de his hoc loco seorsim dicendum non est, verum illa, quae in capite de vlcerebus iam proposita sunt, sufficere ad erudiendum possunt.

§. 1003.

Cum vero iam ad curationem veniendum est, pars de illo genere dicam, quod extrinsecus ab ore in cutem orsum etiam ad intestinum penetrat (997. 3). Sanguis ex brachio mittendus et imperanda abstinencia alius autem prius ducenda lotionibus. Etiam si fistulae os nimis angustum est, id, vel sectione in duas neas facta, vel demissa prius in illud turunda, quae rapa siccata, vel spongia cerata, paratur, ampliari debet. Necesse quoque est, ut aegro, qui scalpello curandus est, vesica exoneretur, et is ea ratione, quae supra (994) praecepi, collocetur.

§. 1004.

Si fistula callosa non altius penetrauit, sed in extrema parte intestinum perrupit, expeditissima curatio est, specillum, quod acus maioris figuram habet, plumbo, argenteo, flexile in fistulam conicere, et per anum educere. Duo vero specilli inflexi capitula valentius adducere, et cutim utrinque super duabus lineis incidere, atque omnem fistulam cum callo et cute, quae super fistulam est, excidere.

† Haec ratio medendi, qua pars cutis una cum callo exciditur, iure meritoque improbat PERCIVAL POTTIO *Libro* anglica lingua conscripto *de fistula ani*, versoque testimonio a IOH. IAC. PLENCK, et inscripto: PERCIVAL POTT von der Mastdarm-Fiste etc. Wien 1768. Simplicem incisionem fistulae, et ad callum tollendum medicamenta minima acia, incisionesque regionum callosarum sufficere docet. Minorem etiam scalpellum falcatum, minime latum, cuiusque mucro obtusus est, delineatum exhibuit.

§. 1005.

Si vero fistula altius penetrat, atque etiam in intestinum definit, in eam coniici potest specillum, quod sulcum habet, quod vero non per interius fistulae os, quo ea in intestinum patet, traicitur, sed super illud

lud paulo altius per intestinum, qua parte id interum est. Perforato sic intestino, specillum per anum educitur, et super id scalpello recto fistula inciditur. Post autem callus, si is totus excidi non potest, scalpello, lineis in longum ductis, et forfice etiam incurva, transuerse, conciditur, et impositis medicamentis odentibus atque pus alentibus tollitur, vlcus vero, si purgatum est, implentibus curatur. Si flexus et alii inus reperiuntur, illi etiam specillo ferroque persequendi sunt. Praestat vero, id protinus fieri, nisi id aegri imbecillitas et sanguinis profusio impediat. Nam, ubi vlcus pus alere coepit, difficilius reperiuntur sinus et riuuli, qui ad latera tendunt, quippe quorum ora valde angusta sunt (945). Vlcus etiam, quamuis id linamentis impleatur, coarctari plerumque solet.

§. 1006.

Alia ferramentorum atque scalpellorum genera repperunt, quibus etiam has fistulas minori aegri dolore incidunt. Scalpelli genus est, cuius extremum mucronem obtusum habet, Gallis regium dictum *. Hoc in fistulam demittitur et inclinatur, ut mucro per anum exeat, id vero adducendo, fistula et intestinum, omneque, quod inter haec est, secatur. Etiam scalpellum habent, cuius obtuso apici ferruminando specillum argenteum flexile iunctum est, quod vltimum etiam per fistulam in intestinum coniicitur, et per anum educitur **. Hoc, quod syringotomum vocant, illis fistularum generibus opportunum est, quae altius et recta intus feruntur atque intestinum superiori parte perruperunt. Nec defunt alii, qui illo scalpelli genere, quod elatere mouetur (954), utuntur; ne autem eo intestinum altera, et fistulae opposita, parte vulneretur, prius in hoc coniiciunt ferramentum, canaliculi in modum excauatum ***. His omnibus

fistula minori dolore inciditur, callus vero haud editur, imo vlcus non satis ampliatur, quare illud indidentem fallere potest. Si vero aliquis nihilominus scalpellorum generibus uti velit, eum oportet pronus, incisa fistula, forfice concidere illam supremam intestini oram ea parte, qua illud mala materia perrumpat, quae, cum vel callosa, vel alienata, sit, nisi exaspetetur, glutinari nequit. Omnia ferramenta, quae fistulam vel anum, demittuntur, oleo inuncta e oportet.

* *Bistoury Royal.* Vide HEISTERVM T. V. fig. 3.

** Hoc a LEMAIRE, Argentoratensium Chirurgo, inuentum primus descripsit CL. HENR. BASS in Diss. de Fistula Ani feliciter curanda, Halae, MDCCXVIII. Frid. Hoffmanni praeside, proposita. Hoc parum immutatum vid. in GARENGEOT T. I. Cap. IX. Art. V. p. 337.

*** Quale est, quod delineauit HEISTERVS in Chirurg. Tab. XXXV. fig. II. qui etiam alia ferramentorum ac scalpellorum genera habet. SHARPIVS iconem dedit forficis, qua ani fistulam incidit. vid. eius Tab. II. p. 31. B.

§. 1007.

Alterum genus fistulae, quod recta intus tendit, quo vero intestinum violatum non est (997. 1) ea ratione, qua de abscessu dixi, duabus et pluribus lineis incidendum est, ut imus sinus pateat (994). Vbi ad finem fistulae ventum est, callus etiam vel totus excidi, vel concidi, et adurentibus exedi, debet. Si quando fistula intestinum nondum perrupit, eo autem tendit, illique propior est, celeritati multum adiicitur, si protinus demissum in fistulam acutum specillum per intestinum traicitur, atque super id, et fistula, et intestinum, inciditur.

§. 1008.

Tertium genus (997. 2), quod integra cute in intestinum patet, hanc molestiam habet, ut illud prius extrinsecus aperiendum sit. Vbi enim tactu sub cute tumor,

umor, vel callus, sentitur, demittendum scalpellum et aperiendus sinus est. Hoc minori negotio fit, si coniectus in anum digitus ad fistulam flectitur et eo cutis extrorsum vrgetur, ita, vt haec contra digitum incidatur. Si autem sinus in intestino arctior est, et digitum non recipit, specillum ex plumbo, vel argento, ita inflecti debet et per anum in fistulam demitti, vt contra huius caput cutis incidi queat. Perforata autem cute, caetera in curatione similia his esse debent, quae in illo fistulae genere, quod et extrinsecus et in intestinum patet, praecepi (1003. ad 1005).

† Si cutis haftenus integra visa et ei subiectus panniculus adiposus incidi debet, vt fistulae perfectae species existat, res aliquando non parum difficilis est, aliquando impossibilis. Ante omnia locus in cute reperiri debet, quae pertundenda sit. Quodsi autem fistula altius in intestino patet neque ea, quae PLATNERVS, neque illa, quae DE LA FAYE in Notis ad DIONEM proposuit, chirurgum erudire possunt. Hic enim a digito in intestinum misso vlceris sinum extrorsum vrgeri vult, nam eo tempore hominem in loco certo quodam dolorem quendam esse percepturum credit, atque in loco eo ipso secandum esse putat. Saepe quoque fieri nequit, vt fistulam intus exiguo foramine patentem digitus ita percipiat, vt specillum immitti queat. Neque vero, quod PETITVS iussit, turunda densior in anum data obturando et pus retinendo, detegere locum cutis vlceri respondentem poterit. Fistula vero, quae vix a sphinctere aut parum admodum distat, etiam extrinsecus notas quasdam habet, e quibus, quae loca secanda sint, scire possumus. Cutis enim aut rubet, aut flavescit, aut splendet, aut dura est, aut prurit, aut dolet ad tactum.

§. 1009.

Quo semper in his curationibus imus fistulae incisae sinus oculis pateat, ille cum linamentis impleri atque impositis pannis vinciri debet *. Haec tolli oportet, si aluum deiciendi necessitas est. Etiam post deiectionem vlcus spongia ex calida, vel vino, expressa, sedulo purgari atque iterum nouis linamentis, quibus etiam medicamenta illinuntur, impleri debet. Quo primis diebus, quibus quandoque metus est, ne san-

guis feratur, aeger alium cohibere possit, et illa amputationem duci, et aeger forbitionibus sustineri debet. Nec ignorari oportet, homini, qui ita curatus fuit, primis diebus frequentem desidendi cupiditate esse, parum vero, vel nihil, ut plurimum excerni.

* Puluilli atque linamenta ita demitti debent: In anum conicitur digitus chirurgi, ita, ut is fistulae incisae sinum conregat, inter digitum et intestinum fistulae oppositum alii demittuntur linamenta, quae, vel in puluillos, vel ellychnia varii generis, (*plumacaux, bourdornets, et maiges vel meches* 19. 20.) figurantur. Si haec in intestino supra fistulae sinum detrusa fuerunt, digitus tollitur, et eo linamenta in fistula deprimuntur. vid. LE DRAN Obs. 83. p. 214.

§. 1010.

Aliae quaedam animadversiones necessariae sunt. Si totus callus excisus non fuit, oportet adhiberi multam diligentiam, ne eius quid maneat, quare et, demisso in vlcus digito, et specillo, omnia crebrius atque diligentius explorari debent. Sedulo etiam videndum, num vlcus, si illud purum videtur, siccum sit, an humidum. Nam, plures ac reconditos sinus subesse, manifestum est ex modo puris, si huius plus fertur, quam quod simplici spatio conuenit. Ani spincter sine periculo, etiam repetitis vicibus, inciditur. Si vero eius multum exciditur, adurentibus roditur, vel magna comitata suppuratione corrumpitur, is offenditur, ut quandoque angustetur, quandoque etiam resoluatur, ita ut alium non recte continere possit.

§. 1011.

Interdum, si fistula altius descendit, euenire solet; ut, praecisa arteria, venaue, sanguis cum impetu fluat; id quod non sine periculo est. Si igitur profusionem timemus, vulnus implendum est linamentis, quae, si sicca parum valent, etiam alcohol, vel alio liquore stiptico, madefacienda sunt, et manu super comprimenda. Quandoque, si sanguis conquiescere videtur, alius metus:

vetus subest, ne is, si ei exitus non datur, feratur in intestinum, id quod sciri potest, si aegrum ventris in-
 atio atque tormina afficiunt.

† Grauia symptomata a sanguine in intestinum rectum effluen-
 te et in eo rerento commemorauit PETITVS l. c. T. II.

§. 1012.

Veteres linum in fistulam coniectum ligauerunt, quo paulatim, et cutis, et fistula, incisa fuit. Quae
 atio curationis longa atque taedii plena fuit.

* Vid. HIPPOCRATEM de Fistulis T. XII. p. 680. CELSVI L. VII. c. 5.

§. 1013.

Si fistula intus aliquo procedit, quo scalpellum tu-
 o peruenire non poterit, vel, si aetas, aliaque, illam
 curari prohibent, collyrio vtendum est, quo illa pura
 fit. Ad id idonea sunt decoctum herbarum, absinthii,
 rutae, agrimoniae, salviae et similium, nec non
 aqua vulneraria, cui parum essentiae succini adiici
 potest (913).

† De ani fistulis legendi omnino sunt libri supra iam adducti
 PETITI scil. et POTTHI. Sed huius versionem teutonicam
 laudare non possumus, quantiuis alioquin interpretem ac-
 stimemus.

HAEMORRHOIDES.

§. 1014.

Raro euenire solet, vt ex haemorrhoidibus sangui-
 nis profusio oriatur, quae manus auxilium desi-
 derare possit. Si enim sanguis exitum per haec venarum
 ora non habet, multa obseruatione compertum
 est, inclinata in viscera materia homines subitis et gra-
 vissimis morbis correptos esse. Si autem ora venarum,
 vel saepius, vel periculosius, sanguinem fundunt, et
 homo ex eius profluuio imbecillior sit, imperanda est
 abstinencia, quies et potio dilutissima, dandaque sunt
 alia,

alia, quae aduersus sanguinis profusionem alibi p
cepi (417. 418). Necesse etiam est, vt aluus, si
coacta et adstrictior est, lotione in eam immissa, qu
egelida, nitrum adiectum habet, soluatur. Parum
to supprimitur profluuium, admotis extrinsecus adstr
gentibus, vel si ora venarum ferro candente adurunt
aut filo constringuntur. Si ora venarum, tanquam
pitulis quibusdam turgentia, sanguinem fundunt, a
praecipiant, vt ea vossella, hamuloue, apprehendantur
et forfice, vel scalpello, excidantur, quo profluuium m
lius possit supprimi. Ad omnia haec auxilia non li
cile, et nisi necessitas cogat, decurrendum est. Ex h
tuberculis saepe mala vlcera et condylomata nascuntur

§. 1015.

Multo autem frequentius euenire solet, vt illa v
narum ora magna cum inflammatione et intolerabili
dolore intumescant. Haemorrhoides caecas vocant
solent. Accidere id solet, si sanguini exitus non da
tur, vel etiam, si aeger sumsit ex purgantibus acriora
et quae multam aloen habent, nec non, si in humidis
ex scorbuto et venerea lue vitium, et si sanguis per
crassus est, qualis esse solet eis, qui corpus parum ex
ercent. Haec valetudo etiam ex aliis nascitur, quae
supra, vbi de abscessibus dixi, qui circa anum fiunt
executus sum (991). Horum vitiorum curatio a me
dicis requirenda est. Aluus lotione minime acri, ex
emollientibus, lacte atque oleo, cienda, sanguis, si is
abundat, mittendus, et potio dilutissima et victus a fa
me propior imperandus est. Circumcidendum vinum
est, et omne acre, et quod sanguinem mouet, vel
aluum adstringit, aut inflat, et adhibenda sunt alia, quae
aduersus inflammationem valent (62. 64. 66).

§. 1016.

Extrinsecus autem emollientia (91) ex lacte coqui
debent, et ex decocto multiplices panni recte exprimi

24), atque calidi loco dolenti admoueri. In aluum
 nmitti potest oleum verbasci, liliorum alborum, cui,
 i intestinum ab acri humore erofum atque exulcera-
 um est, parum vnguenti de linaria adiici potest. Hoc
 nim, si solum in intestinum demittitur, nimis valens
 d reprimendum esse,prehenditur. Profuit etiam
 lurinum, si tubercula manu chirurgi, quae oleo in-
 ncta esse debet, intus promouentur, id quod neces-
 sarium est, si intestinum aliquantum resolutum fuit.
 estiferum est, si alcohol cum camphora, aqua calcis,
 t fumus ex ligno querneo, vel combustis muribus, sic
 iictis, marinis, his tuberculis admouetur.

§. 1017.

His etiam opitulantur hirudines, si tuberculis ad-
 mouentur. Meliores ad id habentur, quae ex aquis
 uris colliguntur, et quae ex flauo viridescentem colo-
 rem habent. Confert etiam, eas, quae sanguine alun-
 tar, famelicas esse. Locus, cui admoueri debent, se-
 culo prius spongia extergi, et ei parum lactis, vel re-
 entis sanguinis, illiniri debet. Chirurgus hirudinem,
 uam admouere vult, manu prehendit linteolo obuol-
 uta, vel eam collocat in arundinem in longum scissam.
 lae, postquam se sanguine impleuerunt, decidunt,
 unquam enim vi diduci debent. Recedunt etiam, si
 inere, vel sale, adsparguntur.

† Hirudines seu sanguisugas prae caeteris huic aptas curatio-
 ni descripsit et pingi curauit SCHMUCKERVS in *Vermischten
 chirurgischen Schriften* Vol. I. Quae euoluere debent ii, qui
 in hoc genere non satis periti sunt, quorum etiam aliquot
 inter magistros artis vidi. Magnam ab eorum suctu non
 modo in his curationibus, sed in aliis non paucis opem af-
 ferri vir ille peritissimus docuit, et ego quoque ipse iam
 ante eum ostendi in *Dissertatione de deriuatione et reuulsio-
 ne a sanguinis missione impetrandis*. Lipsiae 1764.

§. 1018.

Illa haemorrhoidum tumentium capitula interdum
 calpello inciduntur, et sanguis ex iis euocatur. Hoc
 vero

vero non semper et in omni corpore, sed tantum eo, quod integrum est, et cuius humida nullum tium habent, atque non aliter experiendum est, quod si omnia auxilia, quae mox proposita, parum proficiunt, et ubi dolor, cum grauioris morbi metu, vehementer vrget.

† Sunt inter Francogallos chirurgi, PETITVS praecipue, hirudinibus parum tribuunt, iisque sectionem scalpelle ciendam praeferunt. Quos sequi tum decet, cum tubercula venarum maiora sunt, et sanguine spisso crassoque natura. Is enim a bestiis illis vix ac ne vix quidem extractu potest. Caeterum de affectionibus haemorrhoidalibus legendus omnino est PETITVS in *Opere posthumo* Vol. I.

CONDYLOMATA.

§. 1019.

Saepe enim ex haemorrhoidum capitulis, si illa, incisa fuerunt, vel superdatis malis medicamentis retentaque materia, induruerunt, tubercula multi generis nascuntur, quibus a figura, duritie, aliisque variorum nomina imposita sunt. Condylomata sunt tubercula maiora, caeteris duriora, quae si extremum incisum cristatum habent, cristae nonnullis dicuntur. *Θύμ* vel *ἀγκροθύμιον*, verrucae genus esse, supra (386) intuli, quod etiam in his sedibus quandoque nascitur. Ficus tumor rotundus est ad cutim tenuis, supra laticior, rarus ac mollis, cum quo fere conuenit mariscus. Multum ad haec tumorum genera confert, si corpus corrupti habitus et vitium ex venerea lue per id diffusum est, vel, si in his sedibus mala vlcera fiunt, et haec nulla curatio adhibetur.

† Ex lue gallica nondum confirmata vidi aliquando condylo-
mata nata tam numerosa, ut nates, perinaeum et posterio-
ris scroti pars vbique obsiderentur. Idonea curatio medica-
menti intus sumtis, administrata iis tollendis sufficit.

§. 1020

§. 1020.

Haec tubercula non solum extrinsecus circum
um nascuntur, sed iis interdum intestinum altius
iam impletur, adeo, ut illa intus se opponant totum
e intestinum intercludant et prohibeant, quo minus
rcus descendere possit, quae res etiam miseram mor-
n adferre potest. Nam si altius in intestino atque
nitius infederunt, insanabilia sunt. Curationibus
am saepe ea, quae sine dolore sunt, concitantur, et,
cisa etiam, nonnunquam post inductam cicatricem
uertunt. Hoc frequentius incidit, si corpus aegrum
senile, atque mali habitus, et si vitium, per humida
fufum, non fuit idoneis medicamentis victuque
cussum.

§. 1021.

Excidi ergo possunt haec tubercula, quae extrinse-
s circa anum et in inferioribus intestini partibus
nt. Alius ante omnia ducitur. Tum vossella, vel
gitis etiam, tuberculum apprehenditur ac valentius
ducitur, illudque ita exciditur, ut aliquid ex cute,
oque etiam ano, dematur. Nam prae aliis condy-
nata radices altius exigunt, quae, si relinquuntur,
renasci solent. Hac enim ratione radices minori
gotio, minori etiam aegri periculo, tolluntur, quam,
id, quod plures praecipiant, adurentibus efficitur,
illae emoriantur. Si aliquid ex ano huiusque sphin-
ere demendum fuit, sub curatione in anum danda
t maior densiorque turunda, ne, glutinatis inter se
ulneris oris, anus nimium coangustetur. Si multum
in ceteris demtum fuit, manet quandoque imbecillitas,
aeger aluum vix continere possit (1010).

ANI PROCIDENTIA.

§. 1022.

Taedii etiam plenum vitium est, si anus, id quod terdum fit, procidit. Hoc enim euenire solet hominem cita aluus diu exercuit et per eam mucosae acria biliosa descenderunt, si acrioribus purgantibus illa crebrius ducitur, si in intestino ascarides, vel ulcera, sunt, ex quibus, atque ex vesicae calculo, oritur tenesmus, in quo frequens desidendi cupiditas atque dolor, ubi aliquid excernitur. Nam his omnibus et si aeger crebrius haemorrhoidibus vexatus fuit, intestinum tandem infirmatur, quod sub leui nixu descendit et procidit. Accedere quandoque solet inflammatio, quae oritur, si sphincter se valentius contrahit, id, quod procidit, premit.

† De procidentia ani, qua pars intestini coli elapsa fuit v. *Monument. Acad. Roy. Chir. T. V.*

§. 1023.

Si causae (1022) patent, illas ante omnia tolli oportet. Si sanies acrior per aluum defluit, in hanc debent oleum et lotiones ex decocto auenae, cremor lactis, ex quo coqui possunt emollientia. Ascarides necantur, si oleum in aluum immittitur, idque, quantum diu potest, in ea relinquitur.

† Causa irritans ex intestinis sumato rheo, anima rhei et eiiciatur.

§. 1024.

Si vero id, quod procidit, inflammatum est, adhibenda sunt fomenta et alia, quae supra (1016) praeceptum est ubi intestinum paululum detumuit, illud digitis (1016) debet promoueri atque intus compelli, potest autem

em, pluribus multiplicibusque pannis impositis, in-
tenda fascia (996) est. Admoueri etiam possunt,
ae leniter reprimunt, vinum austerum, ex quo etiam
qui possunt radix tormentillae bistortaeque, malico-
m. Conuenit etiam, locum thure, mastiche, baccis
iperi, suffire.

§. 1025.

Si vero quaedam infirmitas manet, alius nunquam
ementioribus duci, ita tamen lotionibus solui, de-
ne illa coacta vi et maiori nixu exprimenda sit.
deiectionem etiam adhiberi possunt alia reprimen-
(1024). Necesse est, vt aeger adductis, deuinctis etiam
se, cruribus sedeat iaceatque. Nonnunquam ma-
nullam curationem recipit, id quod etiam fieri so-
si vitium ex sectione, quam lateralem vocant, re-
uitur, qua calculus ad Fratris Iacobi methodum
actus fuit (989), cum ea ani leuator incidatur.

ANVS PRAECLVSVS.

§. 1026.

hic contrarium vitium est, si anus praecclusus est,
id quod plerumque protinus in vtero materno
nit. Si intestino opposita membrana est, curatio
is esse solet. Si vero intestinum altius atque pe-
as interclusum est, vitium plerumque morte fini-
Interdum sterco, reperta aliqua via, in puellis
vulvam, in pueris per vesicam, fertur:

Hoc vitium malae conformationis varium est. Aut enima
anus clausus est sine vlla nota loci, vbi anus in aliis est; aut
clausus est cum euidenti nota eius loci vbi anus est; aut
anus extrinsecus bene formatus, sed aut plane non, aut pa-
rum peruius est. Et horum quidam sunt, quibus via ex in-
testino recto in vesicam vrinariam, vel in vaginam vteri pa-
tet; in aliis anus clausus speciem herniae efficit. vid. *Mo-*
num.

num. Acad. Roy. Chir. T. I. p. 377. VAN SWIETENIVS Comment. in Aphor. BOERHAAVII T. IV. p. 649. In MORGAGNI Libro de Sedibus et causis morborum. legitur sectio foeminae gentis Iudaeorum, quae cum vitio intestini recti in vaginam patentis ad decrepitam senectutem peruenit.

§. 1027.

Si membrana se opposuit, oportet eam scalpe-
 ancipiti duabus lineis transuersis incidere. Postquam
 meconium descendit, plaga, si id necessarium videtur,
 vel noua sectione, vel demisso in eum digito, prius ol-
 inuncto, ampliari debet. Commodum etiam est, ut
 quod meconii superest, lotione immissa educatur.
 anum vero dari debet turunda paulo plenior atque d-
 rior, ne vulneris orae sanescendo inter se iungantur,
 anus nimis coangustetur. Turunda medicamentum
 quod cicatricem inducere potest (396), illinenda est
 quam tandiu intus dari conuenit, donec plaga ad ci-
 catricem perueniat.

OSSIVM MORBI.

§. 1028.

Duriores corporis partes, ossa, ex tenuioribus lamellis, minoribus, et quae angustiori orbe finitur, bracteolis, vel squamulis, nec non ex fibris, atque his omnibus certa ratione inter se concretis et coagmentatis, constant. Illae, tum lamellae, tum squamulae, non solum ex fibris componuntur, sed etiam mediis aliis fibris transversis, vel, ut quibusdam videtur, reflexis, inter se iunguntur copulanturque. Lamellae in ossibus solidis et eorum etiam partibus, quae maiorem duritiem habent, maiores et rectae sunt, ac quasi laevigatae, et quae sibi iunctae arctius continentur, id quod y. g. in femoris tereti mediaque arte conspicitur. In ossibus autem mollibus ac rarioribus frequentes sunt maiores lamellae, illaeque etiam flexuosae ac inaequales videntur, crebriores autem squamulae atque fibrae reperiuntur. His efficiuntur, ut os tumidum sit molle, rarum ac caernosum, quale femur est, ubi illud extremis suis partibus intumescit. Harum caernularum varia figura et magnitudo est. Quo illae autem maiores sunt, eo rariora ac molliora ossa etiam esse solent. Nam in ossibus solidis durisque etiam caernulas, quamvis minores, esse, medulla probat, quam illa exsudent. Tandem vero in ossibus fistulatis horumque interiori parte deficiunt, et lamellae, et squamulae, et plures in longum ductae atque etiam transversae et obliquae fibrae sunt, quae quasi reticulatum opus constituunt, sustinendae pinguiori medullae accommodatum. Inter lamellas, bracteolas atque fibras, arteriae venaeque

discurrunt, quae ossibus, vt caeteris partibus, alime-
tum subministrant.

* Vid. CLOPTON HAVERS *Osteologia* noua, GAGLIARDI
Anatome Ossium, WINSLOW *Expos. Anat.* T. I. §. 84. sq.

† De ossibus scriptores praecipui sunt B. S. ALBINVS
magno opere osteologico splendidissimo sane; ALEXANDER
MONRO, et qui huius anglice scriptum gallice vertit SV-
IN in opere magno cum iconibus satis bonis. De osteogeni-
legatur B. S. ALBINVS *Icones ossium foetus etc.* ROBERTVS
NESBIT *Osteogenie* anglico sermone scripta, et germani-
quoque versa ab IOH. ERNST. GREDING Reliquos vid.
HALLERI notis ad H. BOERHAAVI *Methodum studii Medici*
Amstelod. 1751.

§. 1029.

Ossa omnia, si dentes excipias, extrinsecus mem-
brana includuntur, quam periostrium vocant. Illi
arctius ossibus inhaerescit et non sine negotio ab iis
diducitur. Incipere dicitur a dura matre, cum qua in
orbitis aliisque capitis sedibus committitur. Ea
neruosa esse, dolor manifestat, qui, vbi iniuriam ac-
cepit, oritur. Sunt etiam arteriae venaeque admo-
dum multae, quae a periostrio in ossa pertinent. Inter
os et membranam contextus esse videtur cellulosus
valde tener. Membrana haec non aequalem crassitu-
dinem habet, sed in aliis sedibus tenuior, in aliis ple-
nior est. Fibrae enim ex musculorum tendinibus at-
que ossium ligamentis, quae super ossa finiuntur, illi
iunguntur, ex quibus periostrium crassescit. Ex peri-
ostrio ad ossa pertinent iisque adhaerent arteriae, per
quas succus, quo illa aluntur, permanat, quibus et-
iam accommodatae venae sunt. Super hanc membra-
nam etiam, quae laevis ac lubrica est, muscoli celeri-
ori mobilitate feruntur. Ea epiphyfes contineri, ex
eo discitur, quod haec decidunt, vbi periostrium ex-
sum fuit.

§. 1030.

Alia membrana est, qua ossa interiorius cinguntur. Haec nascitur ex arteriis, venis nervisque, quae per foramina feruntur, ab exteriori ad ossium intimas partes peruia. Hac membrana non solum maiora medullosaque caua includuntur, sed etiam illae cauernulae ossium cauorum ac mollium. A vero propius est, etiam hanc membranam, siue internum periostrium, ex duabus tunicis constare, per alteram ad ossa permanere succum, quo illa aluntur, per alteram, et maxime illius interiores partes, in ossis cauum cauernasque medullam cadere, atque ad varios vsus secerni. Ossa, si laeduntur, nullo, periostrium externum acerrimo, periostrium internum, vel medullam *, aliquo, sensu doloris affici, experimentis cognitum est.

* Vide C. A. R. Sc. MDCC. p. 252.

† Vid. quoque MICHAEL. TROIA De *Nouorum ossium etc. Regeneratione Experimenta Lutetiae Paris. 1775.* Liber is et teutonice versus prodiit Argentorati 1780.

§. 1031.

Medulla ex arteriis ad interius periostrium pertinentibus a reliquo sanguine secernitur. In ea vero etiam discrimen est. Nam quaedam pinguior atque oleosa, vt vera adeps, membranaceis folliculis continetur, qua maiora caua ossium teretium implentur. Haec illo fibrarum ossearum reticulato opere (1027) quasi suspensa sustinetur. Alia medulla est tenerior, et lymphae succoque similis, quo corpus alitur, in qua etiam, si illa arte coquinaria in ius vocatur, plurimum alimenti est. Ea in illis ossium rarorum molliumque cauernis secernitur. Hac tamen multo tenerior esse videtur illa medulla, quam ossa etiam durissima, si soli exponuntur, exsudent, et quam minimis et sensum effugientibus loculamentis contineri iam re-

tuli. Omnis medulla in corpore integro, et quae quiescit, pinguis est et oleosa, ubi vero corpus infirmum et mali habitus est, vel senile, post longam etiam inediam atque multam exercitationum defatigationem illa tenuis fit, faniosa, acris. In iis, quibus veneris morbus per humida diffusus est, ossa emollata atque multo leviora fiunt. Nemini obscurum est, medulla, quae ossibus insidet, effici, ut his quaedam flexilis mollitia sit, et prohiberi, quo minus haec facile findantur franganturque.

§. 1032.

Necessarium est, medentes haec scire, cum omnes hae ossium partes ex variis causis laborare et ex his multi ac pestiferi morbi oriri soleant. Nam, si periostrium externum inflammatur, inflammatio vero ad suppurationem spectat, haec membrana ab osse diducitur et corrumpitur. Ossis igitur exterior pars, quoniam a periostrio nullum alimentum accipit, vitiatum atque emoritur, et os cariosum fit. Hoc etiam accidit, si ictu aliquo, vel alia causa, membrana ab osse diducitur. Si humida, quae per ossa, etiam durissimas naturaliter feruntur, in his ex suis receptaculis effunduntur atque quiescunt, illis ossium fibrae diducuntur, et nascitur tumor, qui *ἐξόστωσις* vocatur. Si succus ille ex vasis suis emissus bonus est, qualis esse solet, quomodo in medio fracta conferuent, ille in callum duratur, qui tandem in os vertitur, et tumor benignus est *. Si vero aliud vitium subest, et humor ille acrior non solum ossium fibras inter se diducit, sed quoque exest atque corrumpit, exostosis dicitur maligna **. In his tumoribus nonnunquam putris caro reperitur, quae nasci consuevit ex minoribus per ossa discurrentibus arteriis, quae, exesa atque liquata per vitiatum humorem ossea materia, fungi in modum, incrementum accipiunt.

cunt ***. Ex eadem causa et vitiatis humoribus nonnunquam ossa, non ex parte, sed tota, intumescunt, quod morbi genus *ὕπερῶσις* a recentioribus vocatur ****. Imo interdum ossa ita mollescent, vt, quasi cerea, flecti queant, quae, vt videtur, acido imprimis, humore emollita, tum musculorum actione; tum corporis pondere, incurvescent *. In aliis oritur miragilitas, adeo, vt ex leui contactu, motuue, frangantur **. In his omnibus vitiis, cum caeteris per totum corpus diffusis humoribus, etiam medulla corrupta est. Quae, si aliqua parte, frequentius vero in ossium partibus cauernosis rarisque, praecipue prope articulos, et in epiphysibus, ex quacunque causa subsistit et corrumpitur, dirum illud valetudinis genus efficit, quod *παῖδαεθροακίην*, vel spinam ventosam, vocamus ***.

* Vid. PETIT *des maladies des Os* T. II. p. 380. sqq. Possideo caluariam, in qua talis exostosis est in osse coronali, et huius parte sinistra. Ictum vehementiorem sine dubio homo acceperat, nam non solum exterior caluariae pars quassata et contracta fuit, sed et intus lamina vitrea fissa est. Inter vtramque vero laminam et fractas squamas callus durissimusprehenditur, qui etiam hanc caluariae partem longe ponderosiores reddit. Ab illa parte coronalis incipit amplior fissura, quae per medium os temporis ad futuram lambdoideam vsque procedit. In parte posteriori bregmatis os modiolio excisum fuisseprehenditur. Homo tam grauer vulneratus vixit et conualuit. Nam et fissura et sinus modiolio factus callo completus fuit, qui maiorem partem, et relicta minori fissura atque exiguo foramine, iam in verum os duratus fuit.

** Vide figuras in CHESELDENS *Osteographie* Tab. XLII. fig. 2. in maxilla inferiori et Tab. LIII.

*** Hoc etiam ex ictu illato accidit. Vid. PETIT l. c. p. 389. conf. §. 526.

**** Vid. Cel. ASTRUC c. l. L. IV. Cap. III. T. I. p. 416. conf. figuras in RVYSCHII *Thef.* X. Tab. II. fig. 2. CHESELDEN Tab. XLIX. fig. 2. Tab. LV. fig. 1.

* Hoc in pueris rhachitide laborantibus frequens est. Vid. fig. in C. A. R. Sc. MDCCVI. p. 613. sq. CHESELDEN c. l. Tab. LII. fig. 3.

** Vid. HENR. MEIBOMII Exerc. de ossium constitutione naturali et praeternaturali, Helmst. MDCLXVIII. et WILHVLDO. WALDTSCHMIEDT Diatribe de Fracturis ossium si violenta causa externa, Kil. MDCCXXI. SAVIARD. O. 62. PETIT in Comm. A. R. Sc. MDCCXXII. p. 311. scilicet qui hunc morbum novum esse opinatus est. Sed confutatus fuit ab Autore libelli (FRANCISCO IOHANNE HENRICO NAVLDO): *Dissert. en forme des Lettres au sujet des Ouvrages de l'Auteur sur les Maladies des Os*, et ab ASTRUCO c. I. p. 418. qui Autores plures Observationes olim productas adduxerunt.

*** Vide PANDOLPHINVM de Ventositate Spinae et SEVERINVM de Paedarthrocace in Libro de Abscessuum natura, et vide figuram in CHESELDENS *Osteographie* Tab. XLV. fig.: confer de omnibus his HEYNE de Ossium morbis.

§. 1033.

Ossa etiam emoriuntur, si succus, quo aluntur non ad ea perlabitur. Hoc incidit, si arteriae paulo maiores, quae ad intima ossa tendunt, praecisa laesaeque fuerunt, et periostium etiam corruptum est. Ossa haec arida ex toto sunt, quae levia, calci simillima, facile friantur. Alibi retuli, magnum periculum esse, si arteriae, quae a summis ossibus ad intima tendunt, in illis foraminibus praeciduntur. Sanguis enim, quem illae ossi innexae arteriae fundunt, vix cohibetur, quod comprimere haud satis possunt (248. 543).

§. 1034.

Sed cum omnium haec ossium vitia parum ab iis differant, quae in aliis mollioribus corporis partibus esse solent, illa fere similem curationem requirunt. Supra docui (35), in ossium arteriis ex varia occasione humores subsistere, iter claudere, atque fieri obstructionem, haud vero inflammationem, cum ossium fibrae nullum vitale robur habeant, quo humor, qui coit, discuti, vel magis cogi atque in pus verti possit. Igitur, si humor in ipso osse, non in huius membranis, quiescit, isque corrumpitur, mala ulcera nascuntur, quae,

quae, dum ab interioribus incipiunt, tandem per totum os, periostrium, atque etiam, supernatis grauibz ulceribus ac fistulis, per cutim perrumpunt. Caries igitur cum ulcere et gangraena, exostosis maligna et paedarthrocace cum cancro occulto (262) et carcinomate, comparari potest.

§. 1035.

Neque id ignorandum est, in ossibus cariosis fere dem accidere, quod in gangraena fieri supra (198) retuli. Quemadmodum enim in hac illa putrida et foetida crusta, moto inter eam, et inter id, quod integrum est, pure, resolvitur, sic etiam, si ossium pars emortua est, et vitiata, illa etiam ab integro resolvitur, dum inter integram ac emortuam partem caruncula nascitur, quae, quod abscedit, expellit, ex qua caruncula novum periostrium nascitur. Exfoliationem vocant hanc emortui ossis resolutionem, quae interdum sponte fit, interdum adhibitis ad id facientibus variis auxiliis *. Longe facilius enim vitiatum ab eo, quod integrum est, resolvitur, si illud siccum aridumque factum fuit. Quandoque tamen etiam os, quod vitiatum est, pedetentim et ita soluitur, ut cariosum, quasi liquatum, cum humore ex ulcere feratur. Ex his manifestum est, cur haec squamae resolutio aegrius in ossibus raris ac cauernosis fiat.

* HIPPOCRATI squama, quae sic decedit, dicitur ἀποσπαστός ὀστέον. Vide Librum de Capitis vulneribus §. 23. T. II. pag. 705.

§. 1036.

His propositis ad singulas species veniendum est, ac primo quidem super ossibus varia tumorum genera nascuntur. Interdum sola membrana extrinsecus intumescit, si sub ea humor coit. Id accidere potest, tum ex graui ictu (522), tum si mala morbi cuiusdam materia in ossa inclinata est, id quod saepius, deceden-

tibus variolis morbilisque, fieri consuevit. Longius tamen frequentius ex venereo morbo periostrium tumescit, si ei corruptus humor subiicitur, qui, videtur, in illo tenuiori celluloso contextu (1022) confluit. Si ex graui ictu percussum fuit periostrium et sub eo sanguis confluit, tumor repente confurgit. Si mala materia ex alio morbo in os inclinata fuit, locus ab initio fere sine tumore est, ita, vt, quo tempore extrinsecus tumor conspicitur ac digito premitur, intus circumfluens humor cutim, quae non premitur attollat. Tertium genus post longos acerbosque noctu etiam auctos, dolores sensim pedetentimque confurgit. Si tumor inciditur, humor plerumque flauus, et gelatinae instar coactus, reperitur. Alii etiamnum vocabulis hos tumores ex venereo morbo ortos alii discernunt. Si enim illi digito prementur cedunt, gummata a recentioribus vocantur. Si duriores magis renituntur, tophi. Maxima durities est in exostosi.

§. 1037.

Quoniam os emoritur, si ab eo diductum, vel etiam corruptum, fuit periostrium (1028), in primo casu, et vbi, capite, vel alio membro, grauiter percusso, metus est, ne periostrium iniuriam accipiat, festinari oportet, et diligentiam adhiberi, quo humorum aditus auertatur. Sanguinem igitur protinus mitti, necessarium est, omniaque fieri, quae aduersus inflammationem valent. Extrinsecus superdari possunt fomenta, quae emolliunt (91), quo humor, qui membranam grauare potest, euocetur. Vtile etiam est, si cutis carnesque, vbi illud tuto fieri potest, ad periostrium vsque inciduntur, vel etiam conciduntur, hoc vero vt integrum maneat, necesse est (521. 724).

§. 1038.

§. 1038.

At, vbi sub perioftio iam fanguis confluit, expeditiffima curatio eft, tumorem ad os vſque incidi, fanguinem euocari (522). Offis nudati curatio talis eſſe debet, qualem ſupra (523. 524. 525) propoſui.

§. 1039.

Si vero ex decedente febre, vel ex venereo morbo, perioſtium cum dolore intumeſcit, inflammatio raro uerti poteſt. Nec proficit in his caſibus ſanguinis miſſio, niſi eius copia aegrum male habeat. Non raro enim, ſi eius multum detrahitur, vires ad curationem neceſſariae effunduntur. Licet tamen illud experiri, et cutim ſuper tumorem incidere. Danda ſunt homini medicamenta, quibus vitium, quod in humidis eſt, praecipue venereus morbus, ſi eo aeger laborat, diſcutitur. Vbi autem, ſe remittente dolore, ex tumore nihil minuitur, is vero mollior fit, perioſtium corruptum, atque os nudatum, et carioſum eſſe, intelligitur. Quare oportet os deoperire, et per alias curationes, de quibus protinus dicam, id, quod vitiatum eſt, tollere. Qui carcinomate, vel ſcorbuto, conſiſtantur, ſi eis morbus penitus et adeo inſedit, vt perioſtium corruptum fit atque ab oſſe diductum, illi eo morbo breui extinguntur. Pueris, qui rhachitide aegri ſunt, oſſa, et praecipue epiphyſes, prius intumeſcunt, et tandem in his mediis vitium, ſeu παιδαρ-
 ροκαλή naſcitur, quo oſſa, et tandem etiam perioſtium, vorantur.

§. 1040.

Perioſtium exulcerationem habere, et os ſub illis tumoribus (1036) iam vitiatum eſſe, ſcire licet, ſi dolor, qui acerbior fuerat, cum omnibus inflammationis notis ſe ſubito remittit, aeger vero grauitatem ſentit (85). Etiam altius ſub cute ac carnibus circumfluens humor

humor digito sentitur, et quandoque cutis commutato colore aliquantum attollitur. Si autem, quod ossibus vitiatum est, non protinus incisa cute, et; caries latius patet, subiectis etiam carnibus, tollitur vel, si vitium altius, et aliquo loco, quo ferrum tu peruenire nequit, conditum est, grauia vlcera atque fistulae supernascuntur, quae multiplices inter musculos in eorum tunica cellulosa subtereunt, longius ortu procedunt, et tandem aliqua parte cutim per rumpunt. Alibi retuli (899. 951), haec vlcera et ha fistulas, nisi percurato osse, haud sanescere.

§. 1041.

Exostosis benigna (1032) vix oritur, nisi ab ictu et si periostium laxatum laesumque fuit, et ipsum etiam os grauiter percussum, quare frequentius in capite et in tibia nascitur, quod haec ossa solis membranis contacta crebrius iniuriam excipiunt. Velut scirrhus benignus (262) est hoc tumoris genus, cum in eo retenta materia sine metuenda noxa haereat. Tumor tamen adferre potest molestiam, si is musculi subiectus est, quorum motum et actionem is impedire potest*. Si tumor in interiori calvariae parte increfcit, is cerebrum premit, et huius functiones laedit**.

* Vid. PETIT l. c. T. II. p. 434.

** Vid. Obs. SALTZMANNI in Actis Petropolitanis Anno MDCCXXVIII. p. 274. Exostosin benignam in osse bregmaticis describit PETIT l. c. 385.

§. 1042.

Ex compertis causis huius benigni tumoris notas habere possumus. Nascitur enim, si ictus aliquis, vel casus, periostium grauiter offendit, praecipue, si hoc incidit in corpore integro, et quod boni habitus est, et si, semel discussa inflammatione, aeger nullum dolo-

rem

em ex tumore sentit. Nec hic, si is adoleuit, curationem recipere potest.

§. 1043.

Exostosis maligna quandoque etiam ab iis, quae extrinsecus incidere possunt, nascitur, et si os, vel minus, vel rarium ac cauernosum grauiter percussum sit * (526). Sed frequentius ab humidis, quae aliquo morbo per totum corpus diffuso vitata sunt. Illa nepius ossa dura ac fistulata, aliquando etiam cauernosa, occupantur. Nam quoddam in morborum generibus discrimen esse solet. Si corpus male habet corbutus, isque eo processit, ut ossa, eorumque membranae affectae sint, plerumque sine tumore, diducto exesoque perioestio, vorantur et decidunt epiphyse, et ossa, quae naturaliter rara ac cauernosa sunt, cariota fiunt. Qui rhachitide aegri sunt, his etiam epiphyse, illaque rara atque cauernosa, ut et minora digitorum, ossa tota circum circa intumescunt. Exostosis raro a decedentibus variolis relinquitur, frequentius vero ex morbo venereo nascitur, et si is, imprudentia medentium, malisque curationibus, praecipue intempestiue datis medicamentis, ex mercurio compositis, agitatus fuit. Saepe tamen vnum valetudinis genus alteri iungitur, ut corpus, quod olim rhachitide laborauit, iam etiam scorbutus, vel venereus morbus, teneat, in quo casu illi tumores pessimi esse solent. Nec meliores sunt in iis, qui aliqua corporis parte graues exulcerationes atque carcinomata habent.

* Vide commemorabilem casum in Com. A. R. Sc. MDCCVI, P. 318. et PETITVM l. c. p. 388.

§. 1044.

Exostosin malignam esse, denunciat ipse morbus, ex quo ea nata fuit. Crebrius etiam illa occupat ossa, quae,

quae, non multis musculis, sed solis membranis, cōteguntur, atque aeris iniuriis exposita sunt, quare capite et tibia frequentius reperitur. Tumor ab initio parum, et minus etiam, quam tophus, dolet, calor vero omni, et noctu etiam lectuli, calore intensatur. Dolor talis est, qualis sentiri solet, si periostrium affectum fuit. Postquam autem mala materia ostium voravit, dolor, exesa membrana, fere conquiescit (1040).

§. 1045.

Vera exostosis, etiam ex venereo morbo enata raro medicamentis, nec etiam mercurio, obedit, quare si illa dolorem non adfert, superuacuum, imo etiam noxium est, eam variis curationibus agitari. Vbi autem graues dolores veniunt, os, si id commode fieri potest, oportet nudari, omnisque caro subsecari atque ossis tumor crebris foraminibus vrgeri. Quatenus vero, et modiolus, et terebra, agi debeat, vitiatum humor et scobis significant. Factis foraminibus, excisiorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adigendus est, ut id, quod inter vtrumque medium est, excidat. Id, quod reliquum est, scalpello radendum, et omne vitiatum tollendum est iis auxiliis, quae protinus, ubi ad cariem venero, exponam *. Si autem vitium ad alteram etiam ossis partem penetrauit, et totum corruptum, totum eximi non potest, vera sanitas haud reddi potest, sed, si tumor artus occupat, membrum, curato priori morbo, praecidendum est. Neque vlla spes est in aliis vitiis, scorbuto inueterato, et ubi ossa tota intumuerunt (1032), vel praeter naturam fragilia facta sunt (1032). Victu et medicamentis nihil aliud efficitur, quam, ut morbi impetus trahatur.

* Curationem talem proposuit PETITVS c. I. pag. 388 et 518.

§. 1046.

Ab his vero ossium tumoribus proximus transitus est ad cariem. Haec oritur, si membrana, qua os congregitur, ab osse diducitur, vel, si illa, pure orto, corrumpitur, id quod ex variis morbis causisque accidere ex supra (1032) dictis constat. Morbi, quo aeger laborat, eiusque et causae aestimatio, cum aliis signis, ostendit, perioostium vitiatum esse, inter quae primum est, si locus, qui ante vehementem et continuum dolorem habuerat, iam sine dolore est (1040). Idem significat cutis, si tumida est et plumbea atque mollior, et si sub ea humor pressu circumfluit, et si grauitas materiae atque febricula, intus vero aliquae punctiões, sentiuntur.

§. 1047.

Vbi os, supernatis grauibz vlceribus, aut fistulis, vitiatum est, id cognoscitur ex putri carne, quae increfcit, et per quam sine negotio ac sine dolore specillum demissum intrat. Nascitur haec ex arteriis venisque, quae naturaliter ex perioostio in os feruntur, et quae, quod os vitiatum est, ab eo diductae sunt. Propter hanc putrem carnem, et quia, hac increfcente, cutis adducitur, orae vlcis recurvantur. Ex eo sanies fertur acris, liuida, nigra, et quae intolerabilem ac cadauerosum odorem excitat (897). Humor enim, veluti de vlceribus dictum est (894), ex immutatis arteriolarum disruptarum oris corruptus exit, cui malus odor ex corrupto rancidoque medullosa succo accedit. Propter hanc putidam sanieĩm imposita emplastrum et demissa in vlcus argentea specilla nigrescunt (574), in qua etiam exesi ossis frustilla sentiuntur. Specillo occurrit os asperum et inaequale, et quasi spongiae simile. Haec vlcera ac fistulas, nisi ossi sanitas reddita fuerit, haud sanescere, alibi positum est (899). Quae vlcera, si etiam sana videntur, rupta, quae

quae illis inducta fuerat, cicatrice, iterum renouantur. Haec cicatrix, cui vitium subest, esse solet mollis, ranaeque et quae super cutim fere excreuit. Vbi autem ea super os integrum inducta fuit, illa densa est et dura atque concaua.

§. 1048.

Ossis vero corrupti expedita cognitio est, si illud nudatum oculis patet. Ossis integri ac vitam habentis color est ex albo coeruleus, qualem habet tunica exterior oculi, qui color in infantium ossibus paulo magis sanguinolentus est. Nam hunc colorem osses recipiunt a sanguine per arterias venasque permanante. Ossia vero quandoque candida fiunt, calci similia, si propter alimenti defectum emoriuntur. Hoc incidit, si illae arteriae, quae per foramina maiora in osses feruntur, et his atque medullae alimentum sanguinemque subministrant, praecisae fuerunt, aut, id quod frequentius deprehenditur, a magno tumore pressae. Caeteroquin vero id, quod in osse emortuum est, pingue fit et luridum, a medulla, quam exsudat. Medulla si magis corrumpitur, et, veluti omne oleosum, rancida fit, tandem nigritiem ossi adfert, cum foedo et intolerabili odore. Caries etiam in osse serpit, quemadmodum supra de sphacelo dictum fuit (55). Ossis omne, quod sua membrana non contegitur, tum digito, tum specillo, asperum et inaequale occurrit, quippe quod a malo corruptoque humore exesum atque exasperatum est.

§. 1049.

Caries autem ex iis omnibus oritur, quibus periossium, ipsaeque ossa et illae arteriae venaeque, quae his alimentum subministrant, laeduntur (1032. 1033). Igitur, si locus, cui os subiectum est, grauiter percussus, vel altiori et ad os usque penetrante vulnere, nec non abscessu, vlcere, fistula, laesus fuit et exulceratus,

atus, os cariosum fit. Id etiam accidit ex vitio per totum corpus diffuso, et praecipue per venereum morbum, quo omnia pinguiora atque oleosa in corpore corrumpuntur *. Etiam cariem adfert scorbutus, si is adoleuit, et alii vetusto ac venereo morbo superuenit, quandoque etiam carcinoma, si illud aliquam corporis partem, praecipue pectus, occupat, quo costae vitiantur. Id etiam accidere solet, si ex variolis malignis mala materia in periostium inclinata sit. Rhachiticorum ossa, si vitiantur, non tam carie, quam spina ventosa, infestantur (1039).

* Vid. BOERHAAVE Praef. in Aphrodisiacum.

§. 1050.

Facile tollitur caries, quae a causis orta fuit, quae extrinsecus accidere possunt, multo difficilius, si illa nata est ex vitiato corporis habitu. Tolerabilior est, quae ossium partes duriores occupat, et quae in summis est, quam, quae ossa rara cauernosaeque (1028) infestat, et altius descendit. Nam in his ossibus eorumque cauernulis celerius procedit vitium, nec os tam facile siccum fieri potest, id quod necessarium, si vitium ab integro, resolui debet (1035). Etiam alius metus esse solet, vbi illud rariora ossa articulis propiora tenet, ne vitiatum humor in articulos defluat. Cum etiam prope articulos plures muscoli et tendines super ossa finiantur, et articuli etiam ligamentis contineantur, ossa non sine difficultate deoperiuntur, quare in his quandoque caries, si profundius haeret, insanabilis est. Cartilagines etiam, si illae corruptae fuerunt, nunquam renascuntur, ex quibus siccatis caeteroquin etiam, prout a siccato osse, squama secedit (1035).

§. 1051.

Peculiarem animaduersionem infantium ossa requirunt. Haec appendices, vel epiphyfes, habent, et

N n

prae-

praeter eas tota copiosiori succo abundant, quare vel carie tentantur, vel vitio intus orto et paedarthrace infestantur, longe celerius, quam adultorum, cumpuntur. Si vero periostrum ipsamque os aliquam iniuriam extrinsecus illatam accipit, corpus vero tegrum est, interdum, si recta adhibetur curatio, nusquam, ut in aliis, secedit, sed os iterum suo periostrum protinus contegitur.

Rerum harum intelligentiores videant, num excusari possit CHESELDEN, qui tradidit, in puella novem annorum, os modiolis excisum fuerat, sinum decimo die fere completum fuisse, in *Osteographia* Cap. I. quem Casum alii proposuerat in *the Anatomy of the Human Body* Edit. quarta p. 48. Eum enim acriter reprehendit DOUGLAS in *Animadversiones on the Cheseldens Osteographia* p. 6.

§. 1052.

Si ossibus cariosis medendum, perpetuum est, : quod omne consilium dirigi oportet, ut vitium, quod in humidis est, idoneis medicamentis discutiat et ut omne, quod in osse corruptum est, tollatur, ab integro resoluatur. Nam, si id, quod relictum fuit, integrum est, os etiam nova membrana cingitur et, si sinus relictus fuit, is callo repletur.

§. 1053.

Non difficili ratione tollitur caries, quae ab iniuria extrinsecus illata orta fuit. In hoc casu, si corpus integrum est, fere superuacua sunt medicamenta, se cibo utendum exiguo, sicco, minime iurulento, carne non elixa, sed assa. Aetas vero considerari debet. Nam senibus et siccioribus cibo, qui plus alit, ut convenit.

† Asae foetidae virtutem esse singularem ossa cariosa a carie liberandi, reperit BLOCK Chirurgus in exercitiis Borussiae. Datur ea intus drachmae vnius dosi et ultra bis die donec eius odor ex loco carioso exhalans nares chirurgi afficiat. Vid. SCHMUCKER *Vermischte chirurgische Schrift-*

zen, Vol. I. pag. 135. Vtilis haec medicina etiam nostratibus euidenti profectu adhibita est.

§. 1054.

Si autem caries a venereo morbo profecta fuit, huic ante omnia medendum est. Ignorari tamen haud oportet, nec mercurium semper in his ossium vitiis, si penitius insident, et iis vetustas accessit, prodesse. Imo obseruatione manifestum est, plura ex mercurio parata, quae medendi causa reperta fuerunt, nonnunquam hos ossium morbos in peius vertere. Quandoquidem, etsi nemo negauerit, intus dato, vel extrinsecus illito, mercurio plerumque illos periostii tumores (1036) discuti, nonnunquam etiam per has curationes os vitiatum aridum fieri, et ab eo, quod integrum est, solui (1035); nihilominus, vbi caries altius descendit, et cum malo odore est, raro curatio feliciter cedit, nisi etiam manus auxilium accedat. Quare ea frequentius fallit, si ossa illa rara, veluti palati, ossis ethmoidei, lacrymalia, vitata sunt. In paedarthrocace vero haec medendi ratio longe minus prodest, imo nonnunquam pestifera esse solet. Nec tollit mercurius exostoses. Quandoque tamen et inter rariora obseruatum est, hos tumores, valde extenuato per ptyalismum corpore, mansisse, sed arida, et mala materia exhausta, sine dolore *. Vbi homo iam diu multumque medicamentis ex mercurio compositis vexatus fuit, praestare arbitror ptyalismum illitis vnguentis; quam intus datis variis compositionibus, concitari, et hac curatione colloquato omni oleo corpus extenuari.

* Vid. PETITVS c. I.

§. 1055.

Solent etiam parum proficere potiones, quae aduersus venereum morbum vulgo sorbentur potanturque. In casibus tamen desperatis, et vbi etiam cura-

tio cum mercurio non respondit, interdum profusum dicitur decoctura meracior ligni guaiaci. Necesse vero est, ut ea valentissimi generis sit, et ut se aeger ea semper per plures etiam menses, impleat, servata simul, quanta maxima, abstinentia. Cibo enim idoneus est solus panis bis coctus, et huius intrita ex eodem decocto. Poterit tamen aeger interdum pauciores passulas cum his esse. Necessarium vero est, ut quotidie sicco laconici calore sudor eliciatur quam plurimus. Huius enim curandi ratione omne medullosum et pingue quod in corpore est, et in quo sedem morbi illius macula esse retuli (1049), digeritur et euocatur, atque totum corpus ad supremam usque maciem exhauritur. Et trinfecus panni ex eodem decocto expressi calidi admitti veri possunt.

* V. DE HVTTEN de Ligno Sancto in Collect. LVISINI p. 270 sqq. et BOERHAAVE Praef. in eandem. His vero contradicit Cel. ASTRUC l. c. T. I. L. II. Cap. XI.

† Curationes usu medicinarum mercurialium administratae saepe propterea nihil proficiunt, quoniam temere et iuste largiori manu data sumtaque vires corpori demunt adeo ut humores boni et laudabiles ad illa ossium remota loca propelli digerique haud possint. Ideoque omissis tandem aliquando medicinis illis aut parcissime datis, adhibitisque decoctis medicinalibus lacti remixtis sanitas, quae antea per nimis efficacia remedia frustra quaesita erat, quasi sponte sua reuertitur. Et acrida decocta plerumque nocent.

§. 1056.

Quod si autem homo iam venereo morbo tenetur, ad hunc vero etiam scorbutus accedit, maius negotium est. Id autem scire licet, si, cum aliis malis signis, ulcera non crustas habent, muco similes, sed colorem lividum, vel nigrum, si ea exasperata sanguinem protinus fundunt, si, dentibus corruptis, in gingivis mala ulcera fiunt, parum pura, aut ex sanguine, qui ex illis fertur, rubicunda et nigra cum malo odore, et si per omne corpus maculae, etiam nigrae, dispersae sunt. In hoc casu prius oppugnandus est scorbutus, qui si euectus

uietus fuit, danda etiam sunt, quae aduersus veneream
uem possunt. Ex mercurio composita medicamenta
corbuto aegris pestifera sunt.

§. 1057.

Manus vero curatio, quam caries desiderat, etiam
iscrepat. Si enim ab iniuria, extrinsecus illata, peri-
stium diductum fuit, non alia curationis ratio est,
uam ea a BELLOSTIO * prodita, et supra proposita,
ua efficitur, vt protinus os noua membrana ex osse
dhuc integro cingatur (524. 525. 1038). Nam, ser-
ata hac medendi ratione, non necesse est, vt ex osse
iccato squama secedat.

* BELLOSTE *Chirurgien d'Hopital Cap. XII.*

† Supra iam docui, periostium ab osse diductum neque aere
aliaue causa alienatum cum osse coalescere posse. Quare
ab illa a BELLOSTIO prodita ratione medendi non semper
ordienda est curatio.

§. 1058.

Vbi autem haec non protinus post illatam noxam
acta sunt, et suprema ossis pars iam aere, pure, medi-
amentis, alienata fuit, necesse est, vt illa abscedat.
quama igitur resolui ac recipi debet, ad quam sol-
endam plurimum iuuant siccantia. Primum est aeris
omnis (388), nec non omnis aquosi ac pinguis, ipsius
etiam puris, aditum magna adhibita diligentia ita auer-
tere, vt os semper siccissimum sit. Respergi illud pot-
est mastiche, colophonio, succino, olibano, galbano,
isque aridis atque diu multumque tritis. His super
imponenda sunt linamenta arida. Nec alcohol ossi
inimicum est, si illud sine aqua est, ex quo exprimi pos-
sunt linamenta, quae imponuntur. Communia sunt,
quae alibi praecepi, quorum vero hic maxima necessi-
tas est, os sic nudatum rarissime (375), et magna ad-
hibita celeritate et festinatione, admoto etiam ignita-

bulo, deligandum esse, et omnia, quae imponuntur igne prius calefieri debere (389. 525.)

§. 1059.

Valentior medicina requiritur, si ossis quaedam pars iam carie exesa est, et hoc vitium paulo altius descendit. Oportet enim ante omnia os nudare, et, latius est eius vitium, quam vlcus, carnem subsecare donec undique illud, et ossis etiam integri ora, patefactum vero illud, quod vitiatum est, tolli. Id medicamentis idoneis, manu etiam atque ferramentis, fit. Prioribus leniora sunt essentia aristolochiae, myrrha, aloes, oleum ligni sancti, caryophyllorum. Commodius essentiae aristolochiae oleum caryophyllorum adiicitur, quae compositio etiam opportuna est, si palati ossa exesa sunt (916). Valentioris generis est euphorbium, quod, vel tritum inspergitur, vel alcohol exceptum illinitur.

§. 1060.

Inter medicamenta vero fortissima sunt, quae e liquoribus, vel dictis spiritibus acidis, componuntur spiritus vitrioli, vel sulphuris, phlegma vitrioli, et illius BELLOSTII compositio, qua argentum viuum aqua forti soluitur, aqua plantaginis diluitur, et mediante penicillo illinitur*. Circumspectius haec omnia et ita admoueri oportet, ne his carnes tendinesque ac nervi, et id, quod ex ossis membrana adhuc integrum est, violentur, cum haec res, et dolorem, et grauem inflammationem, mouere possit. Nec nimis diu in his perseuerandum est. Finis enim esse debet, ubi ad solidum integrumque os ventum est.

* Vid. LE DRAN Obs. T. II. p. 201.

§. 1061.

Si vero manu res agenda est, oportet id, quod vitiatum est, scalpro*, ad id idoneo, radere, donec integrum

um id sit, quod relinquitur. Si caries profundior
 t, audacter imprimere ferramentum oportet, desi-
 ere vero, vbi se cruor ostendit, et vbi os soliditatem
 bere incipit. Si os eatenus, quod corruptum est,
 erasum fuit, id respergi debet medicamentis siccan-
 bus, mox propositis *.

* Vid. GARENGEOT *des Instr. T. II. p. 96.* Diss. meam de Fi-
 stula lacrymali fig. XIII.

§. 1062.

Si os durum et fistulatum, veluti tibia, ita vitiatum
 st, vt caries ad alteram etiam partem et medullam
 transuerit, expeditissimum est, os modiolis, etiam, si
 ecesse est, pluribus factis foraminibus, excidere, et
 deinde circumspēctius radere, aliaque auxilia adhibere,
 uibus id, quod corruptum est, tollitur. Vbi caries
 er totum os penetrauit, vel, si vitium, quod vel latius
 st, vel sub carnibus reconditum, patefieri nequit,
 portet membrum praecidere.

§. 1063.

Ossa cariosa etiam ferro candente aduruntur, quo
 elerius efficitur, vt vitiatum aridum fiat et solvatur
 1035). Feliciter hoc cedit, si caries in osse duro ac
 fistulato altius descendit, illaque humida et cum malo
 odore est. Ossi sic adusto non alia imponenda sunt,
 quam linamenta sicca, vel ex alcohol, quod sine omni
 aqua est, expressa, quae siccando squamam magis ari-
 dam reddunt.

§. 1064.

In his omnibus curationibus quaedam obseruanda
 sunt. Si vel medicamentis, vel candentibus ferramen-
 tis, os aduritur, aut etiam scalpro raditur, maior vis
 adhibenda est medio vlceri, quam extremis eius oris,
 quo vbique vis extrinsecus adhibita vitium altitudine
 aequet. Plus igniri debent ferramenta, quibus ossa

rara ac cauernosa aduruntur, quam, quibus duri Longe perniciosissimum cariei genus in his ossibus ris ac cauernosis, veluti in sterno, esse, supra (1044) retuli, quare omnia haec auxilia, etiamsi recte curatio, raro veram sanitatem ossi reddunt. Vbi osse pars, vel squama, resolui coepit, illa labat, et ac etiam dolorem sentit. Expedit id, quod labat, suscipi manu, neque violenter, concutere, quo id facile abscedat. Os omni vitio liberatum esse, scitur, si sine carne integra ac dura repletur, et cicatrix ei inducitur densa atque concaua (1045).

† Apud Scriptores rerum ad chirurgiam spectantium leguntur historiae de magnis partibus ossium, imo de totis propemodum ossibus longis, quae corrupta erant, regeneratis, aliquando ita quidem regeneratis, ut os fistulatum corruptum nouus canalis osseus concluderet, et vetus illud corruptum ex nouo canali educi posset. Vid. *Medical Transactions* T. III. FABRICIVS HILDANVS de vulnere sclopeto grauissimo. *Act. Academ. N.C.* Vol. I. Obs. 53. MICHAEL TROIAE L. c. aliique. Et TROIA quidem per experimentum de animantibus brutis capta ostendit, penitus destructa medulla ossium longorum, nouum os gigni inter laminam externam internamque perioستي externi. Cum vero illae observationes de ossibus hominum corruptis et ita regenerati rariores sint, quaeri potest, num fortasse nimis efficax et acrior curatio perioستي externum grauius afficiens impediatur, quod minus crebro in hominibus similia fiant his, quae TROIA in bestiis animaduertere potuit.

§. 1065.

Sequitur, ut etiam de Paedarthrocace, vel spina ventrosa, dicam, quam ex corrupta medulla, praecipue in ossibus cauernosis, oriri (1032) retuli. Quandoque accidit, ut hoc vitium ex iniuria extrinsecus illata nascatur, si ictu vehementiori os rariū ita offenditur, vel etiam finditur, ut ex ruptis minoribus arteriis venisque humor in ossium cauernulas effundatur, vel, ut in perioستي interno et membranis, quibus cellulae intus cinguntur (1031), inflammatio oriatur, quae, si ad suppurationem spectat, hac mala ipsius ossis exulcerata.

atione finitur. Igitur hoc etiam adultis incidere
test in illo fracturae genere, quo ossa, etiam duriora,
non tam franguntur, quam ad medullam usque findun-
tur. Nam hac fissura laeduntur membranae, quibus
etque medulla, tum illa pinguior, tum altera tene-
rior, continetur (1031). Crebrius autem spina ven-
osa ex corruptis humidis oritur. Raro hoc accidit
venereo morbo laborantibus, quibus illi supra de-
scripti tumores (1036. 1043) et caries (1046) fre-
quentiores esse solent. Sed praecipue hac aetate hoc
morsum infestare solet ossa rariora puerorum, qui rha-
ticide consumuntur.

* Vide casum, quem supra §. 526. adduxi. In istro hoc ra-
rum non est (717.). In tibia etiam, quo pertinet histo-
ria ex PETITO adducta (1042). De illo fracturae ge-
nere, quo etiam maiora ossa finduntur, plura habet FELIX
WVRTZ in der Wund-Ärney Cap. XXVIII. p. 256. Etiam
medulla vitari potest osium, quae transversa multum inter
se cesserunt et recte commissa haud fuerunt. Possideo ti-
biam viri adulti et robusti. Haec olim cum fibula transversa
fracta fuerat. Cum vero ossa fracta non recte in suas sedes
collocata essent, illaque capita acuta haberent, et cum alia
quaedam fragmenta ab iis recessissent, supernatum est graue
ulcus et fistula, quae etiam per plures annos ad mortis usque
diem mansit. Iam ossa, quae non recta reposita fuerant, ob-
liqua, non aduersa, inter se iuncta sunt et medio duriore
callo confuerunt, foramen tamen relictum fuit, quod ad
interiora et pinguiorem medullam tendit. Nam media ti-
bia fracta est. Medulla vero corrupta fuit, id quod etiam
hoc tempore nigrities ostendit, quae in tibiae in longum
sectae inferiori ac cauernosa parte conspicitur, quo corru-
ptus humor defluerat.

§. 1066.

Iam supra retuli, in hoc valetudinis genere, prae-
cipue, si a malo corporis habitu enatum est, affici ossa
rara et cauernosa, non, ut in exostosi a lue venerea orta
fieri solet, dura atque fistulata. A paruulo vero haec
vitia incipiunt, quorum initia et incrementa conside-
rari oportet. Intumescunt igitur epiphyfes circa ar-
ticulos et ossa alia, ubi ea naturaliter pleniora et intus
cauer-

cauernosa sunt, praecipue minora digitorum in pedibus manibusque. Dolor in ipsis ossium medullis incipit, ab initio lentus, qui mox, tumore etiam ossis: facto, crescit et fere continuus aegrum fatigat. Hoc tempore ossis membrana nondum vitiata est, et musculusque sine noxa sunt. Plus mali vero subest, si dolor augefcit et fere intolerabilis fit, qui significat, malam materiam intus ortam periofcium vorare. Subiit vt supra dictum est (1040), se remittit dolor, et tandem sine tumore ac sine inflammationis notis subcutis sentitur pus, quod pressu circumfluit. Hoc vero increfcit, cutis parum leuari solet. Incisa cute, magnus puris ac saniei foetidae exit, quibus euocatis, dimisso specillo, os nudatum vitiatumque occurrit (1047).

§. 1067.

Cum vero his ossium vitiis crebrius hac aetate rheumatici obnoxii sint, necessarium videtur, hoc dirum valetudinis genus, eiusque proprietates, causas, initia, atque decessiones, nosse. Hoc vero infantes potissimum affligit, quibus id a sexto circiter post natiuitatem mense, oriri solet. Raro enim id in eos, quorum aetas vltra alterum, tertiumue, annum processit, incidere solet. Corpus non alitur, sed, summa macies orta, cutis carnesque deficiunt atque emacrescunt, venter multum intumescit, et digito renititur. Ossa augescunt, et praecipue epiphyses, prope articulos, tumidae sunt. Pueri etiam adultiores facti gressus mouere propter summam imbecillitatem non possunt, quibus etiam dentes serius nascuntur, mox nigri fiunt, labantur, caduntque. His vero pueris, pro modo aetatis, maior ingenii acies atque docilitas esse solet. Vbi procedente aetate adolefcunt, parum crescit corpus, multum autem caput, et caluariae futurae, multum inter se diductae, sero committuntur. Pectus a latere depressum
in

priorem partem prominet, et quasi acuminatum canatumque redditur. Etiam costarum extrema intumescunt, et iis tubercula dura innascuntur. Quod si utem plus mali est, et morbo non inter initia occurritur, oriuntur aliorum membrorum prauitates. Praecipue autem spina distorquetur, et in dorso gibberaunt, tibiae incuruantur ac in anteriora proiciuntur. Tandem vitium, quod in ossibus est, intenditur, quae talis humor vorat, et nascitur paedarthrocace. Accedit lenta febris, quae sine intermissione corpus tenet, qua illud longo morbo vitiatum summaque macie extenuatum perimitur. Vbi autem morbus non moritur, is per aetatem leuatur, et praecipue congruo victu et exercitatione, eius indicia in adolescentibus sedetentim minuuntur. Ossium deformitates aliquantum etiam emendantur, si per aetatem nervis et musculis imbecillioribus ac fere deficientibus nouum robur accessit.

§. 1068.

In corporibus rhachitide extinctorum inueniuntur glandulae fere omnes, quae lymphaticae, vel conglomeratae, vocantur, durae atque ex concreta quadam materia scirrhusae praecipue in mesenterio. Ossa praeter consuetudinem mollia sunt *, musculi extenuati, viscera autem, et prae caeteris cerebrum, mole auctum, in quibus etiam multus et muco similis humor reperitur.

* Ossa molliri, cum GLISSONIO, plures negant, id vero ostendit RVYSCHIVS Aduers. Dec. II. Obs. 6. et BOERHAAVE in Chemia T. I. p. 737.

§. 1069.

Si huius morbi curationem ab euidentibus causis, reiectis obscuris omnibus, instruere animus est, ei obnoxii sunt infantes, qui geniti sunt ab imbecillis parentibus, nimis otiosa vita lautisque dapibus eneruatis, et varia etiam longaque valetudine confectis. Eo etiam tentan-

tentantur pueri, qui teneri lacte aluntur, erudo vitotoque, et quibus, dum lacte depelluntur, dantur inter continuos vagitus, diu noctuque, potiones acescentis vel etiam addito saccharo dulciculae. Plurimum confert victus, si is crudus est et valentior, quam, ut in infirmis visceribus confici ac in bonum succum converti possit, praesertim pinguiore ac glutinosiore pulciculae, nec non dulciaria et omnis generis pulmenta. Alimentum etiam corpori tenello idoneum haec conficitur, si dentes cum maximis cruciatibus nascuntur, et si varii generis vermes in intestinis haerent. Nec omittendum est, pueris nihil magis nocere, quam si negligitur mundities, et sordes ventrisque proluvies, quibus cutis conspurcari solet, non tempestive summoventur. Haec et plura alia, a medicis requirenda, si morbum non faciunt, corpus tamen tenellorum ei magis obnoxium reddunt, cum haec valetudo raro ab vna et simplici causa, sed plerumque a plurium consortio, oriatur.

§. 1070.

Ex his omnibus autem manifestum fieri arbitror, succum illum, quo omne corpus, et ossa etiam, alii debent, in his ex crudo vitiatoque chylo confectum corrumpi. Ossa igitur, quae omni caeteroquin acido liquantur, molliora fiunt et intumescunt, et, quia caput ex ossibus componitur, illud etiam, pro modo reliqui corporis, plurimum augefcit, ita ut eius mole spina non parum prematur. Huius vertebrae, quae mediae perforatae sunt, si intumescunt, et a capite premuntur, medullam premunt cerebro commissam, nec non nervos, qui ab hac per tenuia caua vtrinque inter duos processus peruia educuntur. Cum vero hi nervi ad musculos potissimum pertineant, hi naturali robore defecti emacrescunt. Igitur, dum ossa crescunt et tumidiora fiunt, ossium vero vincula, vel sic dicta

dicta ligamenta, etiam infirma sunt, musculi breuiores
 atque extenuati ossa adducunt et inflectunt. Hoc pri-
 mum in spina incidit, quae in variam partem inclinata
 gibberis non vnam speciem ostendit. Etiam a pecto-
 ribus musculis et serrato antico maiori pectus, ipsum-
 que sternum, multum proiicitur *, a musculis abdo-
 minis pectus inferiora versus adducitur, et in dorso
 gibber nascitur, vel κύφωσις.

* Spinae et membrorum prauitates quomodo adductis variis
 musculis oriri soleant, curiosius exposuit Doctiss. IOANNES
 GODOFREDVS BRENDELIVS in Diss. de Rhachitide, Gottin-
 gae, MDCCXXXIX. Confer GLISSONIVM, MAYOVIVM et
 MARTINI HERMANNI GEISWEIT Diss. de causa Rhachiti-
 dis proxima, Lugd. Bat. MDCCXXXVI.

† Prae caeteris omnibus legendus est VAN SWIETENIVS in
Comment. in Aphor. H. BOERHAAVII T. IV. Quicquid enim
 ante ipsius tempora de morbo eo scriptum est, studiose col-
 legit, et vel probauit, vel improbauit. Idoneus etiam scri-
 ptor est LEVRETTVS, qui in Diario gallico, *Journal de*
Medecine Vol. XXXVII. A. 1772. multum decocto radice
 rubiae tinctorum tribuit. In germanicam linguam versa re-
 liqua vid. in *Miscellaneis illis, quae inscripta sunt: Samml-*
ung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte B. I.
P. IV. Varias quoque aliae observationes, perutiles, ad edu-
 cationem et nutritionem infantum teneriorum spectantes,
 ibi leguntur.

§. 1071.

Quoniam vero in his corporibus non oleosus con-
 sectusque succus ad ossa perlabitur, sed crudus, gluti-
 nosus et muco similis, ex eo, qui subsistendo ossium
 fibras ducit, et corruptus vitium etiam medullae ad-
 fert, nascitur tandem hoc pessimum cariei genus, seu
 paedarthrocace, quod raro curationem recipere, saepe
 etiam causam mortis adferre solet. Multum illud in-
 tenditur, si ad alias causas etiam morbus venereus ac-
 cedit, quem infans vel a parentibus accepit, vel cum
 lacte nutricis suxit.

§. 1072.

Etiam huius morbi curatio a medicis requirenda
 est. Scire vero licet, eos plerumque falli, qui adhi-
 bita

bita festinatione et temeraria aliqua via morbum delere conantur. Maximum praesidium in modico ac iusto victu, qui facile concoquitur et aromate abundanter potione etiam meraca et corporis exercitatione consistit. Extrinsicis salubres sunt multae valentes frictiones, quibus fluentia corpora adstringuntur. Commode etiam lanei asperioresque panni thure, storace, sicche, benzoe, baccis iuniperi, suffiuntur, et his frictur dorso spina. Unguento neruino vngi et pertractari muscoli possunt tenues atque infirmi. Nec ad mutandum corporis habitum aliena sunt balnea, quae tam frigida potius, quam calida, esse oportet. De gibbo in dorso, et quomodo ei per thoraces medendum scribam, vbi luxatorum curationem exequar.

§. 1073.

Si in iis, quibus ossa rhachitide intumuerunt, decedente illo morbo, cum aliis salutaribus signis, dolores in ossium medullis noui oriuntur, et aliquantum ingrauescunt, illi spem ostendunt, hominem sanum futurum esse. Si vero cum his, incrementibus doloribus, corpus magis emacrescit, et in malum habitum decedit, illi significant, os intus corrumpi. Si os vitium habet, illud non alia ratione curari potest, quam qualem in carie proposui. Saepe vitiatum non per squamam, sed pedetentim, resoluitur (1035). Cum his experienda est illa Guaiaci decoctio (1055), quae vero adultis magis accommodata est, quam pueris. Si in osse vitium est, quod nulla medendi ratione vinci potest, necesse est, vt membrum praecidatur. Et hoc tamen superuacuum est, imo quandoque mortem maturare potest, nisi vitium per humida et totum corpus diffusum prius aliis curationibus fuerit discussum.

DENTIVM MORBI.

§. 1074.

Ossibus duriores dentes sunt, qui ossibus malarum et maxillae inferiori haerent. In his gingivarum sibus veluti cuneoli infixi sunt, quam rationem, quae inter se committuntur, γόμφωσιν Anatomici appellant. Pars dentium, quae radix dicitur, in sinibus alveolis haeret, atque, ut caetera ossa, etiam membrana cingitur. Hac dentes, qui media parte paulo tantiores atque asperiores sunt, illis ossibus alligantur. Nam reliqua dentis pars, quae corona appellari potest, sine membrana est.

§. 1075.

In omni dente duplex materia conspicitur. Altera non multum ab aliis durioribus ossibus discrepat, ex qua fere tota radix et coronae interior pars componitur. Haec colorem habet quasi corneum. Hac longe candidior est altera illa exterior coronae pars, quae eburneola ex fibris albidis, iisque durissimis, composita est, ita inter se concretis, ut ab interioribus exteriora perfus procedant. Parum huius eburneae materiae habent radices, plurimum corona. In utriusque vero, et coronae, et radices, medio sinus est, membrana sua, et veluti perioestio, cinctus. Extremum radices foramen habet, per quod ex ossibus descendunt et denti inseruntur arteriae, venae, neruique. Hoc foramen in iuniorum dentibus, in quibus radices nondum formatae sunt, multum patet, quod post, incrementum radice, coangustatur. Sinus ille, qui in radice valde angustus est, in corona multum ampliatur.

§. 1076.

Dentes quaterni primi, qui, quod secant, τομικοί, et incisores, vocantur, et his ad latus positi duo canini,

nini, singulis, duo molares priores, vel singulis, v binis, reliqui molares ternis quaternisque, radicibus nituntur. Dentes postremi et serotini, qui plerumque, adolescente aetate, nascuntur, vnam, sed plenam, radicem habent. In his tamen nihil perpetuum est. Radices quandoque curuae et varium in modum flexae sunt, ita, ut iis etiam ossis pars quasi irretita comprehendatur.

* Vide EVSTACHIUM de Dentibus, MALPIGHII Opera post p. 51. H. A. R. Sc. MDCCIX p. 48. Obs. de la HIR GAGLIARDVM c. l. p. 57. et prae aliis FAUCHARD *Cirurgien dentiste*.

† Dentium historiam studiosius persecutus est IOH. HVNT RVS in Libro singulari, anglice scripto, et a Petro Boddae latine verso et inscripto: *Historia naturalis Dentium Humanorum*. Dordraçi 1773, cum nitidis iconibus.

§. 1077.

Dolor, quo excruciantur, et pueri, et adulti, quibus dentes nascuntur, maximis tormentis adnumerari potest, ex quo alii etiam grauesque et saepe pernicioles morbi nascuntur. Leuamen adfertur, si gingivae membrana extenuatur et mollitur. Cuius rei causa radix altheae, non trita, sed integra, cum melle coquitur et infantibus datur, qui illam loco dolenti admovent et mordendo gingivam extenuant. Eum in finem etiam infantibus alia duriora, corallium, dens lupi panis durior crusta, subministrantur, quibus morficatim ludunt. Etiam subinde specillum linamentis involutum in mel calidum demitti, eoque gingiva foueri potest. Cum his expedit, dari medicamenta lenientia et rhabarbarum, quo aluus ducitur. Purgationes valentiores, nec non varii generis medicamenta, quae aduersus hos dolores et aduersus nervorum distentionem extolluntur, et, quibus non pauci fidem suam addixerunt, saepe graue periculum adferunt.

† Mellita aliaque dulcia omittenda sunt, si, quod saepe et cum salute plerumque pueri fit, aluus iam multum delicit.

Nam

Nam a nimio fluxu eius admodum imbecilli fiunt pueri, pronique in morbum rhachiticum. Si commotio febrilis et multus calor in ore est, auxilium afferunt hirudines ad maxillae inferioris angulum admotae.

§. 1078.

Incidere solet, ut dens, qui prominet, aut sub exteriori gingiua latet, maximos dolores et nervorum etiam distentionem adferat. Ergo, ne dens increascens iam acerbos dolores moueat, gingiua incidi potest. Et super primores plaga fieri potest recta, super alios vero, et molares, ea duabus transuersis lineis facienda sit. Tota vero gingiua ad dentem usque aperienda sit, donec dens totus pateat. Nam, si, sectis caeteris, quaedam fibrae integrae relinquuntur, acerbitas doloris et nervorum distentio increascit. Nec nimis festinandum est. Nam, si gingiua super dentem nondum perfectum secatur, is breui vitium contrahit.

† Gingiua secanda tum demum est, cum dentis summa pars ita eminet, ut per attenuatam gingiuam perluceat; alioquin gingiua dissecta, antequam dens prorsus assurrexit, cicatricem contrahit, quae durior est et multo magis resistit, quam gingiua integra, non secta. Sectio ipsa omnem superficiem summmitatis dentis retegere debet, ne fibrillae non dissectae a dente intendantur, dolorisque continui causam fiant.

§. 1079.

Dentes naturaliter candiduli, extrinsecus scabri, sunt, atque atrii. si asperioribus pulueribus, et quibus multi sales admixti fiunt, et iis etiam crebrius, infriantur, vel, si peniculo asperiori ex setis rigidis composito absterguntur. Nam his eburnea illa pars tantum raditur; Eam etiam exest humor viscidus et acris, qualis est a saccharo; omnibus acidis et dulcibus, et qualis etiam, si stomachus ex coalescente cibo exaestuat, fauces dentesque infestat. Ex his cruditatibus et ciborum reliquiis coagulum denti inhaerescit, quod tartarum recentiores vocant, et quod praecipue eam

partem, qua alueoli membrana denti illigata est, instat. Si haec materia quotidie nouis incrementis, quandoque ad immensam molem *, augefcit, membrana a dentis radice diducitur, vt tandem gingiu a dente prorsus recedat. Igitur ob id dentes non bene haerent, et labare incipiunt, quos praeterea acris humor etiam exest.

* Vide figuram in FAUCHARD T. I. Tab. II. p. 136.

† Dentium quem vocant, tartarum a cruditatibus et reliquis alimentorum gigni, dubitare licet. Occasionem rodendae dare possunt et eburneam partem destruendo. Ipse verus sic dictus tartarus gigni, mihi quidem, videtur a materia ossea dentis luxuriante et per arrosam superficiem sudante.

§. 1080.

Sed non raro vitium ab interioribus incipit. Nam si in illa membrana, qua intus ille medius finus cingitur (1075), ex quacunque causa, inflammatio mouetur, dens vehementer dolet. Si inflammatio ad suppurationem spectat, illaque membrana exulceratur, oritur caries, quae tandem ad exteriorem partem transit. Dentes nonnunquam, si duriora iis submittuntur, finduntur, ex quo etiam corrumpuntur. Duobus vero modis, et vitio ab interioribus orto, et mala materia extrinsecus rodente, dentes infestantur, si totus corporis habitus vitiatum est, id quod in pueris rachitide aegris, et iis, quibus scorbutus, vel venereus morbus, per humida diffusus est, incidere solet. His enim omnibus dentes nigri fiunt, labant, caduntque. Nihil vero magis dentibus inimicum esse solet, quam argentum viuum, et omnia, quae ex hoc chemica arte componuntur, siue ea ore fumantur, siue extrinsecus dentibus admoueantur. Dentibus etiam, et nimius calor, et frigus, non parum nocere solent.

§. 1081.

Cum vero dentes magnam partem, et ad sanitatem, et ad formae dignitatem, conferant, illi summa cura

cura tuendi sunt. Si illi integri sunt, confert, eos crebrius, quoque die, et mane, et post coenam, tepida colluere, et linteolo, vel spongia, tergere. Si vero iam dentes liuidi sunt, interdum dentifricio vtendum est, quo dentes splendidi fiunt atque confirmantur. Variæ huius compositiones sunt, quæ plerumque corallia rubra, ostrearum testas, lapides cancrorum, os sepiae, terram sigillatam, bolum Armenam, terram Iaponicam, gummi laccae, myrrham habent, quibus parum aluminis vsti adiici potest. Oportet vero hos pulveres bene tritos esse, cum asperiores eburneam dentis partem abradant. Ii etiam commode melle excipiuntur, quod rosam habet, et mediante spongia admouentur. Necessè vero est, vt, et puluis, et mel, quod dentibus adhaeret, aqua diligentius eluantur. Alii radicem altheae coquunt ex melle, cui prius varii generis aromata et succum radicis anchusae adiiciunt. Radicem bene coctam siccant, eamque dentibus fricandis emaculandisque adhibent. Tenacior pituita tollitur dentiscalpio, quod optime ex lingo fit; illud vero coagulum, seu tartarus, quoque ferramenta considerat. Cura adhibenda est, ne vel ipse dens, vel etiam gingiua et illa alueoli membrana, ea parte, qua illa denti innectitur, laedatur, et a dente resoluatur.

§. 1082.

In dentium autem dolore causam considerari oportet. Si copia sanguinis corpus male habet, oportet, eum, vena incisa, vel concisa cute admotisque cucurbitulis, mitti. Aluus ducenda est lenioribus, satis tamen valentibus, quæ etiam in inflammatione vtilia esse dixi (63). Cum his prodest abstinentia et potio dilutissima. Dari etiam potest nitrum. Vbi autem serum redundat, id quod incidit, si corpus, calore relaxatum, subito frigore excipitur, sudor eliciendus est.

Commode etiam in hoc casu cantharides, vel nucha vel processui mastoideo, superdantur, et vlcera per aliquot dies seruantur (937. 938). Si dens, qui dolorem mouet, exesus est, expeditissimum est, eum eximi.

§. 1083.

Nigrities autem et caries, si ea nondum altius descendit, nec ad alteram partem penetrauit, interdum tolli potest, si scalpro atque ferramentis raditur, donec dens integer sit, cui post essentia cinnamomi, caryophyllorum, myrrhae, admouetur. Valentioris generis est oleum caryophyllorum, quod etiam superdari potest. Nec inutilis est vsitio, ad quam etiam ferramenta idonea habemus, quam tamen plures reformidant. Si autem dens exesus est, et nec commode, nec sine periculo, eximi potest, sinus bene accommodato auro, plumboe, replendus est, ne cibus et potio atque aer, quibus intus membrana neruusque offenduntur, dolorem moueant.

§. 1084.

Si omnia haec nihil adiuuant, dens, qui seruari nequit, debet euelli, cum corrupta eius materia etiam reliquos, qui integri sunt, infestare soleat. Ducuntur variis ferramentis, forcipe potissimum, et alio, cui nomen Pelecani imposuerunt chirurgi. Si, exento dente, radix relicta est, ea alio ferramento, quod *εὐζάγχα* vocari potest, eximenda est.*.

* Sic vocat CELSVS Lib. VII. Cap. XII. confer RHODIVM in SCRIBONIVM LARGVM p. 94. Nostratibus dicitur *ein Geissfuß*, Gallis *un poussoir*. Vid. FAUCHARD T. II. Tab. XVIII. fig. 3. In hoc omnia ad dentium curationes necessaria instrumenta delineata sunt.

† Ferramentorum ad dentes euellendos inuentorum prope modum omnia, forcipe excepta, id vitii habent, quod dentem non recta sursum deorsumue ducunt, verum ad latus trahunt; ideoque coronam a radice saepe resoluunt, et hanc in aluicolo relinquunt. Nec forceps tamen vbique ad ducendum idonea est, sed tum demum, quando corona
dentis

dentis nondum multum carie emollita est, eaque sat longe ex alueolo et gingiua exstat, adeoque satis alte a forcipe prehendi potest.

§. 1085.

Dentium etiam radices quandoque vitiantur, integra manente corona. Scire id licet, si, dum specillo ferreo dens feritur, aeger dolorem acutum sentit. Id quandoque vni, quandoque pluribus dentibus, accidit. Et hos, qui sic affecti sunt, educi oportet. Nam iis abscessus, vlcera atque fistulae supernascuntur.

§. 1086.

Non sine periculo dentes, praecipue molares, posteriores euelluntur. Ossa enim rara gingiuarum quandoque forcipeprehenduntur, vel a maiori dente concutiuntur, frangunturque, id quod etiam accidit, si inflexae radices ossi inhaerent (1076). Vbi autem os fractum est, grauis dolor atque inflammatio moventur. Subinde etiam sanguinis profusio oritur, si arteria, quae per gingiuae os discurrit, et dentibus alimentum subministrat, rupta fuit, quae res quandoque mortem maturauit. Hoc si incidit, acetum frigidum ore continendum est, obseruatis omnibus, quae aduersus sanguinis profusionem maxime possunt. In sinum etiam, vel alueolum, auulsi dentis, demitti et mediante ferramento infuleiri linamenta debent, ex alcohol expressa. Scire quandoque licet, dentem pluribus maioribusque radicibus niti, si eius corona amplior ac pluribus tuberibus et asperata est. Expedit, eiusmodi dentem, de quo suspicio est, eum non sine maiori periculo posse euelli, prius multum ac per plures dies concutere, donec bene moueatur, et tum eum, si fieri potest, digitis, si minus, forcipe excipere.

† Sanguinis fluxus ex arteriola cuius alterum latus cum osse alueoli concretum est, mortis aut certe summae debilitatis periculum affert. Compressio vasis et obturatio sit cera,

quae manuum calore admodum sequax et flexilis reddita in alueolum linteo molli absterfum subito et vi quadam adhibita demittitur sic, vt is omni ex parte impleatur.

§. 1087.

Fit etiam interdum, vt in gingiuis iuxta dentes tubercula oriantur dolentia, quae *παρελίδας* Graeci appellant. Si illa cum inflammatione sunt, imponenda est ficus semiuultulata. Ore etiam continendum erit lac, in quo radix altheae decocta fuit. Fere superuacuum est, extrinsecus imponi emplastra. Si suppuratione se ostendit, pus celerrime euocandum est, ne id, si diutius permanferit, os laedat. Pure exempto, satis est ori frustillum sacchari cum essentia pimpinellae continere, et caeteroquin vti illis medicamentis, quibus vlcera oris curantur (914. 916).

† Si abscessus is a dente carioso initium suum habuit, et dens euellendus est, euulsio commodissime fit altero ab ruptura abscessus die.

§. 1088.

Nonnunquam ex eiusmodi abscessibus mala vlcerata et fistulae fiunt, ex quibus pus diutius fertur. Si pus ex his exitum non habet, gingivae, et quae iuxta sunt, cum inflammatione iterum ac crebrius intumescunt. Hoc euenire consuevit, si, vel os gingivae vitiatum, vel ipse dens, et huius praecipue radix, corrupta est. Tales fistulae nullam curationem recipiunt, nisi exempto dente. Si in osse quid vitiosi est, illud radendum, et idoneis medicamentis (916. 1059) purgandum est, donec illud integrum sit. Nonnunquam etiam testa ossis decedit, quae recipi debet (1035).

§. 1089.

Aliud tumoris genus in gingiuis nascitur, quod sine inflammatione est, et *επελις* dicitur *. Tumor quandoque durus est, veluti callus, quandoque rarus mol-

nollisque, et fungo, vel putri carni, similis. Etiam is ple-umque vitiato ossi superincrescit. Si tumor durus est, confert illum circumcidere et carnem subsecare, quo os patefiat: tum id ea ratione, ac de caeteris ossibus dictum est, curare (1058. ad 1065). Si tuberculum molle est ac rarum, illud, volsella apprehensum, iuxta radices exciditur. Ne quid iterum increseat, radix scalpello altioribus plagis concidenda et increscens caro alumine vsto coercenda est. Si vero os vitiatum subest, curatio talis esse debet, quae ossibus alienatis adhibetur. In omnibus his curationibus os crebrius idonea lotione eluendum est.

* Differentiam *παρελκίος καὶ ἐπικλίδος* habet PAVLVS Lib. III. Cap. XXVI. p. 38.

† De his aliisque oris morbis vid. *Traité des Maladies Chirurgicales de la bouche, par Jourdain. Paris 1778.*

L V X A T A.

§. 1090.

Articuli, si sedibus suis excidunt, et ossa, quae naturaliter iuncta sunt, si inter se dehiscunt, luxata vocantur. Medentem, qui his succurrere cupit, oportet non solum ossium positus figurasque nosse, quas sceletus ostendit, sed etiam compertos habere omnes articulos atque commissuras, et in his ligamenta, cartilagineas atque glandulas, quae in articulo sunt, et quae humorem fundunt, quo, veluti axungia, ossa, quae super se mouentur, illita sunt. Considerandi etiam sunt muscoli, quibus membra ad varios usus mouentur. Nec ignorari oportet aetatum varietates, et illas, tum cartilaginosas, tum osseas, appendices, seu epiphyses. Haec, cum ad curationem plurimum conferant, discuntur ex diligenti et assidua ossium et articulorum, non tam in sceleto, quam in recenti cadauere, contemplatione.

O o 4

§. 1091.

§. 1091.

Vt tirones has varias ossium commissuras melius scientia comprehenderent, eas anatomici in certa genera digesserunt. Magna vero illorum dissensio est, et alii alia vocabula iisdem ossium commissuris impulerunt. Quoniam vero nullus articulus alteri tam similis tamque par est, ut non ab eo discerni debeat, non illorum nominum a variis autoribus propositorum notitiam, sed diligentem et assiduam contemplationem, iis, qui curaturi sunt, necessariam esse reor.

§. 1092.

Proponam tamen illa genera nominaque, quae quamvis medendi peritiam non faciant, eam tamen excitando artificis ingenium, adiuuare possunt. Nam ex illorum generum cognitione certae regulae praeceptaque proficiuntur, ad quae curatio dirigi potest. Vbicunque igitur os ossi iunctum et vnum contra alterum situm est, considerari possunt duo. Et utriusque, imo et plurium ossium figura structuraque, quae ea inter se committuntur, σύνταξις, et illorum nexus seu ratio, qua ea inter se continentur deliganturque. Prius τὸ ἀρθρον vocant, seu articulum, vel iuncturam, posterius per σύμφωσιν exprimunt. In articulo mox discrimen est, ut ossa super se moueantur, vel motu, qui in sensus incurrit, et dicitur διάρθρωσις, vel motu minimo, et qui vix deprehendi potest, et vocatur συνάρθρωσις. Vtriusque vero, et diarthrosis, et synarthrosis, tres modi sunt. Nam os, quod caput rotundum habet, in sinum profundum coniicitur, et vocatur ἐνάρθρωσις *, vel ossis extremum caput se inferit in sinum minus profundum, et vocatur ἀρθρωδία **, vel duo ossa ita inter se iunguntur, ut utrumque et sinus habeat et processus, utque processus in sinus inferantur, his vero illi excipiantur, quod commissu-

missurae genus, cardinis modo, quasi mutuum, vocatur γίγγλυμος ***.

* Enarthrosis diarthrodes seu cum motu in sensus incurrente est, in articulo, vbi caput femoris sinui rotundo et altiori coxae inseritur. Enarthrosis synarthrodes, seu cum motu minimo est in palma manus, seu carpo. In hoc enim os maximum, seu capitatum in profundiolem sinum demittitur, qui ex iunctis inter se ossiculis, lunato ac nauculari, formatus est.

** Arthrodia diarthrodes est, vbi humeri rotundius caput sinui glenoido scapularum ossis inseritur. Arthrodia synarthrodes deprehenditur in pede, vbi maior calcanei processus in sinum ossis naucularis inseritur. Etiam ex mente horum anatomicorum ad arthrodiam referri debent illi articuli, vbi os fere planum super aliud, quod etiam planum est, mouetur, v. g. ossa, quae cunei figuram habent in tarso, super nauculare, processus obliqui vertebrarum dorſi inter se, iugulum super acromium.

*** Ginglymus varii generis est. Ginglymus diarthrodes est in iunctura humeri cum radio et vlna, femoris cum tibia. Ginglymus synarthrodes est in commissura calcanei cum astragalo. Ginglymum angularem vocant, vbi duo pluraque ossa quasi angulum repraesentant, v. g. humerus et vlna cum radio, femur et tibia. Ginglymum lateralem, vbi ossa e latere inter se committuntur, v. g. radius et vlna, tibia et fibula. Nonnulli ad arthrodiam referunt, alii ab hac et ginglymo distinguunt τὰ ἄρθρον τροχοειδές, qui articulus est inter primam et secundam cervicis vertebram, et huius processum odontoideum. Vid. RIOLANVS in GALENVN de ossibus Cap. VI. in Oper. p. 454.

§. 1093.

Synarthrosin etiam nominant commissuram ossium sine omni motu. Haec ratio etiam varios modos habet. Suturam, harmoniam, quam alii ad futuram referunt, γόμφωσιν (1074) et σχινδύλησιν. In hoc ultimo commissurae genere os ab alio osse, quod in longum fissum est, excipitur *.

* Talis commissura est, vbi ossis sphenoidei processus et septum nasi excipiuntur a vomere. Vid. KEILS *Anatomy* Cap. V. Sect. III. p. 237. qui primus hoc nomen dedisse videtur.

§. 1094.

Haec omnia ad τὴν σύνταξιν attinent. Σύμφυσι vero etiam varia est. Nam vel os contra aliud situm est, ita, ut nulla media materia sit *. Vel ossa inter se continentur, media cartilagine, per συγχόνδρωσιν vel deligantur ligamenti per συνδέσμων, quam etiam συννέωσιν vocant, vel coniunguntur carne et musculis per συσσάρκωσιν.

* Aliter hanc rem proposuit WINSLOVIVS Expof. Anat. T. I. §. 123. τὸ ἄρθρον, siue iuncturam, diuidit in διάρθρωσιν συνάρθρωσιν et ἀμφιάρθρωσιν. Diarthrosis est ei, ubi duo ossa, quorum extrema cartilagine mollita sunt, super se, vel manifesto, vel parum et obscure, mouentur. Diarthrosis etiam in enarthrosin, arthrodiam et ginglymum diuiditur. Synarthrosin appellat, si ossa inter se continentur, quorum extrema non in cartilaginem vertuntur, nec etiam super se mouentur. Quo referri potest futura ἀρμονία, γόμφωσις, quibus adhuc addi potest σχινύλησις. Ἀμφιάρθρωσιν autem vocat, si inter duo ossa, media cartilago est, eaque mollior, quae sinit haec ossa paululum moueri. Talis commissura est inter vtrumque os pectinis et inter os sacrum atque innominata; inter costam primam atque os pectoris. Symphysin, quae sine media materia est, distinguit in eam, quae per aetatem fit, dum quaedam ossa in pueris diuisa tandem nullo relicto vestigio concresecunt; et in aliam, si ossa nulla cartilagine terminantur, sed sola figura, veluti ossa, quae in basi caluariae sunt, continentur. MONRO in the Anatomy of the humane bones, ad symphysin refert solam futuram et γόμφωσιν. Ab hac distinguit τὸ ἄρθρον, s. articulum. Hunc iterum diuidit in synarthrosin et diarthrosin. Ad diarthrosin refert et motum manifestum et obscurum. Synarthrosin vocat commissuram, ubi nullus motus est. Is etiam articulum humeri cum omoplatea, quem plures ad arthrodiam referunt, reuocauit ad enarthrosin. Quia ego tironibus scribo, permanere malui in veterum doctrina, cum caeteroquin magis commoda videatur diuisio WINSLOVII et MONRO.

§. 1095.

Cum vero ossium commissurae atque articuli ita discreti sint, de his quaedam communia noscenda sunt. Siquidem frequentissime et facillime suis sedibus mouentur articuli per arthrodiam, qui etiam penitus inter

se dehiscunt, ut os prorsus ab altero osse, cui id
 iunctum erat, recedat. Articuli vero per ginglymum,
 cui validioribus ligamentis adstringuntur, non nisi
 maiori vi, et vix unquam penitus, et ita expelluntur,
 duo ossa inter se ex toto distrahantur. Nec hoc
 fieri potest sine violatis, disruptis, vel multum infir-
 matis, ligamentis. Itaque illi articuli saltem parum
 aliqua parte suis sedibus promouentur. In arthro-
 dia et enarthrosi est motus orbicus, ita, ut membrum,
 quasi circa axin, voluatur, qui motus tamen perfectior
 est in priori, quam in altera. In ginglymo non alius
 motus est, quam, quo membrum adducitur flectitur-
 que, et quo illud extenditur. Si artus consideramus,
 humeri caput sinu scapulae per arthrodiam, et fe-
 noris caput, sinu profundo coxae per enarthrosin ex-
 cipitur, in cubito et genu ginglymus est. Etiam, ubi
 manuum et pedum digiti incipiunt, arthrodia est.
 Nam digitorum suprema ossa in vertice sinuata sunt,
 et recipiunt ossium, ex quibus metacarpus et metatar-
 sus componitur, pleniora capitula. Reliqui digitorum
 articuli per ginglymum committuntur.

§. 1096.

Veteres nervos appellauerunt illa dura, flexilia,
 elastica, cartilaginibus molliora, membranis rigidiora,
 vincula, quibus ossa inter se deligantur, et quae re-
 centioribus ligamenta vocantur. Horum varia figura
 est. Communia fere omnibus articulis sunt illa mem-
 branacea, pro modo ossium valida, vel tenuia, quibus
 ossium extrema in articulis comprehenduntur. His
 a Gallis nomen impositum fuit *les Capsulaires*, et, cum
 latinum vocabulum deesse videatur, ea forte manticu-
 las appellare posses *. Hoc genere ligamentorum
 interdum solo **, interdum accedentibus aliis, ossa
 inter se connectuntur. His vero etiam continetur
 axungia,

axungia, qua ossium cartilagines illinuntur. Sunt has manticulas, membranae in modum dispar feruntur, et ex vno osse in aliud, quod contra sit est, pertinent alia ligamenta valentiora pleniorae magis vero contracta et teretia, quae illis prioribus adhaerescunt***. Sunt alia ligamenta, quae intra manticulas ex vno osseeducta alteri inferuntur***. Nec desunt, quae prohibent, quo minus ossa sibi lateris posita inter se dehiscant****. Omitto alia ligamentorum genera, quae non tam ossibus iungendis, quam continendis aliis partibus, accommodata sunt.

* A WINSLOVIO v. Expos. T. I. de ossibus recentibus §. 36.

** Veluti in articulo humeri cum omoplata. Praeter aponeuroses enim a tendinibus musculorum profectas vix alia ligamenta esse videntur, quae hunc articulum comprehendunt.

*** Praecipue in ginglymo, v. g. humeri cum radio et ulnae femoris cum tibia.

**** In articulo coxae cum femore, femoris cum tibia.

***** Quae inter ulnam et radium, tibiam et fibulam, sunt illud transversum, quod in prima vertebra colli est, et quo processus odontoides secundae vertebrae continetur. Ligamenta, quae inter processus vertebrarum spinosa sunt. Quo referri etiam potest illud, quod in scapula est inter processum coracoideum et acromium, quod humeri caput, ne facile excidat, tuetur. Vid. MONRO l. c. p. 268. Confer de omnibus, praeter VESALIVM et REALDVM COLVMBVM, WINSLOVIVM l. c.

† Itemque Syndesmologiam WEITBRECHTI.

§. 1097.

Articuli, qui brevioribus validisque ligamentis comprehenduntur, non, nisi maiori vi, expelluntur. Si vero exciderunt, etiam non sine negotio in sedes suas compelluntur. Si ligamenta infirmata sunt, et horum vitio ossa emota fuerunt, haec facile reponuntur, sed vero in suas sedes compulsa iterum excidunt.

§. 1098.

§. 1098.

Ossa in articulis cartilagine terminantur, et nullus articulus non sic finitur. Cartilagines durae sunt, usticae, lubricae, sine omni sensu. Praeter eas cartilagine, in quas ipsa ossa desinunt, aliae sunt, quae mediae, inter duo ossa, etiam cartilagine mollita, collocatae sunt, super quae quoque ligamenta, praecipue membranae manticulae (1096) illigantur *. Sunt et aliae, in quas ossa quasi degenerant, et quibus mediis ea continentur. Hae etiam aliquam, quam minorem, mobilitatem praestant **.

In articulo maxillae inferioris cum osse temporum, in articulo sterni et iuguli, femoris et tibiae.

* Cartilagines, quibus mediis ossa coxarum inter se et cum sacro committuntur. Praecipue in costis et in ipso sterno.

§. 1099.

In articulos humor confluit, quo ad faciliorem motum cartilagines, veluti ad circumactum rotarum eo pissino vehiculorum axes, perunguntur. Humor compositus esse videtur ex pituita, oleo et lympa. glutinosus, pituitae vel muco similis, humor effertur maioribus glandulis, quae in articulis collocatae sunt, quas mucosas vocare, solent *. Illae glandulae colles sunt, et ex iis plures minores fistulae educuntur, ex quibus ille humor destillat. Ita vero in articulis collocatae sunt, ut motis agitatisque ossibus aliquantum premantur, quare pro modo vehementioris exercitationis maior humoris vis ex his glandulis exprimitur, qui ad lubricandos cartilagineos ossium iunctus necessarius est. Humor ille oui albo similis, salis, igne non cogitur, sed per aera in vaporem effunditur, relicta aliqua quasi cuticula: Hae glandulae multa adipe circumdantur, quae etiam articulis bique fere inhaeret. Adipis oleum etiam pressu effunditur et illi glutinoso humori admiscetur. Nec

a vero alienum est, aliquid accedere ex tenuiori ossu
cauernoformi medulla (1031), quae forte per carti-
lages penetrare potest. Praecipue vero humor illi
phae similis destillat ex illis ligamentis, seu mantica
quibus articuli comprehenduntur, et vel ex earum
poris glandulis, vel arteriarum minimarum finibus

* Vide Cl. HAVERS Osteologiam nouam Cap. IV. p. 187. W.
LOV. c. I. §. 66. et Clar. FRIDERICI LEBEGOTT PITSC.
Diss. de Axungia articularum, Lipsiae MDCCXL. Ex-
perimenta nonnulla cum axungia facta vide in Comm. Bo-
nienfibus p. 148.

§. 1100.

Ob id vero axungia ex humoribus natura diue-
mixta est, quo magis idonea lubricandis articulis est.
Illam quiete cogi, motu autem liquefcere, liquefactam
venulis iterum absorberi, et cum humidis per vniu-
sum corpus diffusis confundi, experimentis cognitu-
m est. Alibi retuli (357. 485. 486. 487), ex vulnera
articulis quandoque *μελίκηραν*, vel synouiam, exire,
hanc esse confluentem redundantemque axungia.
Quae ad τὰς ἀγκύλας rigidofque articulos attinet, q-
inter alias causas etiam ab hoc humore nascuntur,
is crassior euadit, protinus dicam.

§. 1101.

Oportet vero cum his omnibus etiam considera-
neruos et musculos, arterias venasque, earumque
omnium sedes atque figuras, positus atque recessus
quae omnia in anatomicis exercitationibus discuntur.
Nam, si ab ossibus luxatis arteriae venaeque compr-
muntur, graues inflammationes mouentur, et non rar-
membra gangraena periclitantur. Nerui si premuntur
oritur stupor debilitasque et eorum resolutio. Musculi
si eorum nonnulli nimium, alii minus, intenduntur
membrum reponi non sinunt.

§. 1102

§. 1102.

In pueris raro incidit, vt articuli aliqua vi ex suis sedibus expellantur, sed saepe illae appendices, seu epiphyfes (1090), prope articulos a reliquo osse dilucuntur. Hoc vitium, quod quasi medium inter fracta luxataque est, difficilius sanescit. Quandoque raro in his membris emacrescit, et haec minus, quam aetera, crescunt.

§. 1103.

Luxata vero varia discrimina recipiunt. Nam ossa quandoque penitus inter se recedunt, quandoque arum ex sedibus suis mouentur, ita, vt, quod ab alero excidit, non prorsus recedat, sed aliqua parte subsistat. Prius in enarthrosi et arthrodia, alterum in inglymo, frequentius euenire, iam supra retuli (1095). Nonnunquam ossa cum vulnere, contusis etiam vexisque carnibus, loco mouentur, vel, quae exciderunt, tiam fracta collisaeque sunt, ideoque magnus inflammationis, gangraenae, et quandoque mortis, metus oriri solet. Etiam discrimen est, si os, quod excidit, proinus et sine mora reponitur, et si illud relinquitur, atque tandem vetustas accedit. Multum etiam confert corporis, ligamentorum musculorumque habitus.

§. 1104.

Vix attinet dicere, articulos suis sedibus vi, ictu, casu, saltu, expelli, et si membra, vi facta, in diuersa distrahuntur. Ossa vero etiam quandoque musculorum resolutorum et emacrescentium vitio prolabuntur. Nam in his membris ligamenta, quamuis ab initio satis valida sint, tamen membrorum pondere infirmitate extenuanturque. Si vero muscoli integri sunt, et satis validi, ligamentis vero vis destituta est, ossa ipsa musculorum actione facile promouentur; id quod accidit, si maior vis adhibita fuit; membraque ab eo, qui

qui curaturus erat, nimium fuerunt intenta. Indum in articulos, praecipue in profundiores, vel et quandoque in exiguos sinus, quibus ossa contra excipiuntur, humor confluit, quo indies augecer os pedetentim e sede sua promouetur. Hoc incipit si ex febre, veluti ex variolis, mala materia in articulo inclinata est, vel, si, id quod crebrius euenire solet, grauiori ictu, casuue, extrinsecus articulus ita laesus fuit, vt in eo etiam, vel ligamentum, vel supra commemoratae glandulae (1099), grauiter percussae sint. Si ossa puerorum, qui rhachitide aegri sunt, intumescunt, illa etiam tandem e sedibus suis elabuntur. In nullo articulo haec vitia frequentius incidunt, quam in sinu coxae, quo caput rotundum femoris recipitur.

†. Nonnulla de his generibus luxationum vid. in Dissertatione quam SABATIER de luxationibus consecutiuis (*Luxations consecutives du femur*) Monument. Acad. R. Chir. V. V. adiecit.

§. 1105.

Sunt quaedam communia luxatorum signa, quaedam propria. Siquidem semper ea parte tumor est in quam os prorupit, ea sinus, a qua recessit. Membrum in eam partem, in quam os excidit, porrigi non potest, paulo magis in contrariam, nunquam vero sine dolore. Pro variis casibus, membrum emotum brevius, quandoque longius, esse solet. Huic etiam, vel nullus, vel minor, vsus relictus est. Dolor et inflammatio quandoque non tam ab osse, quod loco suo non est, oriuntur (1100), sed, quod muscoli neruique iniuria extrinsecus illata vexati sunt, atque collisi, quod membrum, quamuis integrum et haud luxatum sit moueri vix sinunt.

§. 1106.

Os non totum e sede sua motum esse, sed parum saltem excidisse, intelligitur, si articulus post ei illatam vim

im cum tumore dolorem habet vehementem atque
 ontinuum, qui etiam suo tempore, et adhibitis omni-
 us auxiliis, non leuatur. Membrum non in omnem
 artem porrigi potest. Illud loco suo non esse, ipsa
 ius figura ostendit. Quare, os luxatum esse, scitur,
 membrum, quod noxam habet, cum altero, quod in-
 tegrum est, diligentius confertur.

§. 1107.

Si articuli resolutorum muscutorum vitio (1104)
 apsi sunt, id scire licet, si olim homo apoplexia atto-
 itus fuit, si membrum resolutum est, et in eo carnes
 nacruerunt. In eiusmodi membris articulus sine
 mni negotio in sedem suam compellitur, sed mox ite-
 im excidit (1097). Si brachium resolutum est, tan-
 em etiam naturali eius pondere extenuantur liga-
 ienta, quibus humerus omoplatae adstringitur, quare
 embrum longius fit (1104). In articulo vero cir-
 im circa depressus digitus sinum inuenit, vbi duo
 la inter se recesserunt.

§. 1108.

Si ligamentis vis destituta est (1104), muscoli ve-
 o integri valentesque sunt, horum vel minori actione
 fla emouentur. Articulus tumidus est et dolorem
 abet. Si os, quod excidit, in sedem suam compelli
 equit, quamuis omnia recte fiant, scire licet, in sinum,
 uo os excipiendum est, confluisse humorem, qui se-
 itus opponit, et, ne os reuertatur, prohibet.

§. 1109.

Varia etiam pericula ossibus luxatis oriuntur.
 lemmum nonnunquam inflammatione et gangraena
 ericlitatur. Quandoque abscessus fiunt, vel nascun-
 ar tumores oedemati similes (729). Interdum car-
 es emacrescunt. Articuli tumidi rigidique, et in iis
 γούλαι fiunt, quae efficiunt, vt minor vsus (1104)

membri relinquatur. Maius periculum esse solet ginglymus excidit, quam, si arthrodia, praecipue, si illo ossa penitus inter se recesserunt. Hoc vero ginglymo euenire nequit, nisi maiori vi, et ruptis distractis infirmatisque omnibus ligamentis (109. 1103). Nullam curationem recipiunt articuli, et ligamentorum musculorumque vitio emoti sunt (1104). Nec perfecta sanitas, sed semper debilitas sequitur, si os, quod, vi extrinsecus accedente, loco suo motum est, non protinus repositum fuit, sed neglectum. Articuli, qui validis ligamentis plenisque musculis continentur, non nisi maiori vi, et sedibus si mouentur, nec, nisi magna etiam vi adhibita, iterum eas compelluntur. Qui vero articuli sine negotio expeditius reponuntur, multo facilius iterum excidunt et minus fideliter continentur. Frequentius adolescentibus, foeminis et imbecillis ossa excidunt, quam adultis, robustioribus, et viris. Si in sinum humeri confluit, et hunc axungia quiete coacta crassaque implet (1104. 1108), vel, si os propterea excidit, quod id ipsum intumuit (1087. 1104) articulus sanus fiet et vetustae sedi aduescere, non potest. Os etiam quod reponi non potuit, tandem cum sedibus, in quibus residit, concrescit. Si, reposito osse, vehementer dolor manet, vel neruorum distentio sequitur, scilicet, id loco suo non esse, et ab eo ligamentum prem

§. 1110.

Articulos, qui excidunt, reponi oportet, et auertere, quae his superueniunt. Si vero os, quod ex sedibus sua prolapsum est, compelli debet, necesse est, ut illud quod semper musculorum actione adducitur, satis extendatur. Hoc vero a chirurgo solo fit, vel cum adiuvantibus ministris. Quandoque, id quod optimum est, res solis manibus agitur, quandoque iniectis haec, et adhibitis etiam variis machinamentis.

§. 1111.

§. IIII.

Membrum, si illud tenerum est, intendere vnus homo potest, cum dextra manu id, quod loco suo motum fuit, sinistra aliud, a quo hoc recessit,prehendit. Valentius autem membrum duobus eget, qui in diuersa contendunt. Non maior adhiberi debet vis, qua membrum luxatum extenditur, quam ea est, qua alterum reducitur. Si id fieri potest, nec manus, nec lora, alii membro iniici debent, quam ei, quod expulsum est, illique, a quo hoc recessit. Vbi membra sic in diuersa ducuntur, considerandi sunt muscoli, vt omnes aequali modo intendantur. Extendi debet membrum, quod excidit, pro modo ac ratione, qua illud longius a sua sede recessit, eo vsque, vt illud paulo longius sit, quam naturaliter esse debet. Si vero nimium adducitur, vis ligamentis infertur, quibus imbecillitas manet (1104. 1108). Membrum, quod extendi debet, vi aequali sedataque paulatimque aucta adduci oportet, non vero perrepentinos impetus rapi. Si vastum corpus fasciis, habenis, lorisque, eget, illa mollia esse et ita extremis membris iniici debent, ne cutim carnesque offendant. Oportet tamen illa magis adstringi, si iis membra corporum vastorum obesorumque deliganda sunt.

§. IIII2.

Vbi autem ossa satis inter se diducta sunt, id quod scire licet ex articuli et musculorum habitu, et si membrum paulo longius videtur, quam id naturaliter esse solet (1111), os iterum in suam sedem compelli oportet. Ergo remitti debent, vel manus, vel habenae, quibus membrum emotum intenditur, aliud vero, a quo hoc recessit, reducitur. Cura habenda est, vt hoc etiam aequali lentoque motu fiat, ne, cum os cum impetu reuertitur, et reconditur, eius cartilago, vel aliud quod ligamentum, laedatur. Os vero quandoque per

se, musculorum ac ligamentorum motu, per eam partem, per quam venit, reuertit, vel manu chirurgi, vel etiam per varia genera machinamentorum, compellitur. Si illud his dirigitur, videndum est, ut semper suam sedem, per eam viam, per quam venit, reuertatur.

§. IIII3.

Os loco suo esse, scire licet, si tumor (1105) deest, dolor leuatur, et membrum ab eo, quod integrum est, haud differt (1106). Manere solet tumor dolorque, qui non a prolapso osse, sed ab ictu illato, oriuntur (1109).

§. IIII4.

Vbi os in suam sedem repositum est, in iunioribus robustioribusque illud solis ligamentis et musculis continetur. Articulus tamen per aliquot dies potest in iuncta fascia pannisque deligari, ne is, si forte laessum iterum a sede sua excidat. Ob id etiam debet membrum, vel mitella, vel canaliculo, excipi et contineri. Ita vero collocandum est, ne vis in ligamenta musculosque fiat. Oportet autem, vbi membrum, leuatum omni inflammatione, per aliquot dies conquieuit, quoque ad usus suos promoueri. Hic motus, qui, vigente dolore ac inflammatione, pestifer esse potest, huiusmodi discussis, necessarius est, quippe qui prohibet, quo minus axungia in articulo cogatur, et is rigidus fit (1004.) Medicamenta, quae vulgo adhibentur, fere superuacua sunt.

§. IIII5.

Vbi autem metus est, ne infirmitas ligamentis, articulo imbecillitas maneat, ei, antequam deligatur, si periniiciendus est pannus compositus, ex vino austero rubro, calido, vel etiam aceto cum aqua expressum. His commode incoquantur radices tormentillae, biftortae, bryoniae, sigilli Salomonis, herbae agrimoniae.

absinthii, alchimillae, maioranae, serpilli, rutae, laudulae, et adiicitur sal ammoniacus, vel sal communis. Nec corporibus plenis inutilis est spiritus matricalis, serpilli, lumbricorum terrestrium, fornicarum. Haec omnia etiam ob id in his casibus proficiunt, quod iis et nouum robur additur ligamenti musculisque, et quod quoque inflammatio leuatur. Qui emplastris fidem suam addixerunt, illi, si nulla, vel exigua, inflammatio membrum tenet, imponere possunt illud, cuius compositionem **WVRTZIVS** dedit, et quod defensuum viride nominant. Emplastrum autem ita iniici debet, ne totum membrum comprehendat. Quandoque, si haec medicamenta ab initio neglecta fuere, articulo imbecillitas manet, et dolores oriuntur, qui sub tempestatibus variant, interdum vrgent, interdum se prorsus remittunt.

§. III 6.

Si vero maior infirmitas post hanc curationem in articulo est, praeter haec medicamenta, conueniunt etiam emplastra, ex quorum numero oxycroceum, nec non saponatum Barbette, caeteris praeferrri debent. Multum proficit fricatio, et si membrum crebrius ac diutius, si potest, per se, sin minus, per alium, mouetur agiturque, vt ad consuetudinem redeat. Infricari possunt modo dicti liquores chemica arte parati, seu spiritus. Haec tamen spirituum infricatio iunioribus plenisque corporibus magis idonea est, quam gracilibus, tenuibus, senectute emaceiatis, quibus opportuniore sunt vnguenta. Vnctioni aptissimum est vnguentum, quod neruinum nominatur, oleis destillatis caryophyllorum, origani, serpilli, rosmarini, absinthii, et balsamo Peruuiano, admixtum. Nec inutiles sunt suffitiones (1072), et si hae laneis pannis exceptae infricantur. Dolenti parti adinouendae sunt cucurbitulae. In his vero infirmorum membrorum cura-

tionibus diu perseverandum esse, apparere cuilibet potest.

§. 1117.

Grauib. inflammationibus exposita sunt luxae (1109), quae quandoque ab ictu, casuue, excitantur, quandoque autem ab osse moto, quo venae comprimuntur (1101). Scire hoc possunt, qui grandium venarum per membra procedentium sedes perspectas habent. Etiam aliud eius rei indicium est. Si a maiori vi expulsum fuit, et inflammatio a vexata cute, carnibusque orta fuit, ea maxima illa parte consistit, quae ictum exceperat, si autem venae premuntur, illa tumescit extremum membrum et inflammatio incrementum et versus articulum procedit. In priori casu, si inflammatio a vi extrinsecus illata orta est, eaque vehemens articulum occupat, ille laceffendus non est, sed oportet prius eam leuare, et ob id sanguinem mittere ac quietem imperare, et imponere, quibus tumor dolorque tolluntur (79. 80. 81. 1115). Si etiam febris accessit, huic idoneis medicamentis et abstinentia occurrendum est. Inflammatione se remittente, vena finita, os reponitur. Vbi autem inflammatio osse moti venasque comprimentis vitio orta fuit, oportet festinare, et os quam primum in locum, unde illic lapsus est, restituere. Si vero, reposito osse, nihil minus tumor et inflammatio manent, timeri debet gangraena, quod rupta est arteria, vel vena, quae sanguinem fundit *.

* Hoc aliquando curantis, et brachium nimium extendentis culpa factum esse, noui (423).

§. 1118.

Si corpus valens est, idque sanguine tumet, requiritur, ut, reposito osse, sanguis mittatur. Si febris accedit, illam causae aestimatio, cui accommodanda auxilia sunt, soluere potest. Si febris cum dolore incrementum

crescit, interdum pus oritur, abscessus fit, qui, cum articulum eiusque ligamenta afficere possit, praecipue, si suppuratio altius condita est, etiam crudus, et non expectata maturitate, incidi debet (96. 993).

§. 1119.

Multo grauius est, si ossi luxato etiam fractura accessit. In hoc casu opera danda est, vt prius emotus articulus, post vero ossis fragmenta, in suas sedes reponantur. Maioribus periculis membrum expositum est, si os prope articulum, qui excidit, fractum fuit. Os enim tractari et satis extendi nequit. In hoc casu fracta inter se committenda sunt, expectandumque, donec ea callus firmauerit. Tunc tentandum est, an etiam diducta ossa rursus inter se iungi possint. Interea, ne rigor articulo accedat, is calida aqua oleoque foueri potest. Hoc, si vetus res est, raro feliciter cedit (1109).

† Nisi caput ossis cum vicino osse concreuerit, sed si causa difficilioris repositionis in musculorum, tendinum et ligamentorum contractione posita est, curatio et reductio capitis elapsi interdum fieri potest, posteaquam partium illarum contractio fomentis, balneis, inunctione satis imminuta est. Casum singularem vid. in *Monum. Acad. Chir. T. V.*

§. 1120.

Caput super ceruicem continetur duobus processibus depressioribus, vel condylis, qui ad latus foraminis magni positi sunt, per quod in occipite spinae medulla cerebro commissa descendit. Hi condyli oblongi, cartilagine molliti, parte media gibbi, et linea transversa diuisi, oblique in anteriorem partem inclinati, dum versus anteriora procedunt, sibi appropinquantur. Pars illorum anterior elatior est et paulo amplior, pars posterior depressa et angustior. In his tamen et aliis nihil perpetuum esse, deprehendo. Hi condyli excipiuntur duobus oblongis, etiam obliquis, et

media transuersa linea diuisis, sinibus, qui sunt in
 superioribus processibus obliquis, vel articularibus, ver-
 tebrae primae. Sinus illi modo descriptis condyli-
 quos excipiunt, respondent. Quare etiam processus
 articulares superiores, qui illos sinus habent, in parte
 posteriori extantiores sunt, in parte media plurimum
 depressi et sinuati, in parte anteriori minus desident:
 caeteroquin interiora versus oblique inclinati. Et
 articulus, ea, tum occipitis condyli, tum vertebrae
 articulares processus, continentur ligamentis validis
 qui eos, manticularum in modum, comprehendunt
 (1096). Id, ne saepius dicendum sit, omnibus,
 vertebrarum etiam, articulis commune est. Alia lig-
 amenta sunt, quae ab occipite incipiunt, et summum
 extantiorique orae primae vertebrae inferuntur. Et
 iam valida membrana est, quae intus in vertebrae
 peruiis ab occipite ad os sacrum usque cum spin-
 medulla deducitur. Hac enim, et medulla conteg-
 tur, et ossa, quibus adhaeret, continentur. Nec omi-
 tenda est membrana, ligamento similis, qua anterior
 vertebrae omnes earumque corpora conteguntur. Hi
 articulus sustinet caput, idque flecti, non vero in li-
 tera moueri, finit.

§. 1121.

Prima ceruicis vertebra, quam Atlantem vocant,
 deorsum versus etiam exigit duos minores processus
 articulares. Hi parum desidentes sinus habent, vel
 plana obliqua, quae ab interiori parte versus exteriora
 et inferiora porriguntur. His respondent alia plana
 paululum gibba, quae sunt in alterius vertebrae pro-
 cessibus articularibus superioribus, quae oblique ex-
 teriora versus inclinantur. Inter cartilagineas, quibus
 harum vertebrarum extremi processus molliti sunt, in-
 terdum aliae distinctae et in medio positae minores
 repe-

reperiuntur (1098). Ex hoc articulo facilis vertici mobilitas in vtrumque latus est.

§. 1122.

Quo vero ceruix melius inter varios motus flexusque caput sustinere posset, ex anteriori et pleniori alterius vertebrae parte confurgit maior, crassior et procerus processus, quem dentiformem, vel odontoideum, vocant, quia nonnullis dentem repraesentare visus est. Is valido ligamento, quod ex eius summo apice educitur, super occiput huiusque processum sphenoideum extremamque et anteriorem oram maioris foraminis illigatur. Vertebrae autem prioris et supremae anterior pars quasi excisa est et sinuata, etiam cartilagine mollita, quae hunc processum odontoideum molli cartilagine quoque laeuigatum e latere recipit. Hic vero processus valido ligamento constringitur, quod post hunc processum transversum in prima vertebra ex vna laterali parte in alteram porrigitur (1092 ***).

† Istorum aliorumque ligamentorum descriptionem pleniorrem et accuratiorrem vid. in *Syndesmologia* a IOSIA WEIDBRECHTIO Petropoli edita, aut in gallice versa epitome eiusdem libri Parisiis in lucem 1752 emissâ, aut in huius versione teutonica Argentorati 1779 euulgata.

§. 1123.

Caput igitur per articulum, qui inter occiput et primam vertebrae est, leuatur et inclinatur, per articulum, qui inter primam et secundam vertebrae est, in latus vertitur. Quo minus occiput a prima vertebra recedat, prohibent processus ille odontoideus eiusque ligamenta, quae ex genere valentiorum sunt, et quae caput ultra prolabi non patiuntur. Caput igitur si luxatur, inter se recedunt prima secundaque vertebra, in quo articulo maior mobilitas est. Hoc incidere potest, si ligamenta sub occipitio maiori vi

extenduntur, et eodem temporis momento caput
latus mouetur. Haud crediderim, huius rei aliquam
curationem esse, cum sub tali motu spinæ medulla
comprimatur, qua compressa omnes nervi, qui a ca-
vice descendunt, resoluuntur*.

* PETITVS c. l. T. I. p. 66. historiam prodidit de pue-
rum quem vir, prehensio duabus manibus capite, in altum
stulerat. Cum puer reniteretur, et corpus in aere suspen-
sum multum agitare, vertebrae inter se diductae atque
emotae fuerunt, et puer momento extinctus fuit. Aliquam
medendi rationem proposuerunt PETITVS, alique, nullam
verò huius rei curationem esse, ex ea ipsa illius historia
colligitur. Vertebrae, quintam sextamque, vehementer
ictu inter se dehiscences, et spinalem medullam per tra-
versum disruptam in cadavere viderunt Autores Selecti
Medicorum Francofurtensium. Homo adhuc ad de-
cem tertiam horam post acceptum ictum vixisse dici-
tur Vol. I. Obs. 2.

† Vertebrae ceruicalium luxationem in milite gregari-
um vidit atque etiam curauit SELLING Chirurgus castrensium
exercitibus Borussiae. Siue autem luxatio, siue subluxatio
siue distorsio ea fuerit, grauissima tamen symptomata
cum instantis mortis incusserunt. Depressis humeris caput
attolli a valido ministro iussit, manibus suis emotas vertebrae
in pristina loca reddidit, ac postea caput fascia firmavit;
reliqua vid. in SCHMUCKER *Vermischten Schrift.*
T. I. pag. 284.

§. 1124.

Cervicem distorqueri, et caput obstipum vitium
musculorum cutisque fieri, iam alii animaduenerunt.
Si cutis ambusta est, et cum hac platysmamyodotomus
musculus, et mala cicatrix caput obstipum reddit, adhibenda
sunt fomenta (226), vel cutis incidenda est.
Tunc plaga diduci, et in eam plumbea lamina imponenda
debet, quo cicatrix latior atque locum implens nascatur
(581). Si vero musculus mastoideus rigidus contractusque
factus est, nonnulli tendinem illius musculi praecidere ausi
sunt, qui caput protinus erectum vulnusque sine noxa
glutinatum, fuisse prodiderunt**. Minus ardua est curatio,
si unus musculorum mastoideorum

deorum resolutus est, et ob id alter adducitur. Quia vero musculo mastoideo dextro caput in sinistram partem, sinistro autem illud in dextram, mouetur, musculus resolutus est in illo latere, in quod caput inclinatur. Huic musculo adhibenda sunt remedia, quae membris resolutis idonea sunt, infriktiones supra propositae (1072. 1115. 1119). Prodest etiam, torpentis musculi summam cutim exasperare, impositis cantharidibus, vel admoto sinapi, aliisque acrioribus. Maxime necessaria est fascia, qua pedetentim caput relucitur ***. Id, quod vero mastoideis incidit, eueire etiam potest aliis musculis, spleniis, complexis, ectis, caeterisque, quibus caput continetur ****.

* Vid. BOOTH Obs. de Affectibus omissis C. V. p. 14.

** Vid. hanc Obseru. in TVLPIO L. IV. C. 58. p. 371. in MEEKREN Obs. 33. p. 136. c. fig. et ROONHVYSEN Obs. 22.

† Caput ab musculo sternomastoideo contracto obstipum sanauit, TENHAAF, Belga, in focmina annum vicesimum agentc. Morbus iam vetustate confirmatus fuit et caput ad humeri summitatem detractum. Secta cute chirurgus specillum sub musculi eius tendine dedit, atque haud procul ab osse sterni tendinem eum dissecuit, et impleto linteis vulnere, caput postea fascia idonea tenuit firmavitque. Elapsis diebus quasi viginti curatio absoluta est et capiti necessaria mobilitas reddita. Vid. *Acta Societatis Harlemensis* vel epitomen quae inscripta est: *Abhandlungen etc. aus den Schriften der Harlemer etc. Gesellschaften.* Leipzig 1775.

*** Huius curationis exemplum nobis proposuit Cel. WINSLOVIVS in Quaestione medica: An in cognoscendis morbis errores functos vitare possit Anatomes parum duntaxat gnarus, Lutetiae, Anno MDCCXXXII. proposita §. 3. et in Comment. A. R. Sc. Anno MDCCXXXV. p. 409. in quibus vide etiam figuram fasciae.

**** Confer. Dissert. Celeb. MAVCHARTI de Capite obstipo, Tubing. MDCCXXXVII.

§. 1125.

Maxilla inferior habet duos processus, seu condylos superiores, latos, in anteriora oblique inclinatos, qui

qui subire videntur illos sinus, qui in osse temporali iuxta auris foramina sunt. Committuntur vero tundi condyli cum processibus transuersis, qui in parte anteriori ossium temporum sunt, ubi ossa iugalia impingunt. Inter illos condylos et modo commemoratos sinus media cartilago * est (1098). Articulum comprehendit ligamentum valens, seu mantacula, quae illo ossis temporum sinueducta mediae cartilaginis arctius inhaerescit, et tandem condylum maxillae comprehendit. Ligamenta fere duo esse videntur. Illud quod cartilaginem ossi temporum adstringit, laxum magis vero adstrictum, quod e cartilagine descendit et condylum comprehendit. Haec res efficit, dum aperto ore maxilla deprimitur, haec cartilago condylo iuncta, super illum transuersum processum ossis iugalis moueatur et maior mobilitas articuli praestetur. Huic articulo in posteriori parte annexa est glandula (1099), quae in parotidem fere implicata axungiam fundit. Maxillam utriusque validis musculis, crotaphite, massetere, et duobus pterygoideis adduci et contineri, notum est. Musculi pterygoidei externi portio illi ligamento atque mediae articuli cartilagini innexa est **.

* Vid. fig. in MORGAGNI Aduers. II. fig. 1. 2. 3.

** Vide accuratam huius articuli descriptionem a CLAUDIO MONRO proditam in *the Medical Essays* Vol. I. Obs. 1. p. 131. et Vol. III. Obs. XIII. p. 261.

§. 1126.

Maxilla non in aliam, quam priorem, parte propellitur, id quod incidit, dum eius condyli super illum transuersum ossis iugalis processum promouentur. Nam in posteriorem et dextram sinistramque partem excidere non potest, quia oppositi sunt processus mastoidei et styloidei. Nec, vel propter illos ipsos maxillae condylos, ea in latus moueri potest.

† Mandibulam in partem posteriorem sede sua moueri posse quamuis dubites, tamen et hanc luxationis rationem aliquando locum habere docuit ZACHARIAS VOGEL Medicus apud Lubecenses inclytus, in *anatomischen, chirurgischen und medicinischen Beobachtungen*, Rostochii 1659 editis pag. 217. vbi lectoribus Auctor est suaeque, vt, cum os tali casu clausum sit, anteaquam reductionem periclitentur, emollientia medicamina articulis admoueant, per quae molliantur relaxenturque ligamenta.

§. 1127.

Si maxilla vtraque parte ex sede sua excidit, totum mentum inclinatur, et in anteriorem partem promouetur. Si vero vna parte procidit, illud semper in contrariam partem inclinatur et dentes paribus non respondent, sed sub his, qui secant, canini sunt. Os in vtroque casu hiat, et claudi nequit, ex quo multa alia effertur. Homo, nec loqui, nec mandere, et non deglutire, potest. Prolapsae enim maxillae anteriores coronoidi processus, quibus muscoli crotaphides innexi sunt, sub ossibus iugalibus conduntur, et prohibent, quo minus maxilla attolli queat.

§. 1128.

Maxilla e sede sua propelli non potest, nisi aperto ianteque ore, et si illo tempore ei ictus infertur. Rarum non est, maxillam excidere sub oscitatione, magnoque et soluto risu, id quod iis euenire solet, quibus ligamenta imbecilla sunt.

§. 1129.

Si maxilla in sedem suam compellenda est, homo collocari debet in sedili, sic, vt minister caput eius a posteriore parte contineat, vel, vt is iuxta parietem sedeat, subiecto inter parietem et caput eius scorteo puluino duro. Caput eo vrgendum est, quo sit immobilius. Tum chirurgus digitos, pollices linteolis, vel fasciis, inuolutos, in os, super dentes posteriores mola-

molares conuicit, et caeteros digitos, ipsamque manum, extrinsecus ita mento admouet, ut mentum maxillamque vehementer apprehendat. Digitis indemissis maxillam deprimit, palma vero eam eodem momento, quo depressa fuit, retro agit. Si vna parte illa prorupit, difficilius reponitur. Nisi ea parte, qua excidit, maxilla deprimenda, olque vero ex opposita parte mentum apprehendendum et sic illa retro agenda est.

§. 1130.

Sunt, qui, ut maxillam in sedem suam compellant homini colaphum ducunt, alii bacillum durum indentes demittunt, quo, veluti veste, maxillam deprimunt; quas curationes grauiores offensae saepe quuntur. Vbi maxilla in sedem suam collocata et fascia iniici potest, vel longior habena, utrinque longitudinem ad medium fere incisa, cuius medium completur, caput vero duo hominis caput; reliqua duo super ceruicem, et ab hac super frontem, adducta, ibi ligantur. Alibi hanc fasciam fundam nominaui (13. **).

† Ossis hyoidei subluxationem quandam interdum fieri docet PETRVS, PAVLVS MOLINELLIVS in *Commentar. Bononiens.* Vol. V. P. II. Morbi huius parum cogniti mentio vix quoquam praeter Valsalvam facta est. Quamuis leuior videri cuiuspiam possit, dolor et spasmus tamen ita urgent ut vel vita in discrimen adduci possit. Homo quem MOLINELLIVS curauit, continuis moliminibus ad deglutendum compulsus, deglutire tamen non potuit. Vir inclutus hyoideum os antrorsum compulsi, cum id digitis suis tum in os datis, tum extrinsecus admotis prehenderet, anterior versus duceret.

§. 1131.

Ceruicis et dorsi ac lumborum vertebrae diuiduntur in partem anteriorem ac plenior, quam corpus vocant, et in processus, quorum quaelibet vertebrae (si supremam et alteram ceruicis, de quibus dictum

(1120) est, excipias), septem habet. Sunt enim quatuor obliqui, vel articulares, duo transversi, et vnus postremus, cui a spina nomen est. Articularium duo sursum, duo deorsum, spectant. Hae articulares apophyses inter se committuntur structura quadam, ita, vt altera alterius planities sit. Si spinam a parte posteriori contueamur, deorsum spectantes superioris vertebrae processus feruntur super processus articulares ex inferiori vertebra consurgentes. Horum processuum extrema planities cartilagine mollita in cervicis vertebra oblique inclinata est. In vertebra dorsi autem et lumborum ea planities recta sursum et deorsum spectat, et anterior posteriori aduersa est. In vertebra lumborum hi articuli fere e latere positi, et sursum spectantes processus sinuati sunt, qui accipiunt deorsum spectantes processus superioris vertebrae. infimae vertebrae lumborum processus inferiores inhaerent aliis sinuatis, qui ex osse sacro excrescunt.

§. 1132.

Multis validisque ligamentis vertebrae continentur. Durum et cartilaginofum est elasticum et flexile, quo vertebrarum corpora constringuntur. Constat ex pluribus in orbem ductis mollioribus et flexilibus cartilaginibus, quarum exteriores ampliori circuitu internas minores comprehendunt. Haec corpora etiam aliis pluribus breuioribus ligamentis continentur, quae se in speciem literae X decussant, ab infima ac extantiori ora supremae vertebrae incipiunt, super nodo commemoratum ligamentum cartilaginofum oblique feruntur, et orae supremae infra sitae vertebrae illigantur. Haec ligamenta comprehenduntur illo, quo vertebrarum corpora contegi dixi (1120). Accedit illud, quod intus in vertebra peruiis cum spinae medulla deducitur (1120). Cum hoc cohaeret aliud.

aliud, quod per caua in posteriori spina inter vertebrae relictæ processus spinosos eorumque bases in se connectit. Processus articulares ad similitudinem aliarum, quæ in articulis sunt, comprehendunt m. t. t. t. t. (1090. 1120). Alia ligamenta sunt inter processus spinosos, alia inter processus transuersos, quæ musculis potissimum sedem præstare videntur. Si quaedam inter processuum spinosorum extrema, quæ si homo ad necessaria opera curuatur, eum ultra prælabi haud patiuntur.

Vid. WINSLOW *des Os frais* §. 314.

§. 1133.

Costae, et contra vertebrarum corpora, et contra earum processus transuersos, sitae, prima sua parte rotundae et leniter quasi capitulatae sunt. Haec capitula duo minora plana habent, quæ committuntur cum aliis minoribus parum extantibus tuberculis, etiam depressis, planis, vel leuiter sinuatis, et in cartilaginem, quæ in parte posteriori et extrema duarum super se positarum vertebrarum harumque corporum conspiciuntur. Est tamen discrimen. Nam prior et duarum vltimarum spuriarum costarum capitula non cum duabus vertebris, sed vna saltem eiusque corpore, committuntur. Et hi articuli suis ligamentis comprehenduntur. Prope costarum capitula etiam minores glandulae, quæ axungiam dant, reperiuntur (1099).

§. 1134.

Costae vero tuberculis aliis, inhaerent transuersis processibus paululum sinuatis vertebrarum inferiorum et validis ligamentis connectuntur. Duo vltimae costae spuriae non cum illis processibus committuntur, sed, ab his disiunctae, solis ligamentis continentur. Spina igitur ex pluribus ossibus composita est

ita aptata, vt homo et rectus infistere et ad necessaria opera possit curuari. In latus etiam aliquantum inflecti potest, non vero motu supino curuari. Gesticulatores hanc corporis habilitatem consequuntur multa exercitatione, qua ligamenta, praecipue illa cartilaginosa, in flexilibus puerorum corporibus tantum infirma reddunt atque laxant extenduntque.

§. 1135.

Raro vertebrae excidunt. Nam propter illa valissima cartilaginosa ligamenta, quibus mediis corpora larum constricta sunt (1132), inter se recedere haud ueunt. Nec id potest fieri, nisi medulla, quae per mediam spinam fertur, compressa, ruptaue. Hoc si incidit, partes inferiores, ad quas nerui ex medulla educi pertinent, resoluuntur, aluus et vrina supprimuntur, et tandem sine voluntate prorumpunt, homo vero intra paucos dies moritur.

§. 1136.

Interdum tamen, manentibus vertebrarum corporibus, earum articulares processus suis sedibus ita excidunt, vt processus, qui ex inferiori vertebra confurcunt, posteriora versus moueantur, et super processus eorsum spectantes superioris vertebrae efferantur. Hoc incidere solet in vertebris inferioribus dorsi et lumborum, si homo eo tempore, quo is magno flexu pronum, vel in latus, datur, ictu vehementiori constititur. Et quidem processus illi in vtraque parte excidunt, si is pronus fuit, in vna, et semper contraria arte, si is fuit in latus inclinatus. Plerumque non una, sed etiam altera, et plures vertebrae sic elabuntur.

† Grauem casum, vbi infima dorsalis vertebra a prima lumbari dimota fuit, vide in SCHMUCKER *Vermischten chirurgischen Schriften*. Vol. I. p. 286. Hominem illum restitutum esse mirum est. Dorsalis enim vertebra ab lumbari trium

digitorum latorum spatio dimota dicitur. Quanta tum
dullae spinalis compressio!

§. 1137.

Huius rei indicium est, si homo, qui inclinatus
ictum accepit, erectus esse nequit, sed, vel in anter-
ra, vel in latus, nititur. Prius incidit, si processus
articulares vtrique exciderunt, in latus vero inclinatus
est, si id in vno latere euenit. Cum his dolor est, et
paululum leuatur, si homo in primum datus caput
quantum potest, attollit. Fere facilius articuli illi
ponuntur, si vtraque parte exciderunt, quam si vna.

§. 1138.

Falsa veterum opinio fuit, vertebrae ex toto inte-
se diduci, et ex toto etiam restitui posse. Quare etiam
superuacua sunt omnia genera machinamentorum
quae ad extendendam spinam vertebraeque compelles-
das repperunt. Hominem primum super scamnum
collocauerunt, et altera habena pectus circumdece-
runt, altera lumbos. Vtramque habenam in diuersas
adduxerunt, quas, ut valentius spinam intendere po-
sent, etiam ad valida bacula deligauerunt, quorum im-
partes oppositae morae obiecerunt. Alii etiam habena-
rum capita ad axes vtrique in extremo scamno po-
sitas deligauerunt, et hos torcularibus conuerterunt.
Ligamentis, ut opinati sunt, satis extensis, ii iusserunt
ministram super spinam hominis consistere et cal-
vertebram in exteriorem partem prolapsam intus im-
pellere. Alii, homini insidentes, suis natibus, vel etiam
assere in transversum posito et vtrique compressis
vertebrae retro agere voluerunt. Verum enim verum
id frustra est, cum sic articulares processus haud sati-
inter se diduci et prius fere omnia ligamenta, si qui
in hac ligamentorum ac musculorum intentione per-
ferauerit, rumpi, vertebrae quoque spinosi proces-
sus frangi queant.

* Vide Figuram in CHARTERII Edit. HIPPOCR. T. XII. p. 38. Tab. IV.

§. 1139.

Ergo, vbi processus articulares exciderunt, illi inter se commode diducuntur, si homo super rotundum aliquod dolium, subiecto prius puluino, pronus collocatur, et a ministris, tum eius pectus, tum nates, deprimuntur atque vrgentur. Vbi sic satis inter se recesserunt articuli, illi modico corporis flexu, dum homo iterum erigitur, restituantur, si ex vna demum parte articulus distractus fuit, ita, vt homo, non tam pronus, quam in contrarium latus, inclinatus sit, is etiam in id latus, in quod is nititur, oblique dandus est. Restitutis in sedem suam articulis, medicamentis iisdem opus est, quae imbecillis ligamentis conuenire, supra dixi (1115). Iniicitur fascia, quae vix non omnibus noxis, quae in pectore ac imo ventre sunt, communis est, quae dicitur mantile cum suspensorio (693. 700).

§. 1140.

In spina etiam interdum ligamenta valentius intenduntur, quamuis vertebrae et earum etiam articulares processus loco suo maneant. Hoc euenire potest pueris, si horum imbecilla corpuscula sub vario motu flexuque concutiuntur, et adultis, si illi graui opere funguntur, grande pondus sub vario corporis flexu tollunt, mouent, feruntque, vel inflexi totius corporis nisu in aliquid incumbunt. His dolor exoritur, qui a tergo ad praecordia tendit, et quia cum peritoneo etiam transuersum septum afficitur, superuenire potest imbecillitas, nausea et crebrior vomitio. Vulgus existimat, aliquid in spina esse emotum, et id, quod elapsum esse putant, varia ratione, vt restituant, enituntur. Si homo adultus est, eum in pauimento, vel sedicula, suum vero genu contra eius tergum collocant,

infantibus, si eos sub partu per obstetricias manus rigi, quandoque replicari et manibus educi oportet. Etiam nutrices illud efficiunt, si pueros labantes et alto cadentes manibus violenter inuadunt apprehenduntque, et artus, praecipue spinam, violenter adducunt atque intorquent. Pueri etiam in ludis, variisque corporis exercitationibus, luctatione inprimis, si humi prosternuntur, vel de alto praecipitantur, et aliisque, membrorum prauitatibus obnoxii redduntur.

§. 1144.

Experientia vero in ipsis his curationibus docet longe frequentius pueros gibberosos fieri, si eorum corpus sub variis exercitationibus continenter multumque in aliquam partem flectitur. Id et iam accidereteneris a foeminis alitis, quae iis non nisi vnam mammam dare possunt. Nam his necessitas est, obliqua corpore, crebrius vni lateri incumbant. Etiam infantibus id euenire solet, qui non alternis, sed vtroque brachio gestantur et gerularum lateri valde multumque apprimuntur, quare, et spina flectitur, et omoplata etiam proicitur. Id quoque experiuntur pueri, qui seculis suis adfixi, qui corpus multum et semper in vnum latus inflectunt, in alterum vero, quod imparies est, flectere non possunt. Nec non pueri in ludis literariis scriptitantes, si tabulas, vel alteri generi vel etiam elatiori mensae, imponunt. Puellae, quae pannum tendicula diductum acu pingunt, et obstigunt capite altero humero cum omoplata demisso, altero elato porrectoque, sedent. Baiuli et geruli, qui meces ex ceruice pendentes venum exponunt et his onus per vias et compita errant, ut alios taceam. Nam et his et pluribus occasionibus, inualecente tandem assuetudine, spina, omoplatae humerique, imo etiam quandoque coxae, a naturali sua sede et habitu recedunt, atque illarum membrorum prauitates nascuntur.

* Aetate prouectiore homines gibberosos fieri commemoratis calibus ostendit PORTAL in *Monum. Acad. Sc. Paris. A. 1772. Parte II.*

§. 1145.

At enim non parum confert corporis habitus. De pueris rhachitide laborantibus iam supra (1067. 1070) retuli. Etiam ostendi, musculorum vitio ossa inclinari posse, id quod accidit, si illi vna parte rigidi sunt et adducti, altera resoluti (1070. 1124) *. HIPPOCRATES animaduertit, pueros ex asthmate et tussi, nec non ex tuberculis iuxta pulmones ortis **, gibberosos fieri, id quod accidit, si mala morbi cuiusdam materia per *μετάσασιν*, non tam in pulmones, quam in pleuram, et, quibus vertebrae inter se continentur, ligamenta, fuit inclinata. Haec enim a coeunte mala materia, et, si ex hac tubercula nascuntur, multum adducuntur, ita, vt iis tenerior spina inflectatur ***.

* Confer Obs. de GOVEY P. II. p. 165.

** Sect. VI. Aphor. 46. et de Articulis Sect. XXXVII. T. II. p. 794. cum quo confer GALENI Commentarium, SEVERINVM de Abscessibus Lib. VI. meamque Diss. de Thoracibus, Lipsiae Anno MDCCXXXV. Possideo sceletum pueri duorum circiter annorum, in cuius spina *κύφωσις* est. Ea vero vertebra, quae in posteriora potissimum proiecta fuit, intus carie exesa est.

*** Commemorabilis est historia Celeberr. CHICOYNEAV de puella gibberosa, cuius spina fere ad naturalem positum rediit post superatam febrem et plures deiectiones purulentas. H. A. R. Sc. MDCCXXXI. p. 724. conf. Dissert. de Thoracibus.

§. 1146.

Haec vitia non, nisi in pueris, nascuntur, atque etiam in his solis, et inter initia curationem recipiunt. Primum vero oportet diligentius considerare illas iam propositas aliasque occasiones, ex quibus illa orta fuere, a quibus etiam medendi via trahenda est. Si enim intus tubercula sunt, vel, si corporis habitus

corruptus est, raro illa emendantur. Summa in omnibus moderatio adhibenda est, cum nihil magis perniciosum sit, quam festinatio, et, si, qui curaturi sunt, adhibita maiori vi, rigidis, imo ferreis etiam, loricis ossa, quae extant, ut retro cogant, valentius et continuo premunt. Si enim his austeris curationibus pueri excarnificantur, viscera abdominis et ligamenta premuntur, quare alii mali, imo interdum funes morbi nascuntur. Et quia, tum omne corpus, tum ligamenta, magis infirmantur, saepe membrorum prauitates propter hanc malam curationem incrementum accipiunt *.

* Haec medendi ratio tanto magis pestifera est, si tales etiam totum pectus et abdomen quotidie multo oleo pingui materia perungunt, qua re omnis humor per cutem exitus solitus coercetur. Vidi adolescentulum, cui, cum sic per plures menses curatus esset, tandem digitorum ossa incrementum accipiunt.

§. 1147.

Igitur pueri et adolescentuli, quibus spina aliqua parte eminent, aminciendi sunt thoracibus, non nimis duris et rigidis, nec ferreis, sed, qui ex balaenariis virgis sibi affutis struuntur et corpori recte accommodantur. Illi ita aptari debent, ut altius ascendant in pectus, omoplatas, et summos etiam humeros, comprehendant. Etiam thoracibus recte et maiori diligentia aptari debent analeptides, ex corio, vel ex illa materia, quae ex lanis pilisque coactis parari solet, quibus paulo durioribus extantiora ossicula paululum premuntur. In tenellis corporibus magis commodum est fascia, qua totum pectus continetur *. Interdum corpus sic semper amictum, vel fascia inuolutum naturaliter incrementum accipit, illae membrorum prauitates penitus tolluntur, vel multum emendantur.

* Dicitur haec Cataphraxis, vel aliis, Quadriga. Fascia in duo capita glomerata media iniicitur sub ala. Capita fascia caput humeri illius lateris comprehendunt et per pectus atque

atque scapulas ad alteram alam tendunt, super hanc quoque feruntur, quam comprehendunt et per pectus atque scapulas reuertunt. Si id necessarium videtur, adhuc aliquoties ad eandem rationem fascia per asciam sursum serpendo cicumagi potest. Vbi vero tandem iterum capita sub alam, cui prius iniecta fuerat, venerunt, ea circa totum corpus deorsum versus, quasi in cochleam, serpendo feruntur, ita, vt pectus atque abdomen inuoluant, in quo ultimo tandem capita finiuntur et acu sistuntur. Huic fasciae etiam subiici ossibusque prominentibus superdari debent panni, vel analectides, quibus ossa pedetentim retro coguntur.

§. 1148.

Parum tamen haec omnia proficere solent, nisi etiam harum valetudinum causa finiatur. Morbis, qui in toto corpore consistunt, veluti rhachitidi, et aliis, ex quibus illa membrorum ligamentorumque imbecillitas enata fuit, idoneis medicamentis, salubri victu, et moderata ac ipsi morbo accommodata exercitatione, medendum est. Praecipue vero opus est diligenti atque assidua obseruatione, vt, vel ab adolescentulis, quibus hoc imperari potest, vel etiam vi adhibita, corpus membraque in contrariam partem, et contra malam consuetudinem, inclinentur. Quia etiam prae omnibus scapulae considerandae sunt (1142) pueri, inter ambulandum illa manu, qua humerus depressior est, inniti debent altiori baculo, altera vero, qua humerus elatior extat, ferre pondera. Si scapulae nimis a costis recesserunt, illae iniecta fascia, qua vtrunque humeri capita comprehenduntur, commode retro aguntur. Scapula quoque cum humero deprimitur, si pondera ex eo suspensa gestantur. Quae medicamenta musculis ac ligamentis, tum rigidis, tum resolutis et imbecillis, admoueri debeant, alibi exposui (1072. 1115).

† Multa salutaria ad deformitates leuiores et incipientes corrigendas proposuit ANDRY in libro, quem inscripsit: *Orthopedie*. Artificiosum thoracem descripsit LE VACHER

in Vol. IV. *Monument. Acad. Chir.* Cuius usus mul-
 opem attulisse dicitur. Paulo magis compositum est macl-
 namentum, quam quod commode a nobis iam descri-
 possit. Ipsius autem effectus in eo cernitur, quod spin-
 totius extensionem efficit, h. e. id effectum dat, quod :
 vitia spinæ minuenda et tollenda maxime necessarium est.
 Id ipsum alii eo consequi se posse sperant, quando pu-
 curandus commoda fascia capiti applicata per breue ter-
 pus suspenditur, sed quotidie iterum iterumque ac saepius.
 Nisi puer valde imbecillus est, prodesse quoque ea suspensi-
 corporis potest, quæ sit, si is manibus suis aliquid apprehendit
 alius positum, sic ut pedes pavimentum contingere
 nequeant. Praeterea puer decumbat in lectulo angustior
 non molliter sed sic strato, ut corporis positus horizonti
 parallelus fere sit, minimeque id flectatur. A compressio-
 ne, quam in locis eminentioribus faciunt thoraces, no-
 modo nihil boni expectari potest, verum mali non parum.
 Et enim nisi thoraces satis arcte constringantur, non sedent
 sed vacillant, suntque homunculis illis impedimento in
 variis corporis motionibus. Constricti vero, quod satis sit
 thoraces comprimunt musculos eorumque actiones cohi-
 bent, quò sit, ut robore augeri non possint. At vero
 musculorum robore erectio trunci efficitur potissimum.
 Arctiores thoraces praeterea os sterni et costas premunt
 atque harum praecipue figuram mutant, et pectoris caui-
 tatem angustiorē reddunt. Perit etiam musculorum ab-
 dominalium mobilitas ipsorumque interaneorum. Multis
 igitur modis actiones naturales vitalesque impediuntur.
 Neque a ferrea cruce expectari auxilium posse opinor.

§. 1149.

Costae longe frequentius franguntur, quam e sede
 sua mouentur. Non possunt in exteriorem partem
 excidere, cum oppositi processus transversi vertebra-
 rum summam illarum partem contineant. Nec facile
 sursum, vel deorsum versus, promoueri possunt. Igitur,
 si mouentur, in interiorem partem propelluntur,
 quam rem, cum pleura prematur, grauis inflammatio
 et spirandi difficultas sequitur.

§. 1150.

Si in superiorem, vel inferiorem, partem costae
 exciderunt, imperandum est homini, ut illud brachium,
 quod

quod super eas costas est, quantum potest, attollat, et interea costae in sedes suas chirurgi digitis compelluntur. Vbi autem costae in interiorem partem elapsae fuerunt, casus asperior est. Homo ea ratione, qua supra de emotis processibus transversis vertebrarum proposui, super rotundum dolium in latus contrarium collocatur inclinaturque, ut costae reuertant. Plurimum iuuat, si manu aliquantum comprimitur sternum. Quod si vero hac ratione costae reduci non possunt, necesse est, ut super summam costarum emotarum et huius supremam oram plaga fiat, et ut demisso in hanc digito costae in suam sedem restituantur. Quae vero ad sanguinis missionem et abstinentiam attinent, seruanda sunt eadem, quae seruari oportet, si magnae inflammationis periculum est. Alii incisa cute terebram in elapsam costam agunt. Hoc vero genus curationis variis asperioribus casibus patere, facile intelligitur.

† In *Vol. IV. Monument. Acad. Chir.* exstat dissertatio de luxatione costarum Auct. BVTET, in qua et PLATNERI et aliorum priorum opiniones de hac re ad examen reuocantur. Luxationes sursum deorsumue fieri posse A. negat. Ad interiora costas mobiliore sede sua dimoueri posse ait quidem, sed tamen ita dimoueri negat, ut incisio carni-um et costae retractio digitis ferramentisque faciendam necessaria fiat. Casum quendam refert, ubi costa sexta introrsum dimota videretur: Nihil aliud sanandi causa molitus est, quam idoneam deligandi rationem. Splenia duo, admodum crassa adhibuit, alterum quidem anteriori costae extremitate, alterum in regione apophysium transversorum vertebrarum lateris sani, atque haec firmavit fascia, quae quadriga vocatur. Verum lege Auctorem ipsum, pag. 590.

§. 1151.

Os coccygis cartilago, qua media id cum osse sacro committitur, et valida ligamenta continent. Praeter ea ligamenta, quibus id cum osse sacro connectitur, id deligatur alio, quod sacro ischiadicum minus

minus appellant anatomici *. Etiam intestino re
eiusque sphincteri aliisque musculis inhaerescit.

* Vid. WINSLOW *des os frais*. §. III.

§. 1152.

Id e sede sua promouetur, si valenter premitur
rupta media cartilagine a sacro diducitur. In prior
partem illud propellitur, si homo, supino motu hui
prostratus, hanc partem rei alicui durae atque ext
tiori impingit. In posteriorem vero partem illud pl
rumque ab exeunte partu, vel manu obstetricis, pr
mouetur. Eius rei notae sunt dolor, qui intendit
si aeger graditur, vrinam aluumque reddit. Super
venire solet inflammatio, et pus etiam concitatu
quod quandoque intestinum rectum perrumpit. F
his abscessibus mala vlcera fistulaeque, quae interdum
hominem tollere possunt, nascuntur.

* Vid. PETIT l. c. T. I. p. 132.

§. 1153.

Os, si in posteriorem partem excidit, imposit
manu facile in sedem suam compellitur, et reconditur
Quo vero in ea contineatur, contra illud imponendi
sunt plures ac densiores gradatique panni, et hi illa
fascia adstringendi, quae in fistulae curatione (696)
necessaria est. Si vero in anteriorem partem procidit
illud digito, qui oleo perunctus sit (1006), in anum
demisso retro cogitur. Tum necesse est, vt homo
super fellam sedeat, in medio excisam, et quiescat.
Metus enim est, ne id, quod per quietem cum sacro
coire debet, motu iterum in anteriora promoueatur.

§. 1154.

Iuguli superior pars committitur cum maiori sca-
pulae processu, qui acromium vocatur, et qui ea parte
parum desidentem sinum habet. Inter cartilagines,
qui-

quibus vtrumque os mollitum est, reperiri interdum
olet alia minima media. Inferius caput iuguli plenius
est, et fere triangulum, quo id in exiguo sinu ossis
pectoralis insidet. Semper in hoc articulo cartilago
est, ab aliis, quibus ossa finiuntur, distincta, notabilis
et conspicua. Vterque articulus arthrodiæ genus est.
Iugulum, et cum acromio, et cum sterni, connectitur
validioribus ligamentis. A parte posteriori sterni, in-
ter vtriusque iuguli extremum, medium est ligamen-
tum. Etiam iugulum processui coracoidi omoplatae
insidet, et valido ligamento deligatur. Nec his ossi-
bus ea parte, qua super se mouentur, cartilagines de-
sunt. Super consistens iugulum latum scapularum os
et ipse humerus mouentur. Id enim prohibet, quo-
minus haec ossa anteriora et pectus versum promo-
ueantur.

§. 1155.

Crebrius iugulum frangitur, raro ex sede sua mo-
uetur. Hoc si quandoque incidit, id multo frequen-
tius a sterni recedit, rarissime ab acromio. Id vero
duobus modis fieri potest. Nam frequentissimum est,
iugulum in priorem partem promoueri et super ster-
num efferri, si scapula vehementiori ictu, vel casu, an-
teriora versum propellitur. Interdum tamen iuguli
inferius caput in posteriorem partem inclinatum est,
et sub pectoris osse conditum. Hoc euenire solet, si
iugulum omoplata iam in priorem partem promota est, iu-
gulum valentius feritur et deprimitur. A iugulo ve-
ro, si id in posteriorem partem conuersum et sub ster-
ni conditum est, premitur, et stomachus, et aspera
arteria.

§. 1156.

Potest tamen etiam alter iuguli articulus excidere.
Si enim os ictum excipit, eius vero infimum caput
propterea, quia scapula demissa est, non potest e loco
suo

suo propelli, iugulum nonnunquam super acromion fertur. Sub acromio vero conditur, si id ea parte, cum hoc committitur, valentius ictu aliquo deprimatur.

§. 1157.

Sine negotio reponi solet, difficilius vero repositum in sede sua contineri. Collocatur homo in decula, minister contra eius tergum collocat genu, apprehensum vtrinque supremum humerum manibus retro dat. Hac enim ratione articuli inter se diducuntur. Interea chirurgus, qui homini aduersus flexos in sedem suam restituit, et illud, vel deprimit, vel adducit.

§. 1158.

In iugulo vero ad rem potissimum pertinet, illud recte deligari atque contineri. Dissimilis enim casus etiam dissimilia quaedam requirit. Vbi iugulum a pectoris osse diductum super hoc effertur, postquam repositum est, illi eius inferiori capiti multi densique panni, et quidem duo, se ad similitudinem literae I decussantes, et alius latus, opponi debent. Humerus vero non nimis valenter in priorem partem attrahendus est. Hoc vel alia habena fit, qua humeri capitula anteriora versus aguntur, vel illa fascia, qua etiam os emotum, deligatur. Haec, si dextrum iugulum luxatum fuit, recte collocato prius humero et brachio, sub ala sinistra obuolui, per scapulas ad humeri caput ascendere, hoc comprehendere, et super emoti iuguli caput per pectus iterum sub alam sinistram reuertere, et iter ad eandem rationem per orbem, aliquoties cochleae vel asciae in modum ascendendo, circumire debet, ita, ut spicam describat. Finitur vero fascia per orbem acta in pectore. Nec minus etiam idoneum est aliud fasciae genus, quod capitalem reflexam vocant, *la Capeline*. Haec fascia in duo capita voluta, quorum id, quod

quod chirurgi dextra apprehenditur, altero minus est, i dextrum iugulum emotum fuit, sub ala sinistra incipit, fertur per pectus atque scapulas super humerum dextrum, quem amplectitur. Vbi sic iterum ad summum humerum venit, maius fasciae caput iterum sub alam sinistram fertur, interea vero minus caput super emotum claviculae caput consistit et a priori, quod per pectus agitur, sistitur. Hoc si factum est, minus caput retro datur et per summum humerum ad eiusdem lateris scapulam fertur, atque iterum ab hac per summum humerum ad iuguli caput. Interea vero, dum sic haec fascia reflectitur, ab alio ministro longius caput super scapulas pectusque ad summum humerum agitur, quod, dum sic circumit, minoris capitis plicas comprehendit atque contegit. Longius caput prius per orbem fertur, et toties etiam alterum minus caput ita retro datur, ut semper a priori penitus congregatur. Post vero utrumque caput, quasi per cochleam, descendit. Fasciae longius caput tandem utrumque humerum comprehendit, anteriora versus agit, et in pectore finitur. Si haec fascia iniicienda est, ea quae requirit, quorum alter maius, alter minus, caput mouet ac dirigit. Quaecunque fascia adhibita fuerit, ea maxime cura adhibenda est, ut totum brachium, aequam deligatur, sic inclinatum sit atque figuratum, ut postea illud vinctum aut suspensum aliter, atque vinctum deligabatur, inclinari oporteat.

§. 1159.

Quod si autem iugulum a sternum ita recessit, ut illud sub hoc conditum sit, prior fascia (1158) sub ala sinistra orsa, non per scapulas, sed per pectus, ad humeri caput ferri, et ita circumagi debet, ut utriusque humeri capita, quae comprehendit, retro dentur, et ut ala, descendendo, quasi in cochleam, serpat. Prius etiam

etiam summo iuguli capiti, quo id cum acromio committitur, densiores panni obiciendi sunt.

§. 1160.

Si quando vero iuguli supremum caput super acromium prorupit, impositis illi loco densioribus pannis humeros in priorem partem dari, et sic contineri, sciam autem deorsum ferri, oportet. Si vero iugulum ita sua sede motum est, ut id in finem, qui sub acromio est, delapsus sit, eius capiti inferiori, quod a pectoris osse est, obiciendi sunt illi densiores panni. Vtriusque autem humeri caput retro agi oportet, ita, ut fascia sursum feratur.

§. 1161.

Etiam humeri utriusque caput retro dandum fascia continendum est in omnibus casibus, in quibus iugulum, vel a sternum, vel ab acromio, diductum super haec ossa effertur, illudque, quamvis densioribus pannis obiectis, satis contineri nequit. Adduci possunt humeri, tum in priorem, tum posteriorem, partem, vel ea fascia, qua et iugulum continetur, vel alia, cui a sterno nomen est, quae sub ala obuoluta, vel per pectus, vel per scapulas, ad dextri lateris summum humerum ascendit, hunc complectitur, et ad eandem rationem iterum ad sinistri lateris humerum tendit et hunc etiam comprehendit. Haec fascia plerumque bis, vel tertio ita circumagitur, donec bene teneat. Illud vero ante omnia observari oportet, recte collocandum esse humerum, ita, ut is satis attollatur, et ut, pro dissimili casu, dissimili ratione eius caput, vel in priorem, vel posteriorem, partem adducatur, id quod fit, si inferius eius caput, quod sedem brachio praestat, in contrariam partem inclinatur. Etiam necesse est, humerum immobilem praestari, quare is sic, ut decet, inclinatus fasciaque circumdatus ad latus deligari, et canaliculo
qui

ui ex ceruice suspenditur, vel habena, ex ipsius fasciae retro datae capite facta, vel etiam mitella, excipi debet. Deligari in omnibus casibus brachium debet, vt pollex d pectus inclinatus sit, siquidem is brachij naturalis habitus est. Ne aeger membrum, dum aliquid prehendere vult, nocenter moueat, is rotundum aliquid manu continere pōtest. Ob id quietem valde necessariam esse, intelligitur. Si homo gracilis est, antequam anni fasciaeque iniiciuntur, sinus profundiores, qui supra infraque iugulum sunt, commode linamentis, bo oui madidis, implentur.

§. 1162.

Humeri summo capiti rotundiori et tumido sedem aestat parum desidens sinus, vel γλήνη, quae in scalarum osse est. Continetur non alio ligamento, iam, quod articulum, manticulae in modum, comprehendit, quod vero validioris generis est. Per illud gamentum, et per oblongum in osse sinum ac nervon vaginam, fertur alter tendo musculi bicipitis, vel racoradiaei, qui in suprema ora illius γλήνης finitur, ta humeri rotundum caput excipitur. Articulum entur, tum ille superior, tum alter, omoplatae processus, quorum prior acromium, posterior coracoides catur, et validum ligamentum, quod inter hos duos ocessus medium est. Haud ignorari oportet, sub a, praeter maiores arterias, venas, nervosque, qui brachium feruntur, esse etiam glandulas; quae rtes omnes variis offensis obnoxiae sunt *. Ar-
trodia est lubrica et in omnem partem mobilissima.

Igitur, ne saepius dicendum sit, vbi fascia quaedam sub ala fertur, oportet semper prius molliores pannos imponere, ne hae partes offendantur.

§. 1163.

Humerum in superiorem partem emoueri, prohibent illi duo processus, et, quod inter eos medium est,

R r

liga-

ligamentum (1162). Nec, si is deorsum versus
 motus est, rotundum caput diu super angustam
 pulae oram consistere potest. Si excidit in partem
 posteriorem, eius caput sub spinam omoplatae ve-
 nit. Frequentissimum vero est, humerum in alam et in par-
 tem priorem promoueri. Raro incidit, ut is su-
 per coracoidem processum feratur, et inter hunc atque
 iugulum sub pectorali musculo consistat.

§. 1164.

Non aliae, quam communes, causae sunt, quae
 efficiunt, ut humerus excidat, id vero, quia articulus
 caeteris omnibus mobilior est, frequentius euenire
 solet. In variam autem partem os expellitur, per
 varia et contraria vi, quae adhibita fuit. Quaedam
 tamen propria signa sunt. Si humerus delapsus
 est, et eius caput super oram scapulae consistit, brachium
 longius videtur, et porrigitur. Magni dolores sunt
 qui intenduntur, si brachium deprimitur, parum
 videntur, si id attollitur. Humerum diu hoc loco co-
 sistere posse, supra (1163) negavi. Si humeri caput
 in posteriorem partem motum fuit, cubitus in pec-
 tore inclinatus est, et dolor increbrescit, si is a pectore
 ducitur. Si vero caput in alam delapsum est, pro-
 net acromium, sub quo etiam sinus est. Si caput
 musculo pectorali est, in posteriorem partem incli-
 tur cubitus, qui, si extenditur, magnos dolo-
 res mouet, et membrum altero breuius est. Si vero
 caput humeri in partem priorem propulsum inter iug-
 lum ac processum coracoidem haeret, cubitus pos-
 teriora versus spectat, et membrum altero breuius
 est, et quoniam tumor esse solet ea parte, in quam
 prorupit (1105), coracoides processus ab humero
 haud facile discerni potest.

§. 1165.

Plerumque non difficillimum est, humerum, si is incidit, iterum in sedem suam compelli, id tamen expeditius fieri solet, si humerus in alam delapsus est, nec non, si is super scapulae oram consistit, difficilior, si in partem priorem incidit et sub musculo pectorali haeret.

§. 1166.

Igitur, si corpus puerile est ac molle, ligamentisque imbecillibus intentum, satis est, humerum manibus adduci. Homo in sedili collocatur, et chirurgus duobus ministris alteri imperat, ut suis lacertis, et pectus, et collum hominis, comprehendat, et caput et scapularum ossis leniter reducat, alteri vero, ut humerum apprehendat et extendat. Ipse autem chirurgus ad latus est, et, ubi deprehendit, satis intentum esse humerum, ita, ut spatium inter ossa liberum sit, is humerum manu alleuat, dirigit, et in sedem suam compellit. Fere melius res succedit, si chirurgus ipse humerum extendit, et eum habena, quae, etiam ceruicem et emotum humerum, comprehendit, tollit, manibus vero dirigit.

§. 1167.

At, si vastius corpus et ligamenta robustiora sunt, necessariae sunt habena, aut fasciae, valentiores. Quibus fasciis, quae duabus transversis lineis super pectus et scapulas ad similitudinem literae X feruntur, circumdatur et hominis ceruix et eius sub ala pectus, quae ea ratione scapulae caput comprehenditur. Fasciarum capita ministro post caput hominis aduntur, vel etiam ad vncum parieti exaduersum intum deligantur. Alia habena ab alio ministro iniicitur imo humero. Omnibus sic dispositis, chirurgus, si ad latus est, praecipit, ut duo ministri in diuersa

R r 2 con-

contendant, vel, si illae habenae, quae ceruicem pectus comprehendunt, ad vncum deligatae sunt; habena, qua imus humerus circumdatus est, adducitur et membrum extendatur. Chirurgus, qui ad la est, ea ratione, quam proposui (1166), humerum tollit, et in sedem suam compellit.

§. 1168.

Haec humerum reponendi ratio vsu maxime comprobata est. Sed sunt multae aliae ab autoribus positae. Sunt, qui hominem supinum collocant super pauimentum, et alae, qua humerus emotus, subiiciunt lanam, pannos densiores, vel aliud quod mollius. Is, qui curaturus est, homini obuersus latus, in quo membrum excidit, humi assidet, et manus sua hominis brachium apprehendit, atque hoc, dum calce pedis sub ala humerum elapsum cogit, intendit. Sed hac ratione membrum non satis et ita exten potest, ut spatium inter ossa liberum sit, nec humerus et scapulae articulus diducitur, sed cubiti. Magis iam adducuntur muscoli extensores, quam flexores.

§. 1169.

Alii homini praecipiunt, ut in sedeculam confectat, alae etiam lanam, vel pannos plures densos melleque subiiciunt, brachium vero super ostium, super scalae gradum, traiciunt, quod minister apprehendit, et quantum potest, adducit. Interea alius sedeculam hominis pedibus subducit, ita, ut is consistere non possit. Dum vero intento brachio corpus interam partem demittitur, caput humeri ab ostio lignouae, in suam sedem compellitur. Chirurgus et tiori loco ad latus stat et os manibus suis, si necesse est, dirigit. Non multum ab hac ratione differt alia, quae emotum humerum super longurium, seu perticam traiciunt, quem minister, dum duo viri longurium

atque

attollunt, adducit. Etiam nonnulli humerum super
 alam hominis robusti ac proceri in genua procumben-
 tis traiciunt, qui hunc manu prehendit, et dum se
 erigit, ea ratione membrum intendit, et humerum
 cogit. Magnum vero periculum est, ne ostio, vel
 scapulae, aut longurii, ligno, sub ala glandulae, arteriae,
 venae atque nerui laedantur, et inflammatio mouea-
 tur. Nec his rationibus membrum, vt decet, sed,
 vel nimium, vel nimis parum, intenditur, nec hume-
 us recte dirigitur, praecipue, si is in posteriorem, vel
 anteriorem, partem, et non deorsum in alam, excidit.

§. 1170.

Alii hominem in sedecula demissiori collocant,
 cuius brachium inter sua femina traiciunt, et vt mi-
 nister hoc intendat, et alius scapulam reducat, prae-
 cipiant, interea vero brachium manibus suis, sibi et-
 iam super ceruicem iniecta habena (1166), dirigunt
 et compellunt. Sed non, nisi in valde infirmis cor-
 poribus, ita reponi poterit humerus, cum articulus
 non satis possit diduci.

§. 1171.

Nec desunt, qui hanc curandi viam ingressi sunt.
 Homo in sedecula demissiori collocatur, et, qui cura-
 turus est, ei aduersus ad latus in alia sedecula assidet,
 atque super suum genu posito suo brachio nixus,
 manu, quae hominis alae subiicitur, humeri luxati
 aput attollit, sinistra vero inum humerum deprimit.
 Sero tamen sic rem bene cedere, ex prioribus intel-
 ligitur.

§. 1172.

HIPPOCRATES ad reponendum humerum machi-
 namentum reperit, quod ἀμβν *, CELSVS vero **
 catham ligneam, vocat. Hoc machinamentum quan-
 doque

doque idoneum esse potest, quo tamen etiam humerus non satis extendi et abduci videtur ***.

* De Articulis Sect. IV. T. II. Edit. Lind. p. 760. C. GALENI Comment. in Edit. Chart. T. XII. Text. X. pag. 300.

** L. VIII. C. XV.

*** PETITVS hoc machinamentum propter hanc rationem relicit l. c. T. I. p. 186. sed illud defendit NICOLANDRY in Quaest. med. chir. *An in humeri luxatione Aliud potius, quam scala, ianua, polyspastusque iterato renouandum* Parisiis MDCCXXXII. proposita. Conf. Scriptum NAVLTI contra PETITVM p. 290.

§. 1173.

Etiam polyspasto vtuntur, quo articulus satis abduci potest. Vbi vero humerus satis recessit, is machinam chirurgi, adhibita etiam, si is deorsum versus in aliam partem delapsus est, habena (1166), dirigitur, attollitur, in sedem suam compellitur.

† Polyspastus est efficax potentiae mechanicae genus, quo articulus satis plerumque diduci caput humeri a scapula potest, dummodo aliquid sit, contra quod niti possit truncus, neque cedat. Id autem quam proxime fieri potest, articulo applicatum sit, et nihilominus scapula cum iugulo ab minime seorsim retineatur, ne cedat.

§. 1174.

Ex ambe vero, siue spatula, et ex polyspasto, composita a variis varia machinamenta fuere, his longiora aptiora. Illud, quod PETITVS * inuenit, et opere factum, et mole ac pondere molestum est. Etiam eius retinaculum, vel habena, quae ex molli aluta composita fuit, ac super humerum inducitur, retro coegit videtur tendines musculorum, pectoralis, et latissimi dorsi **.

* Vid. Fig. in C. A. R. Sc. MDCCXVI. p. 334. et des Machines des Os T. I. p. 198.

** Hoc mox (1172) citati Auctores, qui contra PETITVM scripserunt, potissimum vrgent.

§. 117

§. 1175.

Fere frustra esse opinor, tot generibus machinamentorum ad extendendum humerum vti, qui laqueis ac habenis in diuersas partes adductis satis intendi, atque etiam, modo omnia obseruentur, reponi potest. Vbi autem machinamenta necessaria videntur, fere reliquis praeferri debet illud, quod nostratibus in vfu est. Ferreus, vel ex alio metallo factus, bacillus habet in parte suprema scutulum, quod alae subiectum contra hominis latus nititur. Cauendum est, ne hoc carnes, praecipue in foeminis mammas, nocenter comprimat. Membrum bacillo impositur eique alligatur, habena autem, quae imo humero iniicitur, ad axin torculari motam, vel ad trochleam, orbiculumue, deligatur, quibus circumactis, membrum sine negotio intenditur. Necesse vero est, ut inter illud scutulum ac inter bacillum articulus sit in omnem partem mobilis. Nam membrum, bacillo ferro impositum, si illud satis diductum fuit, hoc articulo, dum extremum machinamenti semper in contrariam partem inclinatur, in sedem suam restituitur.

* Nostri chirurgi hoc Glossocomium vocant. Veteribus *γλωσσόκομον* fuit organum tractorium. Vide ORIBASIVM de Machinamentis Cap. XXIV. Aliis vero fuit capsula, in quam tibia fracta, fuit, ut videtur, ita reposita, ut oblique fractum os habenis in diuersa diductum fuerit. Vide GALENVUM in HIPPOCRATEM de Fracturis Comment. II. in Textu LXV. T. XII. pag. 218. Hoc, quod ego descripsi, machinamentum iam olim adhibuerat PYRMANNVS in Chirurgia curiosa p. 692. Id vero magis perfectum vide in fig. XVIII. Si de machinamento iudicium ferendum est, obseruari debent, quae supra generatim de reponendis ossibus praecepi (1110 ad 1113).

§. 1176.

Reposito humero, panni molles alae subiiciendi sunt (1162). Tum alius longiorque pannus sub ala ta iniicitur, ut summum humerum amplectatur, et

unum eius caput super alterum efferatur. Iniciat fascia, quae sub altera ala incipit, per pectus ad humerum caput tendit, illudque amplectitur, per scapulas priorem alam fertur, reuertit, et si ter, vel quater, per orbem circumagitur. Tum sursum tendere debet cochleae vel asciae in modum, ita, ut spicam in summo humero describat. Antequam vero fascia caput humeri ultima vice comprehendit, ea prius bis ipsum humerum sub illa spica circuire debet, quae tandem ad alam, a qua orsa fuerat, reuertit, et in pectore finitur. Humerus etiam recte collocari, mitella capi, atque sic ex ceruice suspendi debet.

§. 1177.

In cubito tria ossa coeunt, humeri, radii et ipsi cubiti. Humerus inferior duos habet processus, orbiculatos et cartilagine mollitos condylos, inter humeri vero parte posteriori profundiorum sinum. Inter duos brachii ossa radius superior est, cubito breuior; is capitulo rotundo et leuiter cauo recipit orbiculatum humeri condylum externum. Cubitus inferior longior, et in summo capite habet duos processus, seu extiores vertexes, inter quos quasi lunatus atque excipiens est. Alter vertex ex summo cubito, vel olecrano confurgit, atque, ubi brachium extenditur, illo humeri posteriori sinu recipitur. Alter atque anterior processus, siue vertex, qui coronoides dicitur, contra interiore humeri condylum situs, super hunc, cardine modo, mouetur. Olecrani vertice prohibetur, ut brachium, si id extenditur, retro dari possit; alter vero, coronoides, ne illud nimium possit adduci inflecti.

§. 1178.

Cubitus etiam annexus radio est. Radii rotundum caput excipitur parum desidente sinu, quem cubitus habet in parte sua extrema radio obuersa. Haec ossa

etiam super se mouentur, si manus conuertitur, vt illa, vel prona, vel supina, sit. Tria ossa validis ligamentis continentur. Totum articulum cum vtroque processu cubiti et capite radii (1177) comprehendit manticula (1096). Super hanc feruntur alia ligamenta, quorum alterum ex condylo humeri externo educitur et super radium finitur, alterum, a condylo humeri interno orsum, ad cubitum procedit, et in hoc desinit. Praeterea caput radii constrictum est validissimo et cartilaginoso ligamento, quo illud totum fere comprehenditur et cum vlna eiusque paruulo sinu coniunctum est. Inter haec duo ossa, quae iuxta humerum iuncta in medio paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, etiam medium ligamentum validum est, quo illa, ne diduci possit, continentur. Est in hoc articulo ginglymi genus, quod angulare vocant. Articulum tuetur, et, vt membro maiora pondera leuari possint, efficit supremus cubiti processus, seu olecranium.

§. 1179.

Cubitus in tres partes excidere potest, in partem anteriorem, posteriorem, ac posteriorem. Nam, quominus in partem priorem propellatur, prohibet olecranium. Hoc tamen frangi posset, et humerus etiam, eo fracto, in priorem partem emoueri. Si cubitus in partem posteriorem excidit, cubiti processus coronoides haeret in posteriori humeri sinu, in quem naturaliter olecrani vertex insinuatur. Brachium curuum est et porrigi nequit. Si vero in anteriorem partem brachium excidit, radius contra internum humeri condylum situs est, brachium paululum in eam partem, a qua os recessit, recuruatum et pollicem versus inclinatum est. Si vero brachium in posteriorem partem prolapsum est, cubiti lunatus profundiorque sinus excipit humeri condylum externum, brachium

etiam in contrariam paululum recuruatur, multumque flectitur. Frequentius euenire solet, vt brachium in posteriorem partem moueatur, id quod fieri non potest, si brachium porrectum, sed vbi id flexum est. Crebrius illud incidit, si homo, qui pronus humi prostermitur, brachium incuruatum, vt se eo sustineat, aliquantum porrigit et in illud procidit.

§. 1180.

Quoniam hic articulus valentioribus ligamentis intentus est, is non sine periculo, dolore atque inflammatione excidere potest. Etiam aliud periculum est, ne, quae per cubitum feruntur, arteriae, venae, neruique offendantur, et ne articulus, etiam recte repositus, ex coacta axungia rigidus maneat. In quamcunque partem prolapsum sit brachium, reponendi ratio vna est. Vtrumque membrum a duobus robustis hominibus per manus, interdum etiam adiectis habenis, in diuersas partes ita extenditur, vt brachium, quod iuxta manum, apprehenditur, antequam adducitur, prius modice flectatur. Vbi membrum satis intentum est, quae exciderunt, ab ea parte, in quam prolapsa sunt, in contrariam impelluntur.

§. 1181.

Extendendi alia ratio est. Brachium super aliquid rotundum, columnellam, vel lecti fulcrum, ponunt, illud super hoc manu, vel iniectis etiam habenis, adducunt, et a posteriori parte in sedem suam impellunt. Sed hac ratione membrum non satis extenditur.

† Ossium cubiti, sede motorum, reductionem idoneam descripsit, quem saepius iam laudauimus, THEDENIVS. Recte primo monet, ossa illa duo sede mota a validis ligamentis ad caput inferius humeri valide adduci, ita igitur extensionem et contra-extensionem, quam vocant, adornandas esse, vt a mutuo contactu illo ossa illa liberentur. Deinde quomodo id efficiendum sit, praecipit. Opus autem est ministris duobus. Eorum alter carpum vola manus suae pre-

prehendit, manum alteram applicat anteriori parti cubiti tribus digitis latis ab articulo cubiti cum humero. Minister alter manuum suarum alteram superiori et anteriori humeri capiti, alteram capiti humeri inferiori posteriorique applicat. Itaque si prior ille altera manu quasi conatum edit flectendi cubitum, altera vero superius caput cubiti deprimere satagit. His conatibus caput cubiti iam aliquantum abducitur a capite humeri. Quodsi igitur ab altero ministro duo contrarii conatus in osse humeri fiunt, h. e. si altera eius manus caput superius humeri versus truncum urget, altera vero caput humeri inferius versus anteriora mouere conatur, ginglymi illius capita et cavitates, ad se mutuo antea adducta et appressa, illis conatibus ministrorum, ab se mutuo abducuntur. Haec autem illi simul, et ad iussum quidem Magistri sui, ita agunt. Chirurgus autem ipse alterius manus digito indice et pollice apprehendit, capita superiora ulnae et radii, alteram vero manum imponit parti anteriori capitis inferioris humeri, atque, si a ministris paulatim illa quae supra dixi perfecta sunt, caput humeri versus exteriora, capita vero radii et ulnae versus interiora ducere conatur. Atque sic haud difficulter repositio scquitur. Fiunt autem illa sic, si luxatio posteriora seu exteriora versus accidit. Similia tamen fiunt, si ad alterutrum latus luxatio contigit, sic tamen ut chirurgus ipse radii et ulnae capita in contrariam partem compellat. Vid. THEDENII *Neue Bemerkungen und Erfahrungen* p. 31.

§. 1183.

Reposito articulo, medicamenta valde necessaria sunt, non solum, quibus inflammatio leuatur, sed etiam, quae infirmatis ligamentis mederi possunt (1114. 1115. 1116). Et, cum in hoc articulo axungia celeberrime coire, ac per quietem coacta brachii flexum prohibere soleat, quam primum id per dolorem licet, membrum exerceri, et ad usus suos promoueri, etiam articulus idoneis medicamentis et asperioribus pannis frequentius perfricari oportet. Si is deligandus est, iniicitur pannus vtrunque in longitudinem incisus, cuius media pars olecranon complectitur, quatuor vero capita super cubiti interioram partem adducuntur. Fascia ab humero incipit, super interioram cubiti partem ad brachium oblique tendit et hoc com-

pre-

prehendit. Sic vero a brachio ad humerum, humero ad brachium, super articulum ita voluitur, ut haec membra circumeundo amplectatur, et ut tandem, dum deorsum sursumque versum, quasi in cochleam, serpit, totum articulum comprehendat, contegat et adstringat.

§. 1184.

Radius et cubitus ea ratione, qua supra scripsi, in parte suprema inter se committuntur, et medio ligamento, quod inter vtrumque est, continentur, quod ligamentum etiam variis musculis sedem praestat (11178). Haec ossa, quae in medio brachio paulatim dirimuntur, rursus ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem hic radius plenior est, et a latere cubito obuersus sinum habet parum desidentem, qui cubitum in extremo tenuem et rotundum excipit. Inter haec ossa cartilago singularis est. In vtraque igitur parte, ad humerum, et ad palmam, haec ossa suae per se mouentur, quando manus conuertitur, ut, vel prona, vel supina, sit. Sunt, qui putant, etiam haec ossa vi, inter se distrahi posse, id quod vero non patitur illud, quod inter ea medium est, validum ligamentum. Forte tamen paulatim hoc fieri potest, si in articulo humor confluit, et axungia coacta fuit.

* V. WINSLOY *des Os frais* §. 271.

§. 1185.

Radius in caput plenius confurgit, quod extrema sua parte sinuatum est. Ille vero sinus cartilagineus: media linea diuissus excipit gibbosiore palmarum ossicula, praecipue nauculare et lunatum. Hic articulus etiam manticula et aliis validis ligamentis constringitur, quorum vnum ex processu acuto stiloide cubiti educitur et carpo atque huius ossiculi cuneiformi ac uncinato innectitur. Cubitus enim cum carpo non committitur,

mittitur, sed folis ligamentis deligatur. Aliud ligamentum a processu acuto atque extantiori extremi radii incipit et ossi naviculari huiusque tuberculo adnectitur.

§. 1186.

Frequentius manus in priorem ac posteriorem partem excidit. Raro illa ad minimum digitum, multo rarius, ut videtur, ad pollicem, conuertitur, quia hoc ille extantior radii processus prohibere videtur. Euenire id solet hominibus, qui subito casu super porrestam manum corruunt.

§. 1187.

Scire licet, in quam partem manus promota sit, si eius habitus consideratur. Digiti enim semper in contrariam partem conuertuntur. Si illa in posteriorem partem excidit, digiti porrigi non possunt, si vero illa in priorem incidit, ii haud flectuntur. Accedit grauis dolor, et homo quoque manum, nec in volam vertere, nec resupinare, potest. Etiam hic articulus per quietem rigidus fieri potest.

§. 1188.

Intendi ex altera parte manus, ex altera brachium, debet. Id etiam fieri potest super mensam, vel alium locum durum ac renitentem, ita, ut manus prona sit, si in posteriorem partem excidit, supina, si in priorem. Vbi satis ossa inter se diducta sunt, illa manibus in contrariam partem repelluntur. Vbi articulus deligatur, ei, si manus in priorem posterioremque partem prolapsa fuit, opponitur ferula ex charta densiori coacta atque conglutinata.

§. 1189. —

In palma, vel carpo ac metacarpo, si ossicula sedibus suis, mouentur, id quod modo in priorem, modo in

in posteriorem, partem fit, ab ea parte, in quam venerunt, tumor est. Haec officula, sine intentione, digitis tantum bene pressa, in suam sedem retro dantur.

§. 1190.

At, inter officulum carpi, quod trapezium maius vocatur, et pollicis primum os, singularis commissura est. Nam in trapezio osse, super quod pollex movetur, in parte anteriori atque posteriori duo obliqui et quasi lunati, sinus sunt, in media autem parte illud officulum gibbum est, in parte vero externa et interna habet tubercula. Contra hoc vero primum os pollicis situm est, quod per totidem similesque sinus prioris processus accipit, et cuius tubercula eiusdem sinus excipiuntur. Quoniam hic articulus, quamvis esse ligamentis et pluribus musculis contineatur, valde in omnem partem mobilis est, os facile elabitur. Non alia eum reponendi ratio est, quam, qualem in aliis proposui. Si vero officulum iterum in suam sedem promotum fuit, circa articulum duo minores pannae oblongi, seu splenia, ita circumdantur, ut articulum comprehendant. Fascia, quae ab extremo brachio incipit, super articulum, quem ter comprehendit, datur, qua emotum os adducitur. In digitis nil ultra fieri debet, quam, quod in aliis faciendum esse, posui.

§. 1191.

Femur parte sua suprema habet magnum teretemque processum, qui oblique ad os coxae procedit, quem ceruicem appellant. Haec ceruix, intus rara et caernosa, desinit in magnum et rotundissimum caput, cartilagine etiam mollitum, quod in sinum rotundum coxae coniicitur. Sinus Anatomicis κοτύλη, vel acetabulum, vocatur, qui in iunioribus ex tribus ossibus, quae media cartilagine inter se committuntur, constat, ex ilio, ischio, et osse pectinis. Etiam is cartilagineus est.

ft. Cartilago tamen in parte eius infima et externa efficit, quo loco fita est maior glandula, ex qua axunia in articulum fertur, et vbi etiam huic finui inferitur illud validum ligamentum, quod ex medio femoris apite educitur *. Sinus ille, in summa parte profundior, in inferiori minus defidens, habet oram superius valde extantem, e latere autem, et foramen ouale verum, excisam, qua re efficitur, vt femur melius interiora versum et ad coxam adduci possit. Super hanc orae incisuram transuersum ligamentum est, quod infra caud inhaerescit, sed lato cauo peruium est. Sub hoc arteria venaque ex cruralibus educitae in acetabulum ad ligamentum illud internum eamque glandulam feruntur. Per illud etiam cauum effertur glandula illa maior, in propinquo sita, si haec a capite femoris premitur, id quod incidit, si femur exteriora versum motetur, et ab altero abducitur **. Ora illius sinus, vel acetabuli, cartilaginosa est, cum qua committitur ligamentum in toto corpore validissimum, quod manticulae in modum, articulum comprehendit. Vbi vero in ora incisuram et ligamentum transuersum esse dixi, ibi et manticula, et ora cartilaginosa, illi ligamento transuerso inhaerescit, ita, vt hoc infra, prout dixi, peruium sit. Aliud ligamentum valens et durum, quod vulgo teres vocant, fere ex medio femoris capite educitum, finui inferitur, quo etiam articulus multum adstringitur. Validissimis etiam musculis hunc articulum contineri, nemo ignorat.

* V. CHESELDENS Osteographia T. XVIII. Fig. I. D. et Tab. XXXIX. Fig. 2. 3.

** Est obseruatio Cl. PETITI in C. A. R. Sc. MDCCXXII. p. 164.

§. 1192.

Quoniam hic coxae sinus adeo profundus, et articulus tam validis ligamentis, plenisque etiam musculis, comprehenditur, difficile est, femur vi et aliquo casu

casu in adulto robustoque corpore semel atque omnino expelli. Cum vero olim autoribus visum fuerit femur crebrius ex sinu suo excidere, post tamen prehensum est, eos non satis os fractum a luxato distinxisse. Nam illa femoris ceruix, quae intus caue-nosa ac rara, tenui admodum bracteola circumdata est *, longe frequentius frangitur, quod fracturae genus pluribus opinionem fecit, caput ossis ex acetabulo suo excidisse. In iunioribus illud etiam caput epiphysis est, quae media cartilagine cum ceruice committitur, atque ob id longe facilius diducitur **.

* Vid. RVYSCHII Thesaur. V. Tab. II. Fig. 1 et 2.

** Se in hunc errorem inductum fuisse, et fractam ceruicem pro luxato femore habuisse, proficitur PARAEVS L. XIV. c. XXI. p. 416. quam historiam repetitam a SCHENCKIO legimus in huius Obseruat. Med. L. V. p. 333. Illa vero res fere neglecta a RVYSCHIO iterum proposita et figuris illustrata fuit in Thes. VIII. Tab. III. Fig. p. 61. et in Thes. IX. p. 29. p. 57. Tab. I. Fig. 1. Etiam id repetiit RAVIVS in Orat. c. vera methodo discendi et docendi anatomen. Conf. CHISELDENS *Anatomy of the human Body* Cap. V. p. 35. Tab. V. Fig. VI. Fig. G et H. Observationem DOUGLASSII in Transac. Angl. No. 349. p. 501. in the *Abridgement* Vol. V. p. 38. Ephem. Nat. Cur. Cent. II. Obs. 20. p. 218. RVD. PHIL. BEVELIN Diss. de luxatione et fractura femoris, Alt. MDCCXVII et IOH. SALTZMANNI de Luxatione ossis femoris rariore frequentiore colli fractura, Arg. MDCCXXIII. Nouas SALTZMANNI Observationes, praecipue vnam, ubi, et caput femoris luxatum, et ceruix quoque fracta, fuit, vide in Acti Petropolitani Vol. III. p. 275. Possideo femur, cuius ceruix, olim fracta, omnino deficit, caput femoris autem, quod adhuc in sinu suo haeret, etiam multum detritum est.

§. 1193.

Quamuis vero hoc rarius euenire existimem, obseruationibus tamen compertum est, nonnunquam femoris rotundum caput ex profundiori coxae sinu semel et omnino casu quodam atque vi fuisse expulsum. A vero autem propius videtur, hoc fieri disrupto illo interiori valido ligamento, quare ob id, et cum etiam illud, quod articulum comprehendit, seu man-

ticula,

cula, multum infirmari sub his casibus soleat, os, quod sic vi emotum fuit, quamvis reponatur, non connetur, sed mox iterum erumpit.

* Vid. *Acta Med. Berolinensia* Vol. X. p. 107. Vbi legitur, homini adulto femur vi distractum ac emotum, post feliciter repositum, fuisse, ita, ut homo perfecte, et sine claudicatione, fuerit sanatus. Hic Lipsiae ante aliquot annos accidit, ut homo operarius ex contignatione rueret. Chirurgus vocatus femur emotum esse ex omnibus collatis indicibusprehendit, quod is etiam restituit. Homo vero cum brevi post ex graui capitis vulnere obiisset, eius corpus ab Illustri WALTHERO, Ordinis nostri Decano, mihi summa semper obseruantia colendo, incisum est, qui inuenit, os ex sinu suo in anteriorem inferioremque partem et os pubis versum promotum, a Chirurgo vero iterum conditum. Vidit enim ossis, quod exciderat, sedem in vexatis inflammatisque musculis. Illud vero sine negotio ex acetabulo expelli potuit, cum disruptum esset, tum internum ligamentum, tum alterius, quod articulum comprehendit, siue manticulae, pars anterior, per cuius plagam caput femoris proruperat. Igitur fere crediderim, vix hunc articulum in adultis vi casuve et omnino posse promoueri, nisi ligamento interno disrupto. In vetulae utroque femore defuisse hoc medium ligamentum, prodidit SALZTMANNVS in *Decade Observationum illustrium anatomicarum*, Arg. MDCCXXV. Obs. VII. p. 10.

† Memorabilis est casus, qui in Vol. V. *Monum. Acad. R. chir.* relatus est. Foemina parturiens cum sub partu insideret genibus viri cuiusdam, femora autem a foemina alia deducta essent, alterumque eorum subito remitteretur, eo ipso temporis momento dolorem vehementissimum percepit, qui a doloribus ad partum prorsus et omnino distingui poterat. Puerperio finito ingredi non potuit. Diu dubitatum est de genere morbi. Omnes tandem peritiorum chirurgorum luxationem femoris eo tempore, cum dolor ille perciperetur, accidisse vnanimi consensu iudicarunt, quanquam omnibus mirum videretur, a genu viri illius caput femoris ex acetabulo expelli potuisse. Mirari tamen desierunt, cum rescirent, foeminae illi singularem esse mobilitatem et laxitatem omnium articulorum, tantam quidem, ut pedes ori suo adnouere, iisque oscula impingere facillime posset. Alium non minus commemorabilem casum legas, si lubet in SCHMUCKER *Vermischten chir. Schrift.* Vol. I. Fuit enim homo ille robustus, et caput femoris repositum, homoque plene conualuit.

§. 1123.

At crebrius femur excidere solet, si id ab humore qui in acetabulum confluit, promouetur, quo illa ligamenta, vel laxantur, vel distenduntur, vel vorantur. Varia huius rei occasio causaque est. Nonnunquam febris, variolarum, morbillorumque, nec non scabie aliarumque valetudinum, mala materia in articulum conuersa et μετασάσις facta fuit (1104). Saepius item, ictu, casuue, femoris coxaeque ossa colliduntur et illa articuli ligamenta, atque etiam glandulae (1105) vehementius comprimuntur laedunturque. Nam, si incidit, multus humor in articulum confluit (1106) vel etiam in illis partibus inflammatio, et tandem suppuratio, concitatur. Hic autem humor, qui in articulum confluit, diu paulatimque increscit, et tandem os sub vehementioribus et increfcentibus doloribus a sede sua propellit. Etiam pueris hoc euenire solent dum labant, atque ab alto ex gerularum brachiis cadunt. Dum enim hae pedem manu inuadunt, articulumque violenter adducunt, ligamenta etiam violenter atque infirmant. Si internum ligamentum rumpitur, in sinum coxae effluit sanguis, aliusque humor. Si vero ligamenta valde adducta fuerunt et laxata, dum ipso motu et ingressu illa paulatim magis infirmantur donec tandem os ex sinu suo prorumpat.

* Hoc vitium iam cognouit HIPPOCRATES Sect. VI. Aphor. LIX. 'Οκόσοισιν ὑπὸ ἰσχυιάδος ἐνοχλημένοισι χροῖνης ἐξίσταται ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τετέοισι μύξαι ἐπιπύονται. Et Aphor. LX. 'Οκόσοισιν ὑπὸ ἰσχυιάδος ἐνοχλημένοισι χροῖνης τὸ ἰσχίον ἰσχύεται, τετέοισι τήκεται τὸ σκέλος, καὶ χωλῶνται, ἢν μὴ καὶ αὐτοῖσιν. Confer GALENUM in Comment. in hos Aphorismos Cap. IX. p. 289. Multa etiam habet FALLOPIVS de Luxationibus Cap. XIII. T. II. Operum p. 85. conf. del PAPA *Consulti Medici* conf. 50. p. 244. et PETIT in Comm. A. R. Sc. MDCCXXI p. 159. et, quae contra hunc scripserunt ANDRY et NAVLØ, quibus is etiam respondit.

§. 1195.

Haec vero vitia, quae varii generis sunt, certis quibusdam indicibus distinguuntur. Ante reliqua consideranda est causa, ex qua articulus, osue, noxam acceperunt. Os ligamentorum et humoris in acetabulum confluentis vitio emotum iri, scire licet, si membrum iuxta articulum, casu, ictuue, percussum, dolet, dolor vero indies magis intenditur, atque etiam minor membri usus relinquitur, donec tandem illud excidat, et audicatio appareat. Os, si illud e loco suo motum est, membrum in contrariam partem conuerti, non patitur.

§. 1196.

Vbi autem ceruix fracta est, hoc ictu, casuue, semel t, et ab initio homo, nec pedi insistere, nec commodè ingredi, potest. Quoniam muscoli os adducunt, crura tero breuius et valgius est: extra enim pes vltimus peccat, et calx ingressu terram non contingit. Si membrum sic fractum conuertitur, aure summo femori mota audiri quandoque potest sonitus, vel strepitus, cui fit, si ossa fracta super se mouentur. Inter certiora vero signa est, si, leuato dolore solutaque inflammatioe, pes sine magno negotio et extra, et intus, conuerti que inclinari potest. Nam hoc, osse fracto, fieri potest, non vero, si id integrum ex sinu suo excidit (1195).

§. 1197.

Si vero femur, vel vi, vel etiam paulatim, ex sinu suo expulsus fuit, illud in interiorem inferioremque partem promoueri, frequentissimum est. Nam ea parte, et acetabulum minus profundum, et ora eius excisa, et ligamentum illud internum prope est (1191). Quoniam etiam femur musculis glutaeis, qui magnum robur habent, adducitur, illud plerumque, si ligamenta remittunt, in interiorem inferioremque partem excidit. In hoc casu caput haeret in foramine ouali, cuius ligamentum etiam pedem paulum, non vero prorsus,

fus, in interiora conuerti, finit. Crus valgius est,
 teroque longius. Extra enim pes vltimus spectat. Quia
 crus longius est, genu plerumque, si homo incedit
 flectitur. Caeteroquin etiam in inguine tumor,
 nate sinus, esse solet. Quia acetabulum suprema pars
 profundius est, in superiorem internamque partem
 os prolabi non facile potest. Illud tamen, postquam
 per inferiorem partem promotum fuit, nonnunquam
 si illud foramini ouali non insidet, musculis sursum
 versus adducitur. In hoc casu pes breuior magis
 exteriorem partem inclinatus est, qui nullo modo
 interiora conuerti potest. Maior etiam tumor in in-
 guine esse solet, a quo quandoque maiores arteriae
 atque venae comprimuntur, quae per ligamentum
 POVPARTII (792) descendunt.

§. 1198.

Femur interdum etiam in posteriorem partem, ut
 videtur, semper in inferiorem, excidit, quo vero
 loco consistere nequit, sed musculis sursum fertur.
 In hoc casu crus breuius est, ita, ut pes summis digitis
 terram contingat, crus varum est et pes intus inclinat-
 tur. In nate tumor, in inguine sinus, esse solet.

§. 1199.

Femur, ex quacunque causa prolapsum fuerit, in-
 terdum reponi potest, illud tamen repositum semper
 iterum excidit. Rarius euenisse crediderim, ut illud
 si vere luxatum fuit, fuerit ex toto, et sine deformitate
 claudicatione, restitutum. Etiam, si femur loco suo
 non est, in membro fit macies, et caro emacrescit. In
 pueris femur excidit, membrum minus, quam caeterum
 crescit. Si in sinu coxae inflammatio fuit, et putredine
 coit, illud tandem ligamenta vorat, supernascuntur
 mala vlcera atque fistulae, et homines tandem tabe
 moriuntur.

§. 1200.

Si tamen vero femur aliquando vi expulsus esset, experiendum foret, num illud possit reponi. Aeger collocandus est super scamnum, ita, ut ea pars, in quam prorupit, superior sit. Membrum valentius intensionem debet duabus habenis, altera ab inguine, altera genu. Commode hoc fieri potest, mediante polybastro, si prius illa habena, quae per inguina traiecta sit, vincto illigata est. Vbi ossa satis diducta sunt, femur manu chirurgi, adhibita etiam habena (1166), dirigitur, et in sedem suam conditur. Scire licet, illud loco suo esse, si homo membrum mouere potest. Superimponitur pannus, et iniicitur fascia, quae, spicam describit, et, quasi per cochleam, ascendit, atque sic femur adducit. In obesis parum continere fascia potest.

§. 1201.

In illo vero casu, ubi femur percussus fuit, et dolor, qui in articulo saeuit, ac indies magis intenditur, metum facit, ne a confluente in sinum humore os tantum promoueatur, experiiri licet quaedam alia auxilia. Alius crebrius ducenda est satis valentibus, et sanguis etiam mittendus, quo humorum aditus auertatur, adhibito simul victu idoneo, qui sustinet, non nimium diluit. Extrinsecus adhiberi possunt infractiones cum liquoribus arte chemica paratis (1115), impositis etiam discutientibus. Fascia (1200), quantum potest, articulus adstringendus est, et quies seruanda *. Sunt, qui corporibus siccioribus macilentisque, altius denisso scalpello, ligamentum, vel manticulam, incidere, et humorem euocare, ausi sunt **, ex qua tamen curatione rigidus manere potest articulus.

* Ex HIPPOCRATE c.l. et AEGINETA discimus, veteres in his casibus super articulum ferrum candens imprimere, et magnam suppurationem concitare, solitos fuisse. Confer §. 935. (1194. *).

** Hanc viam aliquando SENFFIVM, inter Berolinenſes Chirurgiae doctorem clarum, ingreſſum eſſe, ab eo ipſo accepimus.

§. 1202.

Femur inferius intumeſcit, et habet duo maiora capita, ſive condylōs, cartilagine mollitos, qui aliquantum in anteriorem, magis in poſteriorem, partem prominent. In poſteriori parte inter eos medius profundiorque ſinus eſt, per quem maiores arteriae ac venae ad pedem feruntur. Condylus interior paulo plenior eſt et magis rotundus, quam exterior. Haec capitula excipit tibia, cuius caput ſupremum plenius duos pariter deſidentes ſinus habet, qui illos femoris condylōs excipiunt. Ille ſinus, qui internum femoris condylum accipit, altero paulo maior ac profundior eſt. Inter haec oſſa, quae, vt caetera omnia, etiam cartilagine molliuntur, ſitae ſunt duae cartilaginee lunatae ſibi obuerſae, verſus interiora tenuatae et exciſae quae, dum femur ſuſtinent, faciliorem articulo motum praeſtant, et ſinus etiam illos, quibus femoris condylōs excipiuntur, profundiores reddunt. Hae cartilagineae, quae in parte anteriori ſub patella ligamento ſeſquialter ligantur, quod ſemilunare vocant, quaſi in ligamentum breuia et valentiora degenerant, inhaereſcuntque tuberculis, quibus ſupremae tibiae medium exaſperatum eſt. His tuberibus ſupremi capitis inneſcuntur et alia valentiora ligamenta, ex eorum numero, quae in manuculis continentur. Illorum alterum incipit ab illo profundiori ſinu, quem in femore poſterius intus vtrumque condylum eſſe dixi, et ab ipſo condylō interno, fertur ſuper illum ſinum, et inferitur ſuper tibiae, huiusque parti poſteriori, in qua illa poſt tuberculum incifuram habet, ita, vt ligamentum paulum exteriorius verſum procedat. Alterum, ex eodem femoris ſinu et condylō externo educum, finitur ſuper tibiae ſupremae, tuberibus exaſperatae, partem anteriorem ext

exterioremque. Haec valentiora ligamenta, quae selecussant, et quasi figuram Graecae literae X accipiunt, comprehenduntur valida manticula, quae etiam illis supra descriptis cartilaginibus lunatis inhaerescit. Super hanc feruntur alia duo ligamenta. Alterum, quod amplum est, incipit a condylo interno femoris, cuiusque latere, et finitur in capite tibiae, huiusque parte interna. Alterum vero, ab exteriori parte articuli positum, et a condylo femoris externo orsum, tendit, partim ad tibiam, partim ad suram, horumque ossium summa capita. Aliud ligamentum latum addunt, quod ex femore posteriori super condylum externum incipit, super illum sinum procedit, et summo capiti tibiae, eiusque parti postremae, inseritur.

§. 1203. -

Hunc articulum, qui etiam pluribus musculis continetur, tuetur os paruum, patella dictum, quod, nulli ossi inhaerens, superius musculis extensoribus, recto, cruraeo, et vastis, tum externo, tum interno, inferius autem, validissimo ligamento deligatum, super iuncturam quasi innatat. Ligamentum illud, quod alii ad tendines illorum muscutorum referunt, inseritur tuberi, quod in tibia anteriori sub eius supremo capite est. Patella, parte posteriori cartilaginosa, in medio gibba, vtrinque paululum sinuata, respondet ossi femoris, quod inferius inter duos condylos sinuatum est. Patellae sinus externus, quo externus femoris condylus excipitur, amplior et profundior est, quam internus. Praeter illos muscutorum tendines, et ligamentum, quo patella tibiae adstringitur, illa innectitur sinuato inferiori femori, medio alio ligamento, quod ex eius parte posteriori extantiorque educitur. Praeterea orae patellae circum circa innectitur manticula, qua totus articulus comprehenditur.

§. 1204.

Genu ad ginglymi genera referri debet. Non facile excidere potest, quod ossa ea parte, qua inter se committuntur, lata admodum sunt et ampla, quod illa pluribus et validis ligamentis constringuntur. Si vero ossa vi expelluntur, hoc fieri nequit nisi laesis, vel valde infirmatis, illis ligamentis. Quod etiam ex his, si violata fuerunt, humor effertur in articulum, is intumescit rigescitque, de quo morbo genere protinus dicam. Si tibia ex sede sua mouetur, necesse est, etiam patellam distrahi. Haec vero quandoque excidere potest, remanente in sede sua tibia. Genu autem in anteriorem et posteriorem et in posteriorem partem excidere potest, non vero in priorem prolabi, quod ibi opposita patella est. Nonnunquam si patella transversa inferius iuxta illud maius ligamentum fracta fuit, illa, dum musculis sursum versus attrahitur, minus peritis opinionem ossis luxati et in partem supremam promoti facere potest.

§. 1205.

Non alia, quam caeterorum articulorum, curatio est. Oportet membrum per vim extendere et tibiam in diuersas partes compellere. Si ex sede sua promotae est patella, oportet genu super scamnum ponere, atque, adducta depressaque tibia, articulum intendere, patellam vero manu in sedem suam cogere. Genu luxato imponendus est pannus, vtrique ad medium fere incisus, seu funda. Fascia, a femore orsa, circa quod illa bis voluitur, descendit per poplitem ad tibiam, quam etiam circumnit. Illa deorsum sursumque, quasi in cochleam, serpit, et totum articulum ea ratione, ac de cubito dictum (1183), comprehendit. Patellae, si sola emota fuit, ea parte, in quam illa excidit, obiiicitur densior pannus, et circumdatur fascia, quae

quae *uniens* dicitur (515). Est habena in duo capita soluta, per quam, medio in longitudinem incisam, alterum caput traiecitur, ita, vt, dum capita in diuersas partes adducuntur, habena valentius articulum comprehendat. Iterum fascia ad eandem rationem articulum complectitur.

§. 1206.

Sura, quam etiam fibulam vocant, supra infraque tibiae iuncta, media dehiscit. In supremo surae capite paruus et parum desidens sinus est, cui respondet tuberculum, quod summum tibiae caput e latere parteque externa habet. Hic articulus breuibus validisque ligamentis adstringitur. Ligamento suram cum externo femoris condylo connecti, supra retuli (1202). Surae etiam caput tendine musculi bicipitis illigatur. Sura intumescit ad talum, et e latere in sinu, qui, tum in tibia, tum in talo, est, insidit. Hoc surae inferius caput, vulgo malleolum externum vocant, quod maiorem partem extra haec ossa situm est, illis et ossi calcis pluribus breuibus et validis ligamentis constrictum, inhaerescit. Etiam media parte, vbi tibia et sura, infra supraque iunctae, dehiscunt, haec ossa alio valido ligamento, quod inter ea medium est, continentur.

§. 1207.

Incidere potest, vt etiam sura diducatur, et e sede sua moueatur, quae sine intentione digitis tantummodo bene pressa in sedem suam reuertitur. Quia vero plerumque vis illis ligamentis destituta est, os, quod expeditius reponitur, minus fideliter continetur, et multo facilius excidit, si membrum vel parum mouetur. Igitur os, admotis vtrunque densioribus panis, fascia comprehendendum est, et aeger diu lectulo detinendus, ne, si membrum moueat, sura, laxioribus adhuc ligamentis, rursus erumpat.

§. 1208.

Pes ex septem ossibus tarfi, quinque metatarfi, digitis, constat. Pollex in pede duo ossa habet. Tibia atque sura, sibi inferius iunctae, extrema sua parva sinum profundum habent, quo excipitur astragalus vel talus, qui, superius cartilagine mollitus, quadam parte parum sinuatus, quadam excessus habens, illis ossibus respondet. Hanc iuncturam vtrinque tuentur sic dicti malleoli. De externo supra (1206) relatus est. Internum exigit inferior tibia, qui processus latere cum talo committitur, et pluribus ligamentis continetur.

§. 1209.

Talus super os calcis situs est, et parte inferiori a posteriori sinuatus, medium tuber huius ossis recipit. Os calcis parte anteriori et superiori excisum recipit anteriorem tali partem. Hic, parte anteriori gibbus, coniicitur in parum desidentem sinum ossis navicularis. Os calcis anterius cum osse, quod, figura, cuboides dicitur, committitur. Haec ossa omnia pluribus validissimisque ligamentis connectuntur. Glandula maior mucosa (1099) haeret in profundo magnoque sinu, qui in pedis parte exteriori inter talum et calcem est, ex qua glandula humor, vel axungia, in articulum destillat.

§. 1210.

Talus in omnes quatuor partes prolabi potest. Vbi autem in exteriorem pedis partem excidit, necesse est, surae inferius caput, vel frangi, vel, infirmatis ligamentis, ab ossibus, quibus illud adiunctum est, distrahi, et e sede sua moveri. Nec talus facile in interiorem partem incidere potest, nisi tibiae processus, seu malleolus internus, fractus fuerit. Si talus in priorem partem prorupit, calx tibiam sustinet, et pene con-

conditur, plantaque porrigitur. Si vero talus in posteriorem partem excidit, tibia super tali processum, qui antea ab offi naviculari recipitur, sita est, et calx longior, pesque breuior, est.

§. 1211.

Quoniam hic articulus non solum validioribus ligamentis tendinibusque, pluribus etiam arteriis, venis nervisque, comprehenditur, et, quoniam praeter haec omnia plures membranosae vaginae in propinquo sunt, per quas tendines traiciuntur, is non, nisi maiori vi et maiori etiam periculo, expellitur. Oritur enim grauis inflammatio, quae interdum cogit pedem praecidere, vel quod is gangraena periclitatur, vel, quod leuata inflammatione maiores abscessus et fistulae fiunt, atque etiam ossa vitium contrahunt. Articulus saepius intumescit, cui callus circumdatur, qui per quietem increfcit, et flexus eius prohibet. Longe frequentius ligamentorum imbecillitas efficit, vt ossa, maiori vi diducta, quamuis iterum in sedem suam compellantur, parum fideliter contineantur, sed iterum excidant. Si alteruter malleolorum fractus est, et ab offe recessit, callus superincrefcit, ex quo aliquid decoris eo loco amittitur.

§. 1212.

Vt articulus reponatur, necesse est, eum satis extendi, id quod fit, pede et crure in diuersa diductis. Chirurgus, qui talum in sedem suam compellere vult, debet, et calcem, et pedem, manibus complecti, et sic maiori vi adducere. In hoc articulo diligenter est agendum, vt ligamenta confirmentur, et auertatur (1115. 1116), quo minus, et articulus nimium intumescat, et callus per quietem increfcit. Ita vero vincendus est articulus, vt, si os in anteriorem, vel posteriorem, partem emotum fuit, linteolum, vel pan-

pannus quadratus, vtrunque incisus et quatuor capi habens (*funda*), media parte, qua is integer est, os quod excessit, obijciatur, et vt eius capitibus articulus comprehendatur. Si vero os in exteriorem, vel interiorem, partem fuit prolapsum, panno oblongo, qui calcem quoque comprehendit, conteguntur malleoli. Iniicitur fascia, quae, a tibia orsa, et erus, et pedem comprehendit, et circumeundo, cochleae in modum descendit ascenditque. Facienda omnia, vt articulus quae saltem esse in eiusmodi re sanitas potest, reddatur.

§. 1213.

Etiam plantarum ossa inter se, et cuboides ac naviculare, a calce et talo diduci possunt, id quod fit, si pes aliqua re, veluti cancellis ferreis, irretitus, maiori vi adducitur. Pes ita emotus in contrariam partem conuertendus est, id quod difficilius fieri solet. In metatarsi digitorumque ossibus nihil ultra fieri debet, quam, quod in his, quae sunt in manu, positum est. Si ligamenta disrupta, vel iis adeo exiguum robur relictum est, vt confirmari satis nequeant, praestat quandoque pedem protinus praecidi.

† Omnes haecenus propositae pedum extremorum affectiones semper fiunt sic, vt ligamentis, tendinibus, nervis et vasis magna vis adhibeatur, ab eademque partium earum magna relaxatio, haud raro etiam ruptura, efficiatur. His igitur, quae luxationis aut subluxationis aut distorsionis causa fieri debent, actis, medicamenta quoque adhibenda sunt, quae et robur relaxatis restituere, et stagnantia discutere possint. Puls paratur ex oui albumine, aceto vini antea agitatione remixto, addito post pulvere tenuiori boli armenae, imponiturque linteo denso, quod pedem undique contegat. Si huius copia non fuerit, eius vicem expleant imposita splenia, expressa quidem ex saturata admodum muria. Cum autem haec cito arescant, et post horas viginti et quatuor vel triginta sex demum detrahenda sint, pili, si qui sunt, ante illorum impositionem nouacula detondi debent. Elapso illo horarum spatio detrahantur illa, adhibeanturque discutientia calida, ex vino, vel ex orygerato cocta, affuso his quoque vini spiritu, et crebro mutantur,

vt pes in interioribus suis satis percalefiat. Homo praeterea diu ab omni ingressu abstineat, et paulatim, fero demum, pedem ad pristinos vsus reducat. Si quiete obriuerit articulus, cerato, emplastro, vnguento neruino et aromatico, leni frictione, simul vtendum. Sin tumor articulum tenet, aut si omnino de relaxatione partium et noua offensione et facili metus est, adhibenda est moderata constrictio pedis et articuli, fasciis a chirurgo diligenter applicatis, vsque dum satis confirmatus sit articulus.

Α Γ Κ Υ Λ Ω Σ Ι Σ.

§. 1214.

Articuli etiam ex varia occasione rigescunt, ita, vt eorum flexus prohibeatur, quae vitiorum genera *ἄγκύλας*, vel *ἀγκυλώσεις* veteres appellauerunt *. Siquidem interdum ossa, eorumque epiphyses, circa articulos intumescunt, id quod in corporibus, quorum humida vitata sunt, praecipue puerorum, rhachitide negrorum, fieri, alibi dictum est (1065. 1066. 1071). Etiam, si os iuxta articulum fractum fuit, callus nimium superincrescit, quo articulus impletur, et ossa ita iunguntur, vt vnum super alterum moueri nequeat. Interdum incidit, vt, si ligamenta ictu, vel vulnere, grauiter laesa sunt **, ossa per quietem inter se cohaerescant. Nam ligamenta ex vulneribus, magnisque suppurationibus, praecipue, si postea male inducra cicatrix fuit, rigescunt contrahunturque et membrum contractum curuumque reddunt. Hoc etiam musculorum vitio, quibus crus flectitur, in genu accidisse legimus, cum illi ex neruorum distentione distracti obriguissent ***.

* Vid. CELSUM Lib. V. c. 18. §. 28. PAVLVM Lib. IV. Cap. 55. p. 71.

** Vid. CHESELDENS Osteographia Tab. XLVII.

*** Vid. H. A. R. Sc. MDCCLXXVIII. p. 283.

§. 1215.

Crebrius autem in variis articulis, praecipue in cubito genuque, hoc incidit, ut ex intus incrementum coactaque axungia, seu illo humore, intumescant quem in omni articulo esse, supra ostendi (1099). Huius rei initium esse solet ex ictu atque vulnere quoniam maior illius humoris vis in articulum defluit (485. ad 487). Etiam ex ossis fractura, et, si membrum diutius sine motu in canaliculo, vel lectulo, continendum fuit, illudque post curationem non protinus exercitatione ad usus suos promoueri potuit, hoc incidere solet. Si articulus excidit, et ligamenta nimium fuerunt violata adductaque, vel, si is neglectus et non protinus repositus fuit. Etiam, si ligamenta et alia occasione immodico diuturnoque flexu et pressu vel inflammatione, quae ex varia occasione nascitur violata infirmataque fuerunt. Morbus frequens et metallicis, qui, genibus, quibus saxum frigidum contingunt, nixi, opus faciunt. Nam hac ratione, et ligamenta infirmantur, et frigore humores densantur quod illas expirationes, quae ex omni corporis parte efferuntur, coercent.

§. 1216.

Si os in articulo fractum fuit, et hic ex callo incrementum crescente rigidus factus est, vitium nullam curationem recipit. Si per nimiam quietem obrigit articulus membrum motu flexuque iterum ad antiquos usus reducendum est. Motus enim in dolore nocet, quod humor semper in sedem, quae dolet, euocatur, hoc vero se remittente, exercitatio saluberrima est. Si ligamenta ex vulnere per cicatricem contracta sunt, illa foueri oportet ex aqua, vel oleo calido, adhibita infractione (226). Superimponi possunt epithemata ex herbis, quae emolliendi relaxandique vim habent (91). Si

autem nimium ligamento deest, nulla id curatione constituitur. Aegro (1214), cui muscoli contracti sunt, profuerunt balnea, cui herbae incoctae fuerant, quae roborant. Vtiliter etiam illi muscoli vnguento eruino (1116) perunguntur.

§. 1217.

Si autem tumore, aliisque indiciis, cognoscitur, humor humorem coisse, ab initio plurimum proficit ipsa articuli exercitatio. Motu enim concretus humor enuatur et discutitur. Si malum autem vetus est, experiri licet medicamenta. Super articulum prius imponi debent cataplasinata, quae emolliunt (91). Quae tanto magis necessaria sunt, si tumor durus est, et, cui, digito pressus, renititur. Post autem quandoque proficiunt emplastra, de galbano, de ammoniaco, cui iaphoreticum Mynsichti et oleum tartari foetidum diici potest, nec non epithemata ex falsilagine, vel nuxia, qua haeces conditae sunt, et ex qua herba abinae, rutae, coquuntur, addito aceto, vitriolo et lumine. His enim alterna vice superhabitis, cutis exasperatur, pustulaeque excitantur, quibus quandoque humor euocatur et discutitur. Prodesse etiam solent thermae, si in eas membrum demittitur, et si in hoc illae ex alto destillant. In his curationibus per multum tempus perseverandum est *.

* Vid. LE DRAN *Observ.* 93. et 94. p. 254. Qui non thermas naturales, sed alias, arte compositas, aquas, articulo crebrius et per longum tempus instillavit (Galli vocant *les Douches*) et post superhabuit vesicas calida plenas. Tandem linteis calidis operuit articulum et aegrum in lectulo continuit. Duos aegros is hac ratione resituit.

§. 1218.

At, si tumor vetustior est, et ex eo his nihil minuitur, scalpelli opera necessaria est. Nec tamen ad hanc festinare convenit, si corpus mali habitus, vel senile

fenile, est. Incidendus est tumor e latere, magis cura habita, ne ligamenta, quibus e latere articulus continentur (1178. 1202), praecedantur. Emittere humor, pressio etiam parum tumore. Nec alienum est, per plagam calidum liquorem, veluti decoctum agrimoniae, cum aqua vulneraria (222. 295), in articulum compellere, ut humor, qui saepe, iuris gelati instar, coit, crassusque est, discutiatur. Plaga dimissa linamentis claudenda est, ut per insequentem dies id, quod humoris reliquum est, emittatur. nullum eius vestigium apparet, recipienda sunt linamenta, et vulnus, observatis omnibus, quae supra exsecutus sum, curandum (485. ad 487). Etiam videndum, ne ex cicatrice articulus rigescat (1214), neque is laxioribus ligamentis erumpat (1104. 1114. 1116).

F R A C T A.

§. 1219.

Ossa interdum ex humidorum vitio fragilia fieri supra retuli (1032). Quod morbi genus, nec efficacior, nec alia medicina, subtrahere potest. Senibus, et qui scorbuto morboque venereo aegri sunt praecipue, si malum vetus, et iis omnis fere medulla exhausta, vel vitiata et corrupta, est (1031), frequentius, quam caeteris, ossa franguntur. Etiam id crebrius hyeme, quam aestate, fieri, peruulgata opinio est.

* Vide, inter plures observationes in Autoribus supra (1032 **) citatis, commemorabilem historiam SAVIARDI *Observ. chirurg. Obs. 62. p. 273.*

† Ossa fragilia fieri ex vario, contrario etiam, vitio humorum nota res est. Siue enim succus medullofus atque medulla deficient, siue non satis olei admixtum habeant, pericula necessaria flexibilitas ossium virtuti elasticae iuncta, et ossa facile franguntur. De his prolixè agere iam non vacat. Ut autem ossa franguntur, ita quoque fit haud raro, ut

non frangi videantur, quam dirumpi, quando scilicet iis nimium emollitis vis externa modo certo quodam et ita applicatur, ut partium mollium instar rumpantur. Sed cauendum est, ne, ubi ossa ex maiori mollitie in locis quibusdam nimium mobilia sunt, et figuras artuum mutarunt, protinus solutionem continui subesse arbitremur. Meiniui me quondam curare puellam, variis morbis infantili aetati ex acido-mucosa humorum indole accidentibus laborantem. Cum vero per annos duos et amplius, alio medico accersito, mihi de statu eius nil quicquam innotuisset, tandem denuo in auxilium sum aduocatus, quod parentes os senioris dextri fractum esse putabant, et ipse quoque adhibitus chirurgus, inter nostrates peritissimus, per hebdomadam aliquot spatium in eadem opinione fuerat, donec tandem os non fractum, sed molle et flexile esse iudicaret. Dimissus is est a patre puellae, homine importuno, aliusque, annis quidem aet non doctrina grauior, adductus. Hic quoque splenia, ferulas et fascias aliquandiu adhibuit. Cum ego autem femora diligenter pertractarem, facile ostendi et parenti et chirurgo, chirurgi prioris sententiam nimis veram esse; nam non modo femur, quod fractum esse iudicassent, sed alterum etiam pro lubitu in omnes formas figurari absque ullo puellae iam quinquennis dolore posse. Itaque omnem apparatus spleniorum, ferularem et fasciarum inutilem esse. Puella elapso post anno tabe est absumpta. De morbosis affectionibus ossa ad facilem fracturam disponentibus legi meretur *Dissertatio, sistens morbum osteosarcomaeos, singulari casu et epicrifi illustratum*, Praefide G. FR. SIGWARTO, Auctore et Resp. EMANUEL CHRISTIAN PLANK, Tubingae 1781.

§. 1220.

Crebrius autem ossa finduntur, franguntur, collidunturque, si iniuria extrinsecus accessit. Illud omnibus ossibus commune est. Nam, id in capite fieri, praexecutus sum (509. ad 513. 523. ad 568). In ceteris ossibus fractis communes quaedam curationes sunt, quaedam in singulis generibus propriae. In quibusdam membris, quandoque alterum os, quandoque vtrunque, imo nonnunquam plura, confracta sunt. Os, vel transversum, vel obliquum, fractum est, atque id ipsum interdum retusa, nonnunquam unguata, capita habet, quae carnem aliasque partes vulnerant.

T t

nerant.

nerant. Etiam aliquando plura fragmenta a fragmento sunt, quae inter se cohaerent, interdum etiam recedunt. Ossa fracta aliquando in suis sedibus remanent, multo saepius excidunt. Non raro ossis fracturae, vulnus, tumor, inflammatio, abscessus, accessio vel ossis, quod fractum collisumque est, articulus etiam excidit (1103. 1119). Raro euenire solet, ut rectum, veluti lignum, in longitudinem fissum sit.

§. 1221.

Fracta curaturum scire oportet ossium numerum, figuram, situm, ordinem, nexum, commissuras, durti-
tiem, mollitiem, raritatem, laeuorem, nec non eorum medullam, excessus, sinus, appendices, cum his musculos, quibus conteguntur, et qui super iis finiuntur, arterias, venas, neruosque, qui in propinquo sunt.

§. 1222.

Os fractum esse, scire licet, si illud grauiter percussum fuit, vel ei alia iniuria accessit, cui resistere non potuit. Si fracta suis sedibus mota sunt, alique super aliud effertur, membrum altero breuius est, et musculi tument. Nonnunquam ossium fractorum et inter se recedentium capita, et oculis, et tactu cognoscuntur. Fracta enim tactu inaequalia sunt, multum etiam, moto membro, indolescent. Ea quae, si membrum intenditur, inter se diduci flectique possunt. Quandoque fragmentorum, si alterum super alterum mouetur, asperitudo auribus percipitur (1197).

§. 1223.

Si os in longitudinem fissum est (1220), quod caluaria (530) frequentius, in caeteris ossibus rarius euenire arbitror, id, etiamsi is casus totum os peremerit, ab initio, et post illatum ictum, vix certa non explorari potest. Nam, nec membrum altero breuius est

esse solet, nec os tactu inaequale. Locus etiam nihil, vel parum, intumescit et dolor, qui a periosio carnisque vexatis nascitur, opinionem fracti fissique ossis frustra facere potest. Ex notis vero, quae sequenti tempore oriuntur, commune est, membrum dolere, qui dolor vero, in hoc casu, nec per se conquiescit, nec impositis medicamentis submouetur, sed vetustate ere asperior fit. Ossis etiam membrana tactu magis indolescit, eo loco, ubi os fissum subest, si illa digitis extrahatur. Dolor in ipsis medullis vehementius rescit, si membrana, qua ossa interius cinguntur (1030), fissio ossis, violata inflammataque est (1065).

† Ossa fistulata in longitudinem findi posse non pauci dubitarunt. Non desunt tamen observationes hoc genus fissurae asserentes. Inter eas commemorabilis est illa, quae legitur in SCHMUCKERI *Vermischten chirurgischen Schriften, Vol. I.* Corporis dissectio post obitum ex alio morbo accidentem docuit plenam eius rei veritatem.

§. 1224.

Nunquam vero conuenit, fracturam tactu explorari, nisi aeger in lectulo, vel loco collocatus sit, ubi fracta in sedem suam compelli et membrum deligari commode potest. Quare, si id in cruribus femoribusque incidit, ante omnia homo super lectulum collocandus est. Etiam, ubi ossa, quae inter se recesserunt, iterum reponenda sunt, necesse est, ut unus, vel plures, ministri hominem, qui curabitur, contineant, atque immobilem praestent, ne agitatione, et dolor intendatur, et maior moueatur inflammatio.

§. 1225.

Melius coeunt ossa, quae transversa fracta sunt, quod alterum alteri innititur. Peius est, quod obliquum fractum est, praecipue, si non retusa, sed acuta, habet capita, quae etiam ossis membranam carnesque ulnerant. Ossa etiam collisa, et, si eorum plura

fragmenta sunt, difficiliter committuntur. Si haec fragmenta non inter se cohaerent, sed vndique resoluta, non suo loco sunt, illa cum caeteris non glutinantur. Etiam in his casibus, et ubi fragmenta veluti aculeis, membrana carnesque vrgentur, graui inflammatio et febris et suppuratio sequitur, atque nonnunquam gangraenae periculum. Fragmenta vero si res bene cedit, emoriuntur, et, suppuratione ore excidunt. Si iam vetustas fracturam occupat, et ossa quod, vel non reposita, vel saepe soluta motaque sunt, non conferbuerunt, illa vix sanescit*. Difficiliter etiam ossa in senibus, grauidis, lue venerea, scorbuto, cachexia, laborantibus glutinantur.

* Vid. IOHANNIS SALTZMANNI Diss. de Articulationibus analogis, quae fracturis ossium superueniunt, Argentorati MDCCCXVIII. et figuram vide in Act. Erud. Lips. Ann. MDCLXXXV. p. 513. Tab. XIII. Fig. 4.

§. 1226.

Grauius multo est, cum ossis fracturae carnis quodque vulnus accessit, maxime, si ex his ossis membranae inflammantur. Nam eiusmodi inflammationis maius periculum est, quae, vel ad suppurationem spectat, vel promptiorem gangraenam habet. Si os iuxta articulum fractum est, ἀγκύλωσις manere, supra retinetur (1214). At, si os ea parte fractum est, per quam arteriae venaeque maiores ad intima, ipsamque medullam, tendunt (1031. 1033); si ossium fragmenta arteriae, venae, nervi, tendines, pleura, medulla spinalis, violantur, id periculosum est. Si os in longum fissum est, id difficiliter cognoscitur (1223), et metum facit, ne medulla vitium contrahat (1065). Humeri brachiumque citius, quam femur et crus, sanescunt.

† Fissura per totam tibiae longitudinem protensa callo impleta post spatium annorum duorum vid. in SCHMUCKER Vermischte. chir. Schriften, Vol. I.

§. 1227.

§. 1227.

In fractis curandis tria obseruanda sunt. Oportet a, quae suo loco non sunt, committere, atque fragmenta in suas sedes compellere, membrum impositis annis et super accommodatis ferulis deligare, et pericula, quae incidere possunt, auertere.

§. 1228.

Si ossa fracta in suis sedibus remanent, et non exi-
dunt, non opus est, vt committantur. Si vero suis
sedibus mota sunt, oportet protinus membrum exten-
dere, obseruatis omnibus, quae supra praecepi (1110.
d 1113). Ossa loco suo non esse, deprehenditur, si
membrum altero latere breuius est, muscoli tument,
et tactu inaequale est, et aeger dolorem punctionem-
que sentit. Si membrum, quod extendi debet, valen-
ius est, id duobus eget, qui in diuersa contendunt.
Raro opus est, habenis vel fasciis, capita ossium deli-
gari, et membrum per plures, vel etiam adhibito po-
yspasto, intendi (1110. 1111. 1173).

† Artuum fractorum, si breuiiores facti, extensione opus esse,
neque aliter reponi et componi recte posse quisque videt.
Fit autem id in hominibus robustioribus haud facile, non
quod osseae partes resistent suae diductioni, sed quod muscu-
li non facile cedunt. Minus tamen ii resistent, si artui
flexio modica ab Chirurgo ipso datur. Hac de re non pa-
rum multa nouissimis annis a chirurgis Britannorum scripta
sunt. Legas si lubet: *Somme few Remarks on Fractures
and Dislocations.* By PERCIVAL POTT. London 1768.

§. 1229.

Fracta, si loco suo mota sunt, oportet ante inflam-
mationem reponi. Si vero haec iam membrum occu-
pauit, difficile et periculose vis musculis adhibetur,
quare membrum laceffendum non est, sed post leua-
tam inflammationem id, quod exciderat, reponendum.
igitur expedit, sanguinem mittere, atque imponere
epithemata, quae aduersus inflammationem maxime
valent.

valent, donec haec ab iis soluantur, et post ossa committere. Sanguinem detrahi semper fere necessarium est, ubi cum ossis fractura vulnus accessit, vel, vel maiori vi vexatae carnes collisaeque ossa sunt. Nam membrum ex inflammatione variis periculis expositum est, praecipue, si haec periostium occupat, quare pericula, sanguinis missione, etiam si res postulat, iterata auertenda sunt.

† Cum nulla res ossibus fractis magis noceat, quam eorum noui motus ac tremores, magni ad felicem curationem momenti esse quietem tum totius corporis, tum et praecipue partis affectae, nemo non intelligit. Quodsi igitur homo ita affectus e loco in locum geri debet, cura maxima habenda est, ut quam minimi aut nulli motus tremoresque caput ossis fracti fiant. Itaque prius recte reponi componique fracturam oportet, atque obligari ac munire machinamento, quod fragmenta quam fieri potest immobili praestet. Prae aliis placet id, quod IONATHAN WATHELI proposuit; est enim non admodum compositum; vid. *The Conductor and containing splints, or a new instrument for the safe conveyance and cure of fractures of the Leg.* London. 1767. Parte ita curata, homo ipse commodissime et tutissime ab aliis hominibus gestatur. Sin eorum copia non est, currus ita adaptandus est, ut aegrotus tremores non sentiat. Hoc autem facile fit. Currus lateribus pannus ex linteo affigendus est, ut veluti in cunis ponatur aeger, currus vero lento motu protrahatur, vitenturque aspera strata. Sed. vid. quoque *Monum. Acad. R. Chir. Par. Vol. II.*

§. 1230.

Si plura ossis fragmenta sunt, ea, si membrum intenditur, manu digitisque in sedem suam dari oportet. Casus asperior est, ubi fragmentum deorsum insedit, idque medullam urget. Excitari illud debet, etiam foramine facto et demisso vecte (508). Si qua fragmenta eminent, quae in suas sedes compelli commode nequeunt, ea, si longiora sunt et valde acuta, ferrula, vel forcipe, praecidenda, et scalpro laeuanda committendaque, sunt. Ne fragmenta undique resoluta emoriantur, et pus moueant (1126), protinus incidi
contra

ontra cutim oportet, et ea, quae haud glutinabuntur, vossella extrahi. Relictus enim sinus callo imlebitur. Si fragmentum parum cum membranis ohaeret, id scalpello, vel forfice, praecidi potest.

* Forcipem delineavit GARENGEOT *des Instruments T. II. pag. 233.*

§. 1231.

Indicium ossis repositi est dolor et punctiois sensus sublatus, atque, si membrum alteri aequale est.

§. 1232.

Nec vero, si membrum deligandum est, adeo necessaria sunt medicamenta, nisi inflammatio, vel alia noxa, accesserit. Veteribus in more erat imponere emplastrum, praecipue id, quod, ad hos usus compositum, catagmaticum vocatur. Illud vero minus opportunum esse, scire licet, quod nimis resinosum expirationes cohibere, et carnes nimium mollire, ad glutinanda vero ossa haud quidquam facere, potest. Qui emplastris suam fidem addixerunt, illi vti possunt compositione FELICIS WÜRTZII, defensionum viride vocant Chirurghi *. Emplastra non totum membrum debent circumire, sed necesse est, ut in membro aliquid, quod iis non contegitur, relinquatur. Fere melius est, si os fractum inuoluitur linteolo simplici paulo latiori, in vino, vel spiritu vini, tincto, quod ex altera parte in longum sectum, ea, qua integrum est, fracturae iniicitur, ita, ut capita et priorem ac integram linteoli partem atque membrum circumeant et comprehendant.

* FELIX WÜRTZENS *Practica der Wundarznei* p. 425. No. I. Dispensator. Argentorat. p. 75.

§. 1233.

Super hoc linteolum iniiciuntur fasciae. Prima, brevissima, circa fracturam ter voluta, sursum versum,

T t 4

cochleae

cochleae in modum fertur. Altera, priori aduertit etiam super fracturam incipit, deorsum tendit, atque iterum ad fracturam reuersa, circa eam semel atque iterum voluitur, et in superiori parte vltra priorem fasciam finitur. Superaccommodantur ferulae, quibus submittuntur oblongi densique panni, vel splenia, et omnia vinciuntur fascia, vel, id quod magis opportunum est, angustioribus valentioribusque ligulis.

† Artus fractos deligandi rationem a PLATNERO descriptam, quae et vetustissimis temporibus adhibita est, hodie plurimum chirurgorum artis frequenti usu clarorum reiiciunt, quod et fasciarum longarum applicatio satis arcta non sine ossium fractorum dimotione quadam fieri, neque tamen ad ossa in situ et nexu retinenda quicquam prodesse possit, et sperare omnis ponenda sit in recte accommodatis ferulis. Itaque non iis, sed fascia duo de viginti capitum, artum obvolvunt, siue cum vulnere mollium partium complicata sit siue simplex fractura. Iisdem rationibus nixi alii poterunt fascias omnino omnes contemnere.

§. 1234.

Ita vero circumponendae sunt ferulae, ne venae maiores comprimant. Nam, hoc si incidit, tumor nascitur (728. 729). Nec fasciae, nec ferulae, nimis adstringendae sunt, quia id, quod nimis adstrictum est alienatur, et gangraenae opportunum est. Si vero fascia non satis continet, ossa iterum e sede sua elabuntur. Si ligulae et fasciae laxae visae sunt, oportet illas iterum attrahere. Membrum vero, praecipue brachium, cum id deligatur, protinus ita inclinandum est, ut ante figuratum sit, ne postea suspensum, aliter, atque cum deligabatur, inclinari oporteat, et ne quidam musculorum violenter, et magis, quam alii, adducantur (1111).

† Materia, e qua ferulae fieri possunt, est varia admodum. Aliae parantur ex charta conglutinata plus minus densa et crassa; aliae ex corio denso, et crasso; aliae ex ligno tenui, aliae ex metallo mallei ictibus ad flexilem tenuitatem ita redactae, ut formam variam accipere possint, sed tamen faci-

nis resistant. Ex stanno paratas quidam aliis praeferunt. LOEFLERVS chirurgus in Saxonia inferiori clarus, iubet eas parari e linteo et virga balaenaria, fere vt thoraces (*Schnürbrüste*) vulgo componuntur. Hoc genus caeteris eo praestat, quod elasticae sunt satis, nec tamen nimium resistunt, humiditatem ferunt. Binis opus est, quarum altera altera duplo latior est. Latior in regione artus inferiori, altera in superiori adhibetur. Ita autem adaptari artui debent, vt eum totum comprehendant, artus longitudinem aequent, et in capitibus necessarios, et articulis accommodatos arcus repraesentent. Cruribus et femoribus fractis recteque compositis quoque accommodant ferulas ex ligno metalloque, minus tenues de his vid. THEDEN in SCHMUCKERI *Vermischten chirurgischen Schriften*, Vol. I. De illis RICHTERI *Biblioth. chirurg.* Vol. V. E quocunque autem materiae genere paraueris ferulas, semper tamen aequae longas atque artus, quibus applicantur, esse, et circa loca articulorum commodissime, sine vlla aegroti molestia, sedere debent. Hoc genere munitus artus subinde alium positum accipere potest, sic vt modo extensus sit, modo aliquantum flectatur, neque tamen metus sit, ne ossis fracti capita, recte composita, ab mutuo contactu recedant.

§. 1235.

Quomodo agendum sit, si, cum ossis fractura, articulus excidit, qui casus ex difficilioribus est, supra (1119) retuli.

§. 1236.

Membrum deligatum continendum est, vt per quietem ossa fracta, incrementum callo, glutinentur. Igitur, si, vel ingulum, vel humerus, vel brachium, vel ipsa manus, fracta fuit, brachium suspenditur, et, vel mitella, vel canaliculo, excipitur. Necessesse est, brachium suspensum, ad latus leniter, pollice paululum ad pectus inclinato, deligari, qui naturalis brachii habitus est. Per haec enim fit, vt membrum minime moueatur. Ne etiam hoc fiat, dum homo forte digitis aliquid prehensurus est, manus pilam contineat. Etiam pes coniicitur in canalem ligneum excisum, cuilibet homini eiusque membro accommodandum *, in arculam PETITI **, vel in linteum valens, quod

vtrinque duo bacilla habet, stramine linteoque obluta ***. Habere debent haec omnia a planta morae quae pedem sustineat, cui, ne offendant, insternendus est densior molliorque pannus. Calci submittitur culcitellus in medio depressior et futura diuisus, habena mollior in duo capita, parum adstrictæ, remissius, glomerata. Nam necesse est, ut calx modice cubet. Super membrum collocatur arculus quo stragula, ne membrum premant, sustinentur. Alia membrum vincendi ratio est, si fracturae vulnus accessit, de qua infra dicam.

* Excidendus est ligneus truncus, ita, ut is membro fasciæ suis et ferulis inuoluto respondeat, et hoc commodè accipiat. Talis canalis fere necessarius est, ubi fracturae vulnus accessit, et ob id fascia adhiberi debet, quae ex viginti capita habet, quippe quae non satis fracturam continet.

** Vid. Hist. A. R. Sc. MDCCXVIII. pag. 396. *des Maladies des Os*, pag. 285. GARENGEOT *des Instrumens*, Tom. I. pag. 324.

*** Gallis *les Fanons*, Germ. die Strohlade, vide BASCH *Tab. XV*, pag. 239.

§. 1237.

Deligato collocatoque sic membro, sanguis longè minus inde, ubi noxa, et metuenda inflammatio est, mitti debet. Primis diebus fames imperanda est, vel abstinentia a fame propior. Vbi autem, leuata inflammatione, incrementum coepit callus, liberalius alimentum commodum est. Nec tamen hoc iunioribus adeo necessarium, quam senectute confectis. Fascia antea decimum quartum diem non resoluitur, nisi aliquando ex inflammatione periculum sit. Ossa tamen, quorum magna varietas est, citius tardiusque sanescunt et calli firmanantur. Quod si autem fascia resolui debet, opus est duobus ministris, qui ea ratione, quam supra (§. 1228) praecepi, in diuersa contendunt, et ossa non tam extendunt, quam in sede sua continent.

§. 1238

§. 1238.

Vbi suspicio est, os in longitudinem fissum esse (1124), protinus plurimum sanguinis incisa vena subtrahi debet. Imperanda est quies et abstinentia, pro corporis, longissima. Vinum, et valentioris generis otio, per omne tempus aliena est. Non, nisi sublata inflammatione, et conquiescente dolore, victus paulo lenior dari debet. Parum proficiunt medicamenta, quae discutiendi vim habent, si superdantur.

§. 1239.

Si autem os cum vulnere fractum est, et sanguis ex hoc cum impetu ruit, is protinus suppressendus est. Conquiescente sanguine membrum extendendum, ossaque reponenda sunt. Omnia curiosius agere oportet, ne vulnere noua iniuria accedat. Postquam huic, quae donec sunt, imposita fuerunt, membrum prius linteo soluendum est lato, quod fasciae respondet, et utrinque semel ad medium fere in longum incisum est. Confert, hunc pannum in liquore (1232) tinctum esse. Superiniicitur fascia ad id aptata, quae duo de viginti capita habet. Haec capita ita collocantur, ut utrinque non solum membrum vulnusque comprehendant, sed etiam vnum caput alterum, quod oppositum est, contineat. Superaccommodandae ferulae sunt. Quoniam autem illa vinctura, quam hic propter purgandum nutriendumque vulnus adhiberi conuenit, fere laxior est, et propter id etiam fascia quotidie resoluenda est, cura adhiberi debet, ut membrum recte collocetur. Id optime fit, si in canalem ligneum excisum (1236*) coniicitur. Vbi fascia resoluatur, membrum a duobus extendi et ita contineri debet, donec id, impositis etiam ferulis, deligatum fuerit (1234. 1237). Id tanto magis necessarium esse solet, si obliqua fracta nulli retuso innituntur, et metus est, ne, contractis
museu-

musculis, vnum os super aliud efferatur. In hac ratione perseuerandum, donec vulnus glutinatum os callo firmatum fuerit.

§. 1240.

Si super fracturam inflammatio oritur, et hanc fistula puratio sequitur, cura habenda est, vt puri exitus fiat. Pus enim adipem et cellulofam tunicam, quae inter musculos est, perrumpit, et oriuntur fistulae (944). Id auerti potest, si membrum ita collocatur, vt pus efferri queat. Etiam hoc exprimitur, si principio sinus, vel fistulae prius purgatae, imponuntur panni denfi gradatique (24) et fascia adstringuntur (18). Vbi iam sinus altius penetrauit, commode, emissio specillo, ad vltimum eius caput inciditur cutis (478. 953), vt pus exitum habeat.

§. 1241.

Ossa vero conferuent illo succo, quo aluntur, quod in callum duratur, et quasi ossis cicatrix est. Callus etiam rimae et foramina inter ossa, quae inter se non cohaerent, implentur et glutinantur. Callus autem interdum nimius, et non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem, increfcit, ita, vt locus tumescat et membrum indecorum fiat. Hoc iunioribus praecauteris incidit, qui victu pleniori humidoque vtuntur, si laxior vinctura adhibetur. Quare in his fascia, quantum potest, adstringenda est, et imperandum, vt plurimum cibo dematur. Vbi callus vetustate confirmatus est, is raro extenuatur. Num hoc sperari possit, emplastrum oxycroceum, vel Vigonis, cum mercurio imponitur et adstrictius alligatur, experiri quilibet potest.

§. 1242.

Aduersus dolorem (447. ad 453), inflammationem (28. ad 101. 156. ad 168), gangraenam (169. ad 203) spasmus

passum, neruorumque distentionem (455), ea proficiunt, quae alibi praecepi. Si haec ab acutioribus fragmentorum capitibus et pungentibus aculeis projecta sunt, oportet protinus ossa committere, et omnia, obseruatis iis, quae supra (1231) comprehensa sunt, recondere. In his magnus inflammationis et suppurationis timor, atque ob id nihil magis necessarium est, quam, ut sanguis protinus, et iterum, mittatur (1237).

§. 1243.

Interdum membrum non tam dolet, quam prurit, id quod oritur, si emplastra superdata fuerunt, vel vnguenta adhibita, nec non, si impositi panni sordidi et pure ac sanie obliti sunt. Etiam illud incidit, si ferulae nimis coarctantur. His, si origo non ignoratur, facile occurri potest. In omnibus adhibenda munditia est. Sordes commode absterguntur liquore, qui aquam habet et alcohol, vel aqua vulneraria (480).

§. 1244.

Si in membro, quod deligatum est, oedema (729) oritur, vel gangraenae (182. 1235) timor est, ferulae et fasciae resoluendae, et, si ossa recte reposita fuerunt, aliter superaccommodandae sunt.

§. 1245.

Membrum tenuius, quam ex consuetudine, fieri potest, si id adstrictius vinctum fuit. Hoc si post fracturam sanatam deprehensum est, conuenit balneis uti, et membrum etiam plurimum perfricare (conf. 1116). Multum iuuat exercitatio, et si membrum, quod extenuatum est, si potest, per se, sin minus, per alium, mouetur. Multum etiam proficit thermarum stillicidium (1217), et, si cutis vrticis caesa exasperatur. Etiam vtiliter admoventur cucurbitulae. Vete-

res candens ferramentum impresserunt. Experimentum fieri potest, et membrum in animalis viui, vel cens macerati, incisum ventrem demitti atque for per huius naturalem vaporem, id quod recenti re pr esse potest. Haec non statim, sed paulum saltem, vant, et profectus tempore expletur, quare diu in curationibus perseuerandum est.

§. 1246.

Vbi ossa etiam conserbuerunt, locus diu per candus est liquore, qui alcohol habet. Imponi et per tempus potest emplastrum oxycroceum.

§. 1247.

Haec communia sunt, alia vero propria. In na bus ossa frangi solent, modo aduersa, modo e late. Crebrius vulnus accedit, et fragmenta, quae defec runt, vrgent laeduntque membranam, qua nares int cinguntur, quam grauibz inflammationibus afficiunt. Ex hac re suppurationes, vlcera, polypi (776), nascu tur, et ossa etiam vitium contrahunt (1032. 1046). Expedita huius fracturae cognitio est. Nam si adue sa fracta sunt, ea vtrinqz desidunt, et difficulter si ritus trahitur.

§. 1248.

Qui curabitur, in aduerso sedili collocandus est, a posteriori parte minister caput contineat. Specillum vel aliud ferramentum paulo plenius, mollioribus namamentis cinctum, in nares demittitur, et, eo subiecto atque extrinsecus digitis prementibus, quicquid des idit, excitatur et in sedem suam reponitur.

§. 1249.

Peius est, vbi, aut cuti, aut interiori membranae vulnus accessit. Hoc curare oportet medicamentis non aliis vero, quam, quae ossibus inimica (523) non sunt.

unt, quae plerumque in his casibus nudata esse solent: Optime liquori illi, vel aquae vulnerariae, pauciores guttulae essentiae myrrhae et mastichis adiiciuntur. Hoc medicamentum, vel essentia vulneraria Stahlii (387. 592), in nares coniiciuntur, id quod specillo inamentis inuoluto fit, vel etiam spiritu attrahitur, si os iam vitiatum est, adluci potest parum olei caryophyllorum.

§. 1250.

Quidam censuerunt pinnas, vel fistulas plumbeas, mollibus linamentis, emplastroe, circumdatas, intus in nares iniicere, quae desiderare ossa non sinunt. Haec vero raro necessaria sunt, quod ossa, si in sedes suas excitata sunt, plerumque consistunt, et non facile iterum excidunt: Fistulae etiam et pinnae, quamuis intus aquae sint, spiritum fere intercludunt, et membranarum tiam offendunt. Extrinsecus vtrinque naso imponuntur panni, et his superacommodatur charta densior glutinata, ita, ut haec paululum emineat. Omnia continentur circumdata fascia.

* Huius etiam varii modi sunt. Fere commodissima est, quae ex habena fit, et quae, in medio et vtrinque in longitudinem scissa, fundam repraesentat. A media fascia, quae ibi in longum secta est, incipiendum est, ut pars suprema iniiciatur inferiori naso, pars inferior supremo labro. Sic enim aditus ad nares manet. Quatuor, quae habet, capitum duo superiora ad cervicem, et ab hac, per utramque genam et nasi radicem tendunt, ubi vnum super alterum fertur, vtrumque vero caput hominis circumeundo finitur. Reliqua duo capita per cervicem, et ab hac, per supremum hominis caput, circumaguntur, et priora comprehendunt. Alia fascia, quae accipiter MENECRATIS (15****) appellatur, est linteolum, aut panniculus triquetrus, qui infra duo foramina habet, quae naribus respondent. Supra ei assuta est habena brevior, ab utroque vero latere alia longior. Superior per nasum frontemque ad cervicem datur, illae vero, quae a latere sunt, vtrinque ad cervicem, et ab hac per genas ad nasi radicem, non aliter procedunt, ac de prioris fasciae capitibus dictum est, et tum hominis caput, tum supremam illam habenam, amplectuntur. Habena, quas oportet angustiores

res esse, ita super genas volui debent, ne iis oculi contingantur.

§. 1251.

Proprie etiam quaedam de maxilla inferiori dicenda sunt. Nam et haec interdum vehementiori ictu praecipue calcitrantis equi, frangitur. Plerumque ossa etiam fracta non inter se recedunt, sed consistunt. Vbi autem ossa vehementer vexata et e sedibus sumota sunt, casus multo asperior est, quia nervus, qui a quinto pari ad maxillam inferiorem, omnesque inferiores, pertinet, distenditur, quam rem magni dolores, nervorum per vniuersum corpus distentione cum aurium sonitu, sequuntur. Etiam rupta illa arteria, quae per maxillam discurrit et dentibus alimentum subministrat (1086), sanguinis profusio oritur, quae difficilius supprimitur (248. 543).

§. 1252.

Si fracta maxillae ossa in suis sedibus remanent, protinus accommodari vincitura potest. Si vero exciderunt, illa prius in suam sedem recondenda sunt. Homo ea ratione, ac supra de luxata maxilla scriptum (1129), collocatur. Chirurgus digitos vtriusque manus, vel pollices, vel indices, linteolis inuolutos in os demittit. His ab ore, aliis extrinsecus a mento prementibus, fragmenta reponuntur. Superiniiciendum est linteolum spiritu vini madens et pannus densior cum charta glutinata, quae circum maxillam posita ei superaccommodatur et fascia continetur.

* Fascia, quae capistrum, Gallis *le chevestre*, dicitur, in vnum caput glomerata, et a summo capite orsa, ad capitis tempus dextrum deorsum et super fractam maxillam, et ab hac sursum versum per tempus sinistrum ad summum hominis caput, fertur, vbi ea primum fasciae caput sistitur. A summo capite illa retro ad ceruicem datur, et ab hac ad maxillam reuersa, hancque amplexa, cochleae in modum, per tempus dextrum ad summum caput, et ab hoc, iterum ad ceruicem, fertur. Vbi ab hac ad maxillam ventum est, iterum sursum

tendit; Retro data per ceruicem ad maxillam antrorsum fertur, et super anteriùs mentum bis agitur, ita, vt hoc comprehendat, et posteriora versùs agat. Tandem, postquam iterum deorsum sub maxillam venit, hanc et caput ceruicemque priori ratione amplectitur, et vtrinqùe sursum versum, cochleae in modum, seu per asciam, ascendit, et postquam aliquoties caput circuiit, in fronte finitur. Eisdem vincturae etiam apta est habena, in duo capita glomerata, quae media sub maxilla incipit.

§. 1253.

Eum, cui maxilla fracta est, oportet primis diebus, ne loqui, nec esse, cum metus sit, ne, agitata maxilla, sedibus suis moueantur fragmenta. Diu itaque assuendus est humidus cibus, veluti lac, iura, oua forbi, iura gelata, atque in hoc victu et quiete perseuendum, donec maxillam callus firmauerit. Si cum iactura vulnus est, hoc non aliam, quam, qualem dixi, asciam desiderat. Nam haec ossa, si semel reposita sunt, etiam, resoluta fascia, plerumque in suis sedibus manent. Sanguinis missio necessaria est, si ictu nervus affectus fuit.

Vid. LE DRAN T. I. Obs. 3.

§. 1254.

Etiam iugulum, ictu, casuue ab alto, vel transuersum, vel obliquum, frangitur. Id scire licet, si humerus, quem iugulum sustinet, in pectus inclinatus est, si homo humerum leuare non potest. Etiam illa iuguli fracti pars, quae a pectore, et immobilis est, in loco suo manet, et super alteram, quae ab acromio est, quae cum humero descendit, effertur. Res etiam palis tactuque deprehenditur.

§. 1255.

Iugulum, si fractum est, nec alia ratione, nec maiori negotio, reponitur, quam luxatum (1157), difficius vero in sede sua continetur. Peius est, si os obliquum fractum, vel collisum, est, et fragmenta a frag-

V u

mentis

mentis recedunt, quae, si acuta sunt, incisa contra cutem extrahi debent. Nam in hoc casu, praecipue ea parte, quae a pectore propior est, metus esse solet, ne maior arteria venaque, quae subclauiae dicuntur, viderentur. Vbi ossa inter se committenda sunt, non quod a pectore est, et immobile, deprimi, sed humerum attolli et retro dari oportet.

§. 1256.

Repositis omnibus, in illos sinus, qui in macilenti supra infraque iugulum sunt, commode coniiciuntur linamenta ex albo oui expressa, quae, vbi arida facta sunt, ad iugulum in sede sua continendum plurimum faciunt. Opponitur ossi fracto pannus densior, et per hunc, praesertim, si quid ab aliqua parte eminebat iniiciuntur duo splenia, quae transuersa posita figuram literae X accipiunt. Vbi vero iugulum deligandum est, dissimilis casus quaedam dissimilia requirit. Nam si os transuersum fractum idque repositum est, in priorem partem humerus adducendus, cubitus autem posteriorem propellendus est. Si vero os obliquum fractum est, humerus retro dandus, et brachium paulo magis in priorem partem promouendum est. Et fasciae iniiciendae, et eadem faciendae, quae supra (1153) comprehensa sunt. Maior cura adhibenda est, ut humerus recte collocatus sit. Quare brachium non solum mitella, vel canaliculo, suspensum, sed humerus etiam ad latus adductum, atque ad id fascia deligatur et immobilem esse oportet (1161).

† Ad commodam atque felicem sanationem fracti iuguli nullum magis opus est, quam humeri summi retractione. Quae cum hactenus notae rationes fasciarum vix ac ne vix quidem sat effecissent, BRASDOR in *Monum. Acad. R. Obir. V.* descripsit et pingi curauit aliam, et commodiorem et certiore. Est genus thoracis, quod non pectus sed dorsum tantum modo contegit, quod in parte superiori vtrinque ligamen ex corio adfuturum habet, in parte vero inferiori vtrinque clauus vnicuique est. Ligamina illa per axillas a fun-

mo humero ducuntur per clauos vncinos; quo fit, vt fere pro lubitu et necessitate rei retro agi humeri cum scapulis queant. Imaginem fasciae vid. in L. c. itemque in RICH-TERI *Bibliothec. chir.* Vol. III. P. I. In eiusdem Bibliothecae Vol. V. P. I. EVERS, Chirurgus haud ignobilis, in fascia ea nouauit nonnihil, idque icone addita oculis legentium subiecit, atque curationum ea perfectarum triadem enarrauit; quas legisse haud poenitebit.

§. 1257.

Latum os scapularum etiam ictu frangitur colliturque. Si spina, quam id habet, transuersa fracta fuit, fragmenta in suis sedibus manent. Si vero ossis anterior pars collisa fuit, saepe aliud fragmentum super aliud effertur. Minus periculum huius fracturae esse solet. Vbi vulnus accessit, aliquando superuenit emphysema (519. 621 *** 644).

§. 1258.

Fragmenta suis sedibus mota digitis prementibus recondenda sunt, ad quod necessarium est, vt, quantum fieri potest, humerus in partem priorem anterioremque porrigatur, ita, vt hominis cubitus naso aduersus sit. Minister ita continere debet humerum, quo chirurgus ea, quae emota sunt, in sedes suas dare possit. Interdum vero res cogit, incidere scalpello cutim, et fragmenta extrahere. Superimpositis idoneis lenfioribusque pannis fascia iniicitur, et brachium ita ad latus deligatur, vt humerus supremus in priorem partem adducatur, cubitus vero retro detur.

* Si dextra omoplata fracta est, fascia primum sub ala sinistra obuoluta, per pectus super humeri dextri caput fertur, quod comprehendit, et per pectus eadem ratione ad alam sinistram tendit. Bis ita circumagitur, et humeri in priorem partem attrahuntur. Tandem vero, fascia humeri sinistri caput amplexa, ad omoplatas tendit, circa quas eadem ratione et paulo laxior circumagitur, vt eas contegat, et pannos impositos contineat. Humerus autem fascia ad latus, et brachium mitella ad ceruicem, deligari oportet, vt membrum sine omni agitatione contineatur.

§. 1259.

In scapula etiam ictu illato frangitur ille maior et latefcens processus, quem acromium vocant. Tactu id cognoscitur. Si humerus parum leuatur, fragmenta quidem facile committuntur, multo facilius vero iterum excidunt. Fascia iniicienda est, quam supra luxato humero (1176) idoneam dixi. Ad ceruicem brachium paulo adstrictius et ita deligandum suspendendumque est, vt illud minime moueatur.

§. 1260.

Costae vel media gibbaque parte ita franguntur, vt fragmenta, in interiora inclinata, pleuram offendant. Nonnunquam illae totae perfractae sunt, saepe autem non suprema, sed interior, earum pars, quae rara est laeditur, et exasperatur. Quod vbi incidit, grauis movetur inflammatio, quam febris sequitur, cum spirandi difficultate, dolore, suppuratione, et aliis periculis. Etiam sanguis exspuitur, et emphysema (519. 619. 644. 1257) oritur, maxime, si fractura cum vulnere est *. Euenire etiam potest, vt a fragmentis laedantur arteriae venaeque intercostales, quae res interdum mortem maturat (643).

* Vid. LE DRAN T. I. Obs. 29.

§. 1261.

Si igitur costae perfractae et intus datae sunt, interdum licet eas in suas sedes restituere, si illae et ea parte, qua cum spina, et altera, qua cum sterno, committuntur, multum premuntur. Imperandum est aegro, vt is, dum sic costae vtrique premuntur, spiritum contineat, id quod propter dolorem difficile est. Interdum, si costae in antiquum statum haud reuertunt, res cogit, cutim, musculos, pleuramque incidere et demisso digito costas in sedem suam excitare (650). Vbi deligantur, costarum extremis imponuntur multi

multi densique panni, et iniicitur fascia, quam mantile cum suspensorio vocant (623. 700. 1139). Sanguinis detractio, fames, quies, et alia, quae aduersus inflammationem maxime valent, in aliis vtilia, in hoc asperiore casu, valde necessaria sunt (626).

† Splenia illa extremis costae fractae partibus imponenda habeant longitudinem et latitudinem pollicum trium, crassitiam duorum, et ne loca sua relinquunt, fascia circumducta acu et filis firmanda in ipsis est. Ista autem deligandi ratio non semper protinus adhiberi potest. Nam si pulmo a spiculis fracturae laesus est, fit, vt §. 1260. dictum, emphysema non raro amplum admodum. Hoc igitur antea discutiendum est. Discutitur autem, si in loco fracturae imponitur splenium tres pollices latum longumque, duos vero crassum, atque antea expressum ex humore, qui ex albumine ouorum, pauco sale et aqua compositus est. Id fascia firmatum et appressum relinquitur spatio horarum viginti quatuor. Et quia tumor subsidet, fascia, quoties relaxata videtur, non quidem mutanda sed plica subinde facienda, atque acu filoque stabilis reddenda.

§. 1262.

Raro costae ita franguntur, vt in exteriorem partem et cutim versum erumpant. Hoc accidere potest, si pectus vtrinque valentius comprimitur. Hoc fracturae genus minus periculi habet. Manibus digitisque costas ea parte, qua perfractae sunt, interposito vtrinque pollicis spatio, deprimi oportet, et in suas sedes compelli. Obiicitur ea parte, qua costae fractae minebant, pannus densus, et super hunc duo splenia, quae, transversa posita, figuram literae X accipiunt.

§. 1263.

Si arteria, venaue intercostalis, rupta fuit, et ex ea sanguis cum magno periculo fluit, noua plaga facienda, et arteria, vel lino vincienda, vel digito et admotis instrumentis ex alcohol expressis comprimenda est, eademque facienda, quae supra (643) comprehensa sunt.

* Nouum ferramentum mihi oblatum est, ad comprimendam arteriam intercostalem aptatum, cuius iconem vide fig. XIX.

§. 1264.

In vertebris interdum illi processus spinosi, quos in posteriorem partem exigunt (1131), franguntur. Quares etiam facit, ut homo in anteriorem partem subinde nitatur. Si illi aliquo modo effracti cum vertebris cohaerent, oportet eos excitare, et ad latus ponere pannos densiores, et superiniicere fasciam (1261). Si processus totus perfractus labat, fere melius est, cutem contra incidi et eum educi.

§. 1265.

Casus multo asperior est, si ipsae vertebrae perfractae et medulla violata est. Ea enim pericula sequuntur, quae supra (1135) retuli. Nec vlla plerumque huius rei curatio est*. Idem casus manet eos, quorum os sacrum transversum perfractum est. Exteriores partes, si fractae sunt, non tamen valde collisae vinciendo seruataque quiete glutinari posse existime. De coccyge supra (1151. ad 1153) dictum est.

* Commemorabilem historiam de viro cum vertebrae fractum per octo annos superstiti vid. in Ephem. Nat. Cur. Cent. Obs. I.

§. 1266.

Quod si ex pectoris osse quid fractum sit, is locus maioribus periculis expositus esse solet. Nam, si totum casus perrupit, grauis pleurae et mediastini inflammatio et suppuratio, et vitae periculum, sequitur (717). Etiam os illo loco valde rarum aliis iniuri sub tenui cute expositum est, et hac occasione vitium contrahit. Hoc si incidit, tumores supernascuntur qui ad suppurationem spectant, et mala vlcera cum carie relinquunt. Si aliquid ex osse insedit, illud incisa cute excitandum est, obseruatis omnibus, quae supra (558) praecepi. Si os confractum, nisi alio foramine facto excitari nequit, illud modiolis excidi potest, quae curatio necessaria est, vbi sub osse in mediastinum quo

quod hoc loco cellulofam tunicam inter duas membranas mediam habet, pus, vel alius humor, confluit *. Caetera eadem fiunt, ac de ossibus vitiatis praecepti 1046. ad 1064).

* Hoc morbo laborauit ipse AVINZOAR, qui eum diferte describit Lib. II. Cap. VI. de *Apostematibus*, quae sunt in panniculo, quod diuidit pectus in longitudinem in duo. Vid. plura in FREIND'S *History of Physick* T. II. p. 91. et in Operibus p. 494. De perforato sternone vid. Obseru. in *Commerc. Litter.* MDCCXXXI. p. 281. et MDCCXXXIII. p. 410.

§. 1267.

Nec multa de humero, si is fractus est, proprie dicenda sunt. Homo collocatur in alto sedili, et membrum, quod parum attollitur, lentius intenditur a duobus, qui humerum comprehendunt et in diuersa conueniunt. Raro necessarium est, ut hoc habenis fiat, quibus humeri superius inferiusque caput deligantur. Si os transuersum et ita fractum est, ut vnum os super alterum consistat, necesse est, ut brachium, quod vel nitella, vel fascia, vel canaliculo excipitur, adstrictius et ita suspensum sit, ut paulo magis attollatur. Vbi autem os obliquum fractum est, haec vinctura laxior esse debet, ut membrum magis dependeat. Si iuxta superiorem articulum fractura est, illa opinionem lutati ossis facere potest, et articulus in periculum venit, ne rigescat (1214. 1226). Illi loco non satis apta est habena, quae circa membrum voluitur, quare adhiberi potest fascia, quae duo de viginti capita habet (1239).

† Os humeri in superiori parte, haud procul a collo suo fractum eam rationem fascias applicandi, qua id in medio fractum curatur, haud admittit. Adhibenda est pulvis aliqua, breui siccitatem contrahens. Paratur vel ex bolo, vel gypso, vel amylo, albumine oui cum pauco vini aceto, satis spissa quidem. Ita paratam pulvem excipit linteum quadruplex quatuor digitos transuersos latum. Et hoc circumdatur loco ossis fracti, antea recte compositi. Humerus vero fascia latiori satisque longa, ut et truncum et humerum aliquoties circumire possit, trunco ita applicatur, ut et cubitus flexus sit, neque humerus sine cubito, neque hic sine illo moueri

moueri queat. Itaque fit, vt truncus vice ferularum optime fungatur. Humeri summitas pulte eadem illa contegitur. Post tres quatuorue dies resoluitur fascia illa, splenium vero cum pulte illa diffecatur, aliudque ex saturata mur expressum in eius locum substituitur, iterumque fascia similem adhibendo humerus trunco corporis applicatur. Verum ea omnia ita fieri debent, vt ne humerus villo modo aut eleuetur aut moueatur. De his aliisque huc pertinentibus vid. *Monument. Acad. R. chir. Vol. V. itemque Constitutiones &c.* par LE DRAN.

§. 1268.

At, si brachium fractum est, imprimis considerandum oportet alterum os, an vtrumque comminutum sit. Quod enim integrum est, alteri auxilio esse potest. Illud cognoscitur, si membrum manu comprehenditur et altera manu hominis palma in prouum atque supinum conuertitur. Nam os, quod integrum est, superprementibus digitis consistit, et renititur, fractum indidem cedit. Illud ligamentum, quod inter ossa medium est (1184) os fractum ad alterum adducit.

§. 1269.

Valentius extendi oportet membrum, si vtrumque os fractum est. Si vero radius solus perfractus est, membrum parum, et ita, intenditur, vt manus inclinetur ad minimum digitum, ad pollicem vero, si i cubito accidit. In continendis ossibus omnia curiosius et paulo magis adstrictis fasciis ferulisque fieri oportet, si duo ossa, eaque obliqua, fracta sunt. Nam vbi alterum integrum est, plus opis in hoc, quam in fasciis ferulisque, esse solet. Panni valde angusti, secus densi ac multiplices, nec non similes ferulae, vtrinque inter duo haec ossa super ligamentum, quod inter ea medium esse dixi, imponenda sunt, nihil vero horum supra infraque et super ipsa ossa dandum est.

§. 1270.

Quod si ex palma, manu, digitisque, aliquid fractum sit, nihil noui aliud curatio requirit. Ferulae digitis

digitis aecommodandae sunt, quae ex charta coacta glutinataque fiunt.

§. 1271.

Ex summo femore ceruicem frangi, supra retuli (1192), et notas etiam, quibus id scire possumus, exsecutus sum (1196. 1197). Nunquam os ea parte vinciendo glutinari et membrum in antiquum statum reuerti potest. Fascia (1210) primis diebus iniicitur. Nec ignorari oportet, medium femur, maxime si illud obliquum fractum est, breuius fieri, quia id plenioribus et validioribus musculis adducitur. Si in femore cum ossis fractura carnis quoque vulnus accessit, id magnis periculis expositum esse interdum solet. Os enim, nec recte tractari, nec facile committi, nec satis contineri potest. Curiosius magnaue adhibita diligentia omnia agenda, et ferulae valentiores adhibendae, sunt.

† De fracturis ceruicis femoris legatur LVDWIGII, quondam Ordinis Medici Lipsiensis Decani docta commentatio *de collo femoris eiusque fractura*, itemque SABATIER Dissertatio in *Monum. Acad. R. chir.* Vol. IV. calci adiecta.

§. 1272.

In patella quaedam quoque sunt, quae notemus. Quibus musculis ligamentisque illa contineatur, alibi (1203) dictum est. Ea super femur tibiamque innata, nulli ossi inhaerens, si articulus flectitur, sursum versum, si extenditur, deorsum, mouetur. Plerumque transuersa frangitur, id quod incidit, si homo, flexo articulo, lapsus, patellam saxo, vel alii duro, impingit *. Protinus fragmentum, quod supra est, contractis plenis validisque musculis sursum mouetur, et ab eo, quod infra est, multum diducitur. Hoc vitium difficilem curationem habet, quia illud superius fragmentum non sine negotio adduci, et alteri inferiori, quod in sede sua manet, iungi atque multo difficilius contineri potest. Maius periculum est, si pa-

tella a parte infima frangitur; vel, rupto illo ligamento (1203), distrahitur **. Proximus etiam articulus contracti rigescentisque metus est, si plura fragmenta sunt, quod ubi incidit, superincrescit patellae nimium callus, qui flexum postea prohibet. Maxime tolerabilis fractura est, si hoc paruum os in longum fissuram fractumque est.

* RVYSCHII Obs. Anat. chirurg. III. patellam a sola valentiori extensione musculorum sub flexu articuli fractam vidit. De fracta patella vid. PARAEVS de fracturis Lib. XIV. Cap. 22. et HILDANVS Cent. V. Obs. 88. PVRMANNVS in Chirurg. P. III. Cap. 21. p. 858.

** Vid. *Transact. Ang.* No. 365. p. 44. et in the *Abridgement Vol. VII.* p. 678.

§. 1273.

Patellam transuersam esse fractam,prehenditur si medius locus inter fragmenta, quae inter se dehiscunt, cauus est, id quod, et oculis, et tactu cognoscitur. Quo vero patella iterum in sedem suam reponatur, et fragmenta inter se iungantur, necesse est, membrum collocari in scamno, atque, quantum potest, extendi, depresso etiam ministri manibus femore, adductoque ab alio ministro crure. Hominem planta pedis contra parietem niti oportet. Interea Chirurgus fragmentum superius manibus digitisque leniter reducit, pertractatis etiam illis, quibus adhaeret, musculis (1203) donec hoc cum inferiori possit committi.

§. 1274.

Vt vero patella sic recondita possit coire, a variis varia excogitata sunt *. Optimum est, si fascia adhibetur, et patella vinciendo glutinatur **.

* PVRMANNVS orbem, quem ex filo ferreo et linamentis struxit, adhibuit v. l. c. MASIERO *Opere Chirurgico Ragionamento V.* p. 198. vsus est duobus coriis valentioribus, quae membrum supra infraque comprehendunt. Addidit figuram; quae coria post ab aliis mutata fuerunt. GARENGEOT

GEOT *des Instruments* T. H. p. 300. machinam proposuit ferream. Sed his omnibus praeferenda est illa vincendi ratio.

* Popliti submittitur linteum, quod vtrinque duo bacilla paulo pleniora habet, quae stramine linteoque obuoluta sunt (1236). Ferula et splenium multiplex densumque proxime popliti submittitur, interque illum et linteum ponitur, quo arteriae venaque, quae per poplitem descendunt, custodiantur. Inter membrum et bacilla vero ad latus eius poni debent multiplices panni, vel, quod fere melius est, plures, sed minores ac tumentes, puluilli. Super patellam conicitur linteolum, quod, quadratum, sed vero et vtrinque, et in medio, in longum, fundae in modum, incisum est. Nam in medio etiam linteolum incisum esse oportet, ut, quamvis deligato membro, patella oculis pateat. Super supremam patellae oram transuerse collocatur pannus valde densus et multiplex, angustus vero et paulo adstrictius conuolutus. Super hunc iniicitur fascia, pollicem lata, valentior, medio orsa, quae et ille densior pannus et illa duo bacilla cum linteo circumdantur. Fasciae capita, ubi ex poplite supra illum densiorem pannum reuerterunt, dexterius sinistra, sinisterius dextra, procedunt, vtrinque autem sub poplitem tendunt, ita, ut ille densior pannus, et cum hoc patellae fragmentum, deorsum inclinentur et alterum fragmentum versum adducantur. Sub poplite iterum alterum fasciae caput super alterum fertur, et interea infra patellam super tibiae caput collocatur alius pannus, aequè densus, quam fascia, quae a poplite venit, simili ratione amplectitur. Fascia ter ad hanc rationem per poplitem illosque duos pannos circumagitur et adstringitur. Tandem super illud in medio incisum linteolum, ipsamque patellam, imponitur aliud duplex, quo os nudum contegitur. Illius vero prioris linteoli quatuor capita, et per haec etiam ille superior densiorque pannus ipsaque patella trahuntur, quae linteoli capita sistuntur eo, quod fasciae reliquum est, dum huius alterum caput a media patella sursum versum, alterum deorsum, cochleae in modum, serpit, tandemque finitur.

§. 1275.

In crure aequè ad rem pertinet, alterum os integrum manere. Vbi tibia fracta est, id tactu cognoscitur, ubi autem sura, id scitur, si, ea digitis pressa, pes in interiorem exterioremque partem conuertitur (1268). Sura si fracta est, etiam recte reposta, difficiliter continetur, quare eius maiorem curam haberi con-

conuenit. Quoniam hoc membrum inaequale est fasciae, dum illud circumeunt, inuertendae sunt (10) vel id, quod cauum est, impleri potest densioribus gradatisque pannis. In planta digitisque nihil vltius fieri debet, quam, quod in his, quae sunt in manu positum est.

SANGVINIS DETRACTIO PER VENAS.

§. 1276.

Incisa vena sanguinem mittere, expeditissimum videtur, quod tamen aliquando, si venae latent, neque facile reperiuntur, difficile, et non sine graui periculo est. Venis enim iunctae sunt arteriae, nerui, tendines, et aponeuroses, quas partes omnes, si scalpellum attigit, plura genera sequuntur, in quibus noxa corporis est (428. 448. 449. 426). Etiam metum facit, si scalpellum altius demissus alteram partem venae perripit, ita, vt ex plaga, quae subtus patet, sanguis feratur, et ἐκχύμωσις oriatur (712). Chirurgum, qui sanguinem mittendo curaturus est, oportet vel maximum talem esse, qualem CELSVS * requirit.

* Lib. VII. Praef. (vid. II. *).

§. 1277.

Ad id vtuntur hodie scalpello ancipiti, quem *Lanceolam* vocant. Hoc genus fere commodissimum est, quod id manu stabili recte demitti et ita dirigi potest, vt illo vena, non tam pertundatur, quam inclinata paulum manu, incidatur. Commode etiam, si hoc genus adhibetur, vena sine periculo maiori plaga aperiri potest, quae necessaria esse interdum solet, vbi sanguis crassus coactusque euocandus est.

§. 1278.

§. 1278.

Aliud genus ferramenti, minus opportunum est, quo veteres vsi sunt. (Germ. eine *Fliete*) Bacillum paulo longius in extremo latescens et in aciem tenuatum est. Id recipiunt inter duos digitos, aciem venae imponunt et digito alterius manus in eam sic depriunt, vt simul cum cute etiam vena aperiatur.

§. 1279.

Alii vero huic ferramento accommodauerunt elatrem, et, praeter hunc, eidem adiecerunt minorem laminam, quae axim habet, quo, vt in torcularibus per cochleam, conuerso, illa lamina attollitur et demittitur. Lamina enim in extremo inflexa et in anulo incisa est, per quam incisuram descendit acies. Lamina ea parte, qua incisa est, imponitur venae, qua prohibetur, quo minus acies elatere mota altius in venam descendere et eam altera etiam parte percurrere queat. Hoc ferramento minori dolore aperiuntur venae in pede. Fig. XX. Eo ferramento vtatur chirurgus, cuius vsum habet.

§ 1280.

Si vena latet, digitus illi loco prius admouendus est, cognoscendumque, an in propinquo sit arteria, nam cordis motu sub digito attolli nemo ignorat. Quo vero vena, quae incidi debet, infletur, et se ostendit, oportet illam super locum, quo aperienda est, ligare, et digito comprimere. In pede haec vinctura fere superuacua est, qua non tam venae, quam tibiae, surae, et maior ille tendo Achillis, premuntur. Id necessarium videtur, super venam densior pannus poni, et fascia adstringi, potest. Commodius est, pedem in aquam bene calidam demitti. Etiam, vbi venae in brachio se non satis ostendunt, sponsia calida

madens super illum locum, qui incidendus est, collocatur.

§. 1281.

Venae in longum inciduntur, non ita bene tranversaе, cum sic incisae non tam facile coeant. Venae tamen exiles obliquas incidi interdum oportet, crassior sanguis exire possit. Ob id etiam expediret venam infra cicatricem aperiri. Igitur, quibus sanguis primum mittitur, iis vena, veluti mediana, in superiorem et a corde propiori parte incidenda est. Vena, ex qua sanguis detractus fuit, digito infra plagam comprimatur, plagae imponitur panniculus quadratus, et initur fascia. Panniculum ex variis liquoribus exprimere solent, reliquis omnibus vero praestare videtur frigida aqua.

§. 1282.

Sanguinis detractionem requirunt potissimum tria. Si eius copia male habet, illa demitur. Interdum verum hac detractione sanguinis cursus auertitur, et in aliam partem euocatur. Observatione enim compertum est ex ulterioribus locis sanguinem in eam partem, e qua is missus est, aliquantum quasi trahi.

* Sanguis mittitur propter euacuationem, derivationem et reuulsionem. De priori nemo dubitat. Derivationem et reuulsionem plures cum sanguinis vitali motu et circulo consistere posse negant. Sed vero vena, ex qua incisa sanguis effluit, minus sanguini in eam per arterias influent resistit, quam, si illa integra est, et sanguine plena. Ipsi enim in vena contentus et compressus sanguis alii succedenti moram ponit. Igitur, quia maior in vena incisa facilitas est recipiendi sanguinem, maior huius vis in eam influit, quam in caeteras, quae integrae sunt. Et haec est derivatio. Dum vero plus sanguinis in venam incisam, et prius in arterias, fertur, ex quibus venae, quae ad incisam venam pertinent, educuntur, illud detrahatur sanguini in alias arterias fluibundo, quae res efficit reuulsionem. Plurimum etiam confert illud vitale robur fibrarum, quod, tum arteriae, tum venae, tum etiam muscoli, aliaeque partes, per quas hae diuiduntur, habent. Quemadmodum enim omnis corporis viui pars, quae dolore, veluti admo-

tis

tis acrioribus, afficitur, in tumorem leuari et inflammari solet, id quod accidit, quia maior sanguinis vis fertur ad eas arterias, quas pars, quae laborat, habet; ita, si sanguini nimia copia peccanti vel propter perniciores motum in febre aliisque occasionibus turgenti exitus incisa vena datur, is in eam ipsam partem, ex qua is effusus fuit, euocari videtur. Nam ille motus, quo plus humoris per unam arteriam ac per aliam fertur, a solo corde proficisci nequit (31). Vid. GORTERI Compend. Tr. XLVI. §. VIII. p. 235. Per omnem vero aetatem maxima controuersia de eligenda vena in variis morbis, praecipue in curanda pleuritide, fuit, de qua vide RENATVM MOREAV de Missione sanguinis in pleuritide, qui, dum PETRI BRISSOTI Apologiam vitamque ederet, omnium medicorum sententias de hoc argumento exsecutus, dedit succinctam, sed doctissimam, Medicinae historiam. Haec controuersia quanta contentione VESALII tempore agitata fuerit, discitur ex literis SIMONIS PIETREI ad GVERINVM in Vita BRISSOTI l. c. p. 115. VESALIUS scripsit Epistolam ad NICOLAVM FLORENATEM, Caroli V. Imperatoris Medicum, de Vena axillari dextri cubiti in dolore laterali secanda, Montisferati MDXXXIV. Libellum ideo adduco, quod a Celeberrimis Viris BOERHAAVIO atque ALBINO, qui VESALII Opera ediderunt, is fuit omissus. VESALIUS eius mentionem facit in Epistola de radice chinae, in Operibus T. II. p. 672. quaedam etiam habet DOUGLASSIUS in Bibliogr. Anat. p. 72. Confer, quae in doctissima commentatione de pleuritide habet Celeberrimus mihiq. amicissimus TRILLERVS Cap. II §. 30. p. 28. Inter recentiores, qui de hoc argumento scripserunt, invenio HECQVETVM, SILVAM, MEVRISSEVM, CHEVALIERIVM, MORISSONVM, QVESNAIVM, MARTINVM, omnes Gallos, et BVTLERVM, Britannum.

† De Derivatione et Reuulsione a sanguinis missione impetrandis. vdi. Dissertatio a me edita 1764.

§. 1283.

Igitur, si totius corporis et demendae materiae usa sanguis mittendus est, id commode ex brachio. Si vero sanguinis cursus auertendus est, confert, quam longissime, ubi laedit, mitti. Nec tamen hoc perpetuum est. Nam interdum, in casibus recentius, et, si grauis noxa timetur, veluti, si caluaria fracta fuit, vel etiam in ipsa pleuritide, satius est proximum locum prius exhauriri, et post in vltioribus

bus locis iterum sanguinem detrahi. Si vero sanguis propius a loco, qui grauatur, emittitur, eius plurimum, et quantum aegri vires sustinere possunt, detrahendum est.

§. 1284.

Etiam sanguis, si aliqua parte cum periculo prae-rumpit, in corporibus plenioribus alia parte mittitur, ut, alio dato itinere, desinat fluere, qua nolumus. Haec res prudentiam medentis exigit, ne aeger, quem vult leuare, effusa omni vi praecipitetur.

§. 1285.

Etiam in aliis casibus nocet, si nimium, multo saepius vero, si nimis parum, detrahitur. Non raro praestat, ubi haec medicina necessaria est, illam in bi-duum diuidere, quam nimia detractio corpore repente exhaurire et imbecillum reddere.

§. 1286.

Raro mittitur sanguis ex venis, quae per frontem tempora, et per oculi angulum, qui naribus propior est, feruntur. Ex fronte eum mittere nonnulli iubent animo desipientibus. Illa vero, quae in cantho interno inter nasum et oculum est, inciditur, ubi diutius perseverat lippitudo. Venas, quae per oculi tunicam externam decurrunt, aliquando praecidendas esse, alibi (299. 312) docui *.

* Vbi ex fronte detractus fuit sanguis, plaga deligatur fascia, quam *scapham* vocant. In oculi angulo illa fascia opportuna est; quae aliis oculorum morbis et fistulae lacrymalis accommodata est, et quae dicitur *monoculus*. De temporibus protinus dicam, ubi docebo, qua ratione vinciendo glutinanda arteria sit.

† Vena in cantho oculi interno subiectam habet arteriolam, quae si simul pertunditur, non leuem difficultatem chirurgus affert.

§. 1287.

Etiamnum venae aperiuntur, quae sub lingua sunt, si in variis anginae generibus fauces cum inflammatio-

ne

intumescunt, et spiritus intercluditur. Parum tamen in hoc genere auxilii est, si minori plaga venae inciduntur. Si vero maiori, vel, si illae praeciduntur, nasci potest ex sanguinis profusione periculum. Sanguis enim non facile supprimi potest. Nec enim efficacius auxilium est, quam, si acetum, alcohol, vel alius liquor, ad sanguinem supprimendum valens (IO. 411), ore continetur.

§. 1288.

Valentior autem medicina aduersus varia morborum genera est, ubi sanguis ex venis colli, seu iugulabus, emittitur. Quo illae se ostendant, colli inferior pars fascia deligatur. Vena in longum inciditur: ne negotio sanguis impoſito panniculo et iniecta fascia supprimatur. Vſus huius inedicinae praecipuus se solet, si praecipue periculum est, velut perfracta alvaria, in phrenitide, inflammationibus grauioribus culorum (305. 322), nec non in angina (1287): semper vero, incisa iugulari, sanguis etiam iuxta talos mitti debet *.

* Vid. Doctissimi Viri TRALLES Comment. de Vena iugulari.

† Machinamentum ad compressionem venae iugularis secandae idoneum ab CHABERTO inuentum vid. in *Monument. Acad. R. Chir.* Vol. II. Tab. I.

§. 1289.

Ex brachio si mittendus est, inciditur frequentius mediana. Huic subiecta est aponeurosis bicipitis, quam, si scalpellus attigit, inflammationes sequuntur: asilicae, quam in dextro brachio hepaticam, in sinistro splenicam, appellant, iuncta est arteria et nervus: cephalica tenuis conditaque ut plurimum esse solet.

§. 1290.

In corporibus plenis rarisque brachii venae interum latent, quare aperienda alia est in manu. Ea,

quae, ex vena basilica edueta, ad minorem digitum pertinet, dicitur saluatella, altera, a cephalica inpiens, ad metacarpum tendit, et inter hunc et pollicem descendit. Omnes hae venae frequentius in se per alias medias committuntur. Tenuēs sunt, quo magis prodeant, oportet manum in calidam demitti.

§. 1291.

Crebrius autem iuxta talos inciduntur venae, minori periculo illae, quae, ex crurali edueta, ad maleolum internum fertur et saphaena vocatur. Si venas res cogit, alias magis conspicuas aperiri, cura adhibenda est, ne tendo laedatur. Quies imperanda aegro, ne, vel sanguis iterum erumpat, et ne, id quod crebrius incidere solet, plagae inflammatio superveniat *.

* Hoc etiam ex aliis occasionibus fieri compertum est. Si acies scalpelli retusa, vel, si aqua, in quam pes demittitur impura est, vel si plaga spongia abstergitur, cui areolae aliaeque sordes, adhaerent.

§. 1292.

Maiores illae venae, quae ad colem per huius superiorem partem descendit, interdum, si membrum magis inflammatio cum turgentia tenet, aperiri potest. Magna cura habenda est, ne nervus et arteria, quae etiam huic venae iunctae sunt, laedantur. Vena dum tumefcente membro coit, et comprimitur impositum panniculo atque injecta fascia, illi simili, quam *unientel* vocant, de qua supra dictum est (515. 1205).

§. 1293.

Qualis curatio esse debeat, si scalpello arteria incisa (446), vel nervus tendoque violatus (448. 449), vel ex vena ecchymosis orta fuerit, alibi dictum est (446. 454. 723. 724).

§. 1294.

§. 1294.

Solent etiam sanguinem mittere ex arteriis, praeque iis, quae per tempora discurrunt. Nam, quomodo arteriae non facile coeunt, non alia arteria temere incidenda est, quam, quae subiectum os habet, et, quae ob id valentius potest comprimi *. Vtilis haec sanguinis detractio esse solet, ubi maius periculum ex ophthalmia nascitur, vel, ubi maior oculi inflammatio, ex magna lippitudine exulceratio corneae, timetur. Etiam illa in hominibus plenioribus quandoque ad usum amaurosin potest, et fuerunt, qui sine manifesta causa subito obcaecati hac ratione lumen receperunt.

MARTINVS, Medicus Monspeliensis, iubet etiam in desperatis pectoris morbis arteriam, quae ad manum fertur, et cui subiectus radius est, incidere. *Traité de la Phlebotomie et Arteriotomie*, p. 481.

§. 1295.

Homo in sedili collocandus est, sic, ut caput in alterum latus inclinatum sit. Is, qui curaturus est, caput admo- vit, ut arteriam se attollentem, non nimis tenuem, inueniat. Locum notare potest in collo. Demittitur in arteriam scalpellus, vel acus, vel, qui fere magis aptus est, alius. Transversum non tam inciditur, quam praeciditur, arteria. Plurimum sanguinis ex ea detrahi debet.

§. 1296.

Sanguis vero, qui cum impetu erumpit (353), ubi fluxit, supprimendus est. Super ipsam plagam mittitur charta masticata, ex alcohol expressa, superponuntur panni minores valde densi atque gradati. Inferiorem pannum coniicitur nummus, faba, vel quid durum (24). Ex fasciis vero non alia idonea est, quam ea, quae *nodosa* appellatur *.

Haec, quam etiam *solarem* vocant, parum differt ab ea, quam MEEKREN Obs. XXXVIII. p. 165. delineatam dedit.

Habena valentior, sed angusta, pollicem lata, in duo capita glomerata, a medio et super plagam orsa, caput amplectitur. Vbi duo capita iterum super plagam, et huiusmodi impositos pannos, venerunt, vnum super alterum, et superius super verticem, alterum deorsum, super maxillam ferio-riorem, ad alterius lateris tempus fertur, et ibi huiusmodi capita aliquantum, sed parum, simplici nodo, adstringuntur. Ab eo vero tempore duo capita iterum super locum veniunt, in quo plaga est, et super hanc inter se vincula paulo valentius adducta nodum accipiunt. Iterum huiusmodi capita caput hominis circumeunt, atque, vbi super plagam venerunt, alterum nodum super priorem accipiunt. Eadem ratione tertius nodus nequitur, ita, vt nodus super nodum collocetur. His autem fascia adstringitur et panni, aliaque quae plagae imposita sunt, valenter apprimuntur.

§. 1297.

Sanguis etiam mittitur, si cutis scalpello conciditur, et ei cucurbitula ita imponitur, vt, dum ea inhaerescit, sanguis extrahatur. Cutis conciditur, vt scalpello ad id aptato *, vel machina, in qua plures scalpelli elatere mouentur **. Super concisam cutem cucurbitula aptatur, et, vt ea recte impressa inhaerescat, prius in illam linamentum ardens coniicitur. Diducitur post cucurbitula, et, vbi sanguis nondum fluere desinit, sponsia ex calida expressa extergunt plagae et noua imponitur cucurbitula. Plures, et in versis partibus, et non solum cuti concisae, sed etiam integrae, aptantur imprimunturque cucurbitulae, materiae cursus a nobili parte auerti debet.

* Vid. figura in HEISTERI Chirurg. Tab. XII. fig. 24.

** c. l. fig. 4.

§. 1298.

Antiquissimum hoc medicinae genus est, et quod saepe in morbis longis, praecipue oculorum, capiti aurium, plurimum profuit. Ad id quoque confugendum est, vbi in corporibus plenis rarisque nulla venae patent et sine periculo incidi nequeunt. Etiam haec sanguinis detractio, remedium est aduersus mag-

os laterum dolores, praesertim si his nulla febris accessit *. Obseruatione compertum est, cucurbitulas, incisa prius cute, occipitio vtiliter admoueri, si in pite acutus ac pestifer morbus est, veluti cephalaea, oplexia, neruorum resolutio, marcor, et inexpugnabilis dormiendi necessitas, praecipue, si haec vitia a sanguine, non ab alio humore, nascuntur **.

* Vid. Diss. de Vena sine pari in MORGAGNI Aduers. V. pag. 83.

** Vid. Illustris AVGVSTINI FRIDERICI WALTHERI Diss. de scarificatione occipitis, Lipsiae Anno MDCCXLI.

§. 1299.

Quoniam sanguinis profluuium, quod ex naribus intingit, saepe alios morbos leuat, non pauci, ut in ex naribus detraherent, varias machinas adhiberunt.

* Vid. ARETAEVS, de Cephalaeae curatione, in Morborum Chron. Curat. Lib. II. Cap. 2. p. 128. ALPINVS c. I. Lib. III. Cap. II. p. 168. Dissert. mea de Scarifat. oculorum.

§. 1300.

Alia ratione veteres, concisa cute, sanguinis magnam vim, praecipue ex pedum malleolis, extrahere soliti sunt. Hoc auxilio, nisi id pluribus crudele vi-deretur, plures morbi tolli leuarique possent, praecipue, vbi non tutum videtur, sanguinem ex vena mitti.

* Vid. GALENVS de Hirudinibus Cap. IV. T. X. Edit. Chart. p. 455. ANTYLLVS et APOLLONIVS in ORIBASIO Lib. VII. Cap. XIX. et XXI. in Collect. H. STEPHANI p. 315. et 317. Etiam AETIVS distinguit τὴν σικύωσιν ἀπὸ τῆς ἐγχαράξεως Lib. III. Cap. 20 et 21. p. 50. Edit. Ald. Hanc medendi rationem in vsu esse apud Aegyptios, discimus ex ALPINO de medicina Aegyptiorum Lib. III. p. 166. seq. qui iconem addidit, et ex MANNO, qui epistolam de hoc argumento dedit ad HIERON. FABRICIVM AB AQUAPENDENTE. Hic enim, hanc medicinam, in peste, et aliis grauissimis ac desperatis morbis, saluberrimam esse, experientia edoctus, proficitur. Eam autem, ut crudelem, repudiavit CORTE-SIVS Misc. Med. Decade VII. 281. Conf. FREINDS *History of Physick* P. I. p. 16. in Opp. p. 379. et Dissert. mea de Scarificatione oculorum.

S V F F V S I O.

§. 1301.

Suffusio, Graecis *ὕπόχυσις*, vel *ὕπόχυμα*, aliis Cataracta, dicitur, si vel lens *κρυσταλλώδης*, vel eius velamenta, tunica *ἀραχνώδης*, qua includitur, *ὕαλώδης* qua vitrei humoris sinus, cui lens insidet, cingitur, quas naturaliter perlucentes esse oportet, opacae factae se luci opponunt, et hanc per sui medium hauri transmittunt.

* Nemo ignorat controuersiam de hoc, quod ex frequentioribus est, oculorum vitio, et vera eius sede. Historiam potest Celeberrimum HEISTERVM in Diss. de Cataracta et Glaucomate et PETITVM Medicum in C. A. R. Sc. MDCCXXV. p. 8. singulari studio conquisiuit Doctissimus Vir MORGAGNIUS in Epistolis Anatomicis XVIII. et XIX. quibus in VALSALVAE Dissert. II. Anatomicam commentatus est. Verere enim, et inter hos CELSVS Lib. VII. Cap. VII. GALENVS. Definit. Med. §. 363. T. II. CHARTERII p. 271. et in Introductione, quae ei vulgo tribuitur, Cap. XVI. c. l. pag. 392. PAVLVS Lib. III. Cap. 22. p. 35. et L. VI. Cap. 21. p. 83. Ed. Ald. alique fere omnes, existimauerunt, in humore aqueo inter vream et lentem concreescere humorem, eumque paulatim indurescere. GALENVS et PAVLVS distinguunt ἀπὸ τῆς ὑπόχυματος τὸ γλάυκωμα, in quo, naturalem lentis colorem in glaucum mutari, docent. Haec sententia per plura secula omnium medentium animis insedit, tum, quod illa autoritate GALENI, quam maximam fuisse nouimus, confirmata esset, tum, quod existimarent, omnem videndi facultatem a lente potissimum proficisci. Praeterito autem seculo, suffusionis veram sedem lentem crystallinam esse, primus demonstrasse videtur. FR. QVARREVS, Medicus et Chirurgus Parisiensis clarus, a quo illud CHRISTOPHORVS SCHELHAMMERVS, et ab hoc GVERN. ROLFINCIVS in Dissert. Anat. L. I. Cap. XIII. p. 179. acceperunt. Alii huius rei inuentorem ac principem REMIGIVM LANIERIVM, Chirurgum et Lithotomum Parisiensem, fuisse prodiderunt, id quod GASSENDVS confirmare videtur, qui hoc ab eximio Parisiensi Chirurgo, cuius nomen haud addit, observatum demonstratumque fuisse docuit in Physica Sect. III. Membro II. L. VII. Operum T. II. p. 371. Conf. BRISSEAV in Praef. et PALFIN Anat. Chirurg. T. II. pag. 386. *Les Remarques sur le Cours des Operations de M. DIONIS par DE LA FAYE* p. 554. Etiam id praeterito seculo a multis aliis,

aliis, et inter hos, a ROHAVLTIO Tr. Phys. P. I. Cap. XXV. §. 7. PETRO BORELLO in Append. ad Cent. III. Obseruat. med. p. 279. fuit propositum. Vide MORGAGNVM l. c. Plures tamen maluerunt veterum sententiam conquisitis rationibus tueri, quam rem experimentis inuestigare. Tandem ab initio huius seculi BRISSEAU, Medicus, et ANTONIVS MAITRE JEAN, Chirurgus, fere eodem tempore, incisus post mortem oculis, cognouerunt, in ea chirurgia, qua suffusioni mederi solemus, et sede sua moueri et deprimi lentem. Mathematicorum etiam, et prae caeteris VOPISCI FORTVNATI PLEMPH in Ophthalmographia L. III. Cap. XIV. p. 107. obseruatione, iam dudum probatum erat, lentem ad cogendos sibi et axi appropinquandos lucis radios, praeter id vero ad videndi facultatem, nihil facere, hominem etiam sine lente videre posse, praecipue, si oculi acies vitro adiuuetur gibbo. Egregie hoc confirmauerat curatio Cl. PETITI, Chirurgi. Hic lentem opacam ex oculo per incisam corneam extraxit in homine, cui suffusio bis acu deducta totidem redierat, et tandem per pupillam in partem, vel vulgo sic dictam cameram, anteriorem transierat. Nam homo eo oculo videre potuit, et, vitro adiutus, etiam vnciales literas legere. Vide BRISSEAU *de la Cataracte* pag. 167. et ex hoc HEISTERVM de Cataracte §. 19. p. 57. Confer H. A. R. Sc. MDCCVIII. p. 47. Cum Celeberrimus HEISTERVS in Libro de Cataracte hanc novam sententiam de huius vitii sede et natura singulari studio confirmasset, pluribus tamen vetusta et plane insita opinio euelli non potuit. Ab hac enim ideo deduci non potuerunt, quod minores tunicae, vel pelliculae, interdum in oculis eorum, qui suffusione laborauerant, post mortem essent repertae, quarum exempla vide in PALFIN *Anatomie Chirurgicale* T. I. p. 387. Etiam ii, qui admota acu suffusionem curauerant, saepe illud, quod se intus pupillae opposuerat, sine negotio non solum poterant diducere, sed etiam lacerare et in partes conscindere. Nam tenuem et ex crasso humore concretam tunicam, vel pelliculam, acu facilius ita lacerare posse, quam ipsam, quae maiorem duritiem habet, lentem, omnibus sine ambitione verum quacrentibus visum fuit. Interea vero, cum haec controuersia in magna inconstantia apud moedentes versaretur, acerrimus prioris opinionis et veterum defensor fuit WOOLHOVSIVS, Ophthalmiater Doctissimus, quo olim magistro in his rebus vius sum. Hic enim, lentem vitium contrahere et lumen amittere, non negauit, illud tamen valetudinis genus, cum veteribus, in quorum lectione multum versatus erat, glaucoma dicendum esse, voluit. Vid. *les Dissertations sur la Cataracte et le Glaucome*, quibus Celeberrimus HEISTERVS et Apologiam et Vindicias sententiae suae opposuit. Ex-

citati fuerunt doctissimi et tum in secandi, tum medend arte exercitatissimi viri, qui nouam diligentiam inuestigandis his rebus adhibuerunt. Principes sunt SALVATOR RANDVS, Chirurgus Parisiensis, et doctrina, et arte, clarus et prae caeteris omnibus, qui haud ita pridem obijt FRANCISCVS PETITVS, Medicus, quorum prior in Hist. A. R. Sc. MDCCXXII. p. 21. ostendit, interdum non tam lentem, quam aliquam tunicam, se pupillae opponere. Hanc vero non a coacto humore proficisci, sed a tunicis illis, quae lens cingitur, et quas supra descripsi. Alter vero, PETITVS, exploratis summa diligentia omnibus oculorum partibus, etiam hanc sententiam amplexus est, et ab ea nouam medendi viam traxit. De nonnullis tamen cum MORANDI dissentire videtur. Negat enim, id, quod prior affirmauerat, lentis exteriorem oram cum velamento, quo includitur, seu cum tunica, cohaerere, sed multis docet, hanc lentem, in suo velamento, sine nexu liberam, quasi fluctuare, et singulari ratione humore, qui inter eam et velamentum reperitur, ali. C. A. R. Sc. MDCCXXX. p. 624. In qua re PETITVS cum ANTONIO MAITREIAN concinere videtur, qui idem Cap. XII. p. 14. declarauerat. Negat etiam PETITVS, opacum fieri hoc velamentum, qui etiam variis experimentis didicit, nec illud facile fieri, si ei, ex oculo extracto, varii liquores, quibus lentis pelluciditas aufertur, superfundantur. Etiam asseuerat, se semper in oculis cum suffusione mortuorum reperisse lentem opacam, hanc vero tunicam perlucens c. l. MDCCXXX. p. 634. Interdum quidem hanc tunicam obscuram videri, id vero incidere a corrupto eo, qui inter eam lentem est, humore, et hunc tunicae illi inhaerescere. Alii tamen PETITO contradicunt, qui saepe hanc tunicam crassam turgidamque et opacam inuenerunt, et hoc probabiliter ex inflammatione fieri, demonstrauerunt. Praeterea PETITVS, illam tunicam *υαλώδη*, qua sinus vitrei cingitur, duplicem esse, ostendit, et in ea inuenit canalem humore plenum, quo lens comprehenditur. Vid. H. A. R. Sc. MDCCXXVI. p. 111. Medendi vero viam, quam ab his observationibus traxit, nullibi satis dilucide, optime tamen, quantum noui, in Epistolis, declaratam inuenio, quarum duas priores Anno MDCCXXIX. contra HECQVETVM, tertiam Anno MDCCXXXII. contra WINSLOVIVM edidit. Conf. C. A. R. Sc. MDCCXXV. p. 8. et MDCCXX. p. 320. Iubet enim eos, qui suffusionem curaturi sunt, non otam lentem cum velamento suo ex vitrei sinu excutere et deducere, sed illam tunicam, seu velamentum inferius, in posteriori parte acu aperire, et post per hanc factam plagam lentem ita exprimere, ut tunicae illius pars anterior integra maneat. Addit, sic hominem melius visurum esse, si, emota de-

depressaque lente, velamentum illud a parte anteriori integrum, iterum, vel aqueo, vel vitreo, humore impleatur, gibbumque fiat, et, hominem post curationem vitro fere non indigere. PETITVM secutus est temerarius ille et famosus IOHANNES TAYLOR, qui caeteroquin omnibus, quae PETITVS, alique, de oculorum natura morbisque proposuerunt, ludicrae subtilitatis affectatione et circulatoria iactatione tenebras magis obduxit, quam lucem attulit. Accepi tamen, cum hanc a PETITO inuentam medendi rationem satis feliciter imitatum fuisse. Hic duo genera cataractae statuit, alterum verum appellat, alterum spurium. Prius nasci censet, si illaeso nihilque mutato velamento lens ex aliqua sua parte alienetur, et, mutato eius naturali habitu, colore, pelluciditate, situ, figura, et magnitudine, magis contrahatur. Alterum vero genus dari, si, cum lente, vel tota, vel aliqua eius parte, resoluta et intumescente, etiam velamentum vitium contrahat, et vtraque pars obscuretur. Superaddit his glaucoma, cuius sedem etiam in lente ponit. In hoc totam lentem cum velamento ita intumescere, dicit, ut tandem pupilla diffundatur, et dilatur, atque *μυδρῆσις* cum *ἀμαυρώσει* sequatur. Veram cataractam oriri, addit, a valentiori lentis, atque eius velamenti, pressione. Hanc fieri a musculis oculum mouentibus, et, eam ob causam, illos, prae aliis, hoc vitio laborare, qui, vel assidua lectione, vel alia ratione, acrem oculorum aciem in aliquam rem intendere soliti sint. Etiam, quandoque incidere, ut, ictu illato, musculi laedantur, convellanturque, ita, ut, iis contractis, adeo prematur lentis velamentum, ut id valde tenerum rumpatur, et lens repente omnem pelluciditatem amittat, atque in humorem aqueum, et illud spatium, quod naturaliter inter lentem et vueam est, cameram posteriorem vocant, transeat. In pedetentim vero nascente vitio, etiam, si id adoleuerit, hominem quaedam, e latere posita, melius videre, quam, quae pupillae recta sint opposita. Iubet TAYLOR eos, quibus huius morbi metus est, vitare assiduam lectionem, omneque aliud opus, quod intentam oculorum aciem requirit. Illius vero generis, quod cataractam spuriam vocavit, notitiam, peti posse ab ipsa causa, ostendit, cum post oculi grauem inflammationem et *φλεγμονὴν* nasci soleat. Nam etiam lentis velamentum, in quo iam a RVYSCHIO Thef. II. Tab. I. fig. VIII. p. 78. arteriae fuerunt repertae, aliquid inflammationis habere, si reliquae oculi tunicae, praecipue choroidea, ea correptae fuerint. Confer PETITVM in C. A. R. Sc. Anno MDCCXXX. p. 226. Inflammatione autem soluta, aciem pedetentim hebescere, atque inlucis magis caligare, ita, ut homo ea, quae e latere posita sunt, non magis videat, quam, quae ex aduerso. Illud, quod

intus in horum oculo cernitur, a pupilla propius esse et colorem habere albidum ac fere coeruleum. Nam lentem ipsam, eamque omnem, dissolui ac liquefieri. Igitur, cum sub velamento, atque inter hoc et lentem, humor subesse soleat varie crassus atque coloratus, plerumque albidus, haec cataractas a nonnullis cysticas, cum velamento suo continentur, et ab humore, lacteas, vel purulentas, fuisse appellatas. De glaucomate vero TAYLOR contendit, illud nasci a totius corporis malo habitu, vel cachexia, et praecipue a redundante in humidis pituita. Corruptos enim humores, in lentem transfusos, efficere, ut illa tota cum duritia intumescat. Ob id plerumque graues diuturnosque, tum capitis, tum oculi, dolores antecedere glaucoma, eosque, intumescente lente pressisque interioribus oculi partibus, augeri, donec, ut tandem omne lumen amittatur, et ἀπύκνωσις sequatur. Nam tandem illam oculi tunicam, quae videndi facultatem praestat, quam TAYLOR, cum MARIOTTO, choroideam, alii, et, quantum opinor, rectius, retinam esse, existimant, ab indurata lente pressam sentiendi facultatem amittere. Eandem ob causam etiam diffundi dilatarique pupillam. In his oculis ab initio lentis colorem parum mutari, eum vero tandem glaucum fieri, vix autem a lente pressam multum anteriora et corneam versus promoueri addit. Vid. TAYLOR'S *Treatise on the Diseases of the crystalline Humour*. Haec ideo adduxi, non, quod illi homini magnam fidem habendam esse existimem, sed, quod his ea, quae PETITVS proposuerat, paulo magis patefieri ac illustrari, crediderim. Alia plura et egregia addiderunt VALSALVA et MORGAGNVS c. l. Ex his enim non pauca, et illud praecipue, discimus, suffusionem etiam nasci ex vitiata illa tunica, qua sinus vitrei, cui lens insidit, cingitur, et quae ab ἀλλόδε: proficiscitur. Vterque enim hoc obseruatione ex incisis post obitum oculis confirmauit. Igitur, si suffusio, quae prius acu curata fuit, non repente, sed post aliquod tempus, et pederentim, reuertit, id vitio huius velamenti, quod, ex obseruatione MORGAGNI, mucum quoque exsudat, incidere potest. Vid. VALSALVA Dissert. Anat. II. §. XVII. T. I. p. 146. et MORGAGNVS Epist. XVIII. §. 23. T. II. p. 334. Nisi me omnia fallunt, illud iam certi habemus, verae cataractae sedem esse eam, quam dixi. Et quamuis nec MORGAGNVS Ep. XVIII. §. 13. XIX. §. 8. illud omnino negare noluerit, dari suffusiones in humoris aquei parte, seu sic dicta camera posteriori, illaesa lente, ex coacto crudoque humore natas, illud tamen compertum est, nec hanc pelliculam sine lentis ipsius laesione posse acu deduci. Lentem vero, si affecta sauciataque est, obscuram fieri, aliis obseruationibus discunt. Vid. Obseru. PETITI de magnitudine duatum sic dicta-

dictarum camerarum oculi in C. A. R. Sc. MDCCXXIII. p. 54. et MDCCXXVIII. p. 295 et 408. Videntur etiam melius curari posse suffusiones, vbi velamentum pellucidum et integrum est, quam, vbi illud etiam vitium contraxit, et vbi, morbo per vetustatem confirmato, omnia multum inter se cohaerent. A vero enim propius est, illas suffusiones, quae, quamuis acu iterum atque iterum, et quoque valentius, pressae, infra pupillae regionem deduci nequeunt, vel, quae etiam deductae, mox iterum redeunt, et quae, si tandem inferiori parte insidunt, magnam inflammationem mouent, tales esse, in quibus lens vitiata cum suo velamento concreuit, et cum processibus ciliaribus cohaeret, a quibus sine negotio et graui eorum offensione, hypopyi etiam metu, non potest diduci. Hoc enim in earum suffusionum curationibus, quibus vetustas accessit, potissimum fieri, nouimus. Vid. DE LA FAYE c. l. et BENED. DUDDELLS *Treatise of the Diseases of the Horny-Coat of the Eye, and the various Kinds of Cataracts*, Cap. III. p. 107. Haec paulo fusius et vberius exsequi volui, cum ex his perspicuum sit, iam melius exploratam esse, suffusionis sedem atque naturam. Et omnes, qui artem faciunt, monendi sunt, vt per ea, quae experientia in ipsis curationibus docebit, haec vel refellant, vel magis confirmant, et vt indicia, non solum communia, sed variis suffusionibus, propria, simulque, quid de singulis, vel sperari, vel timeri, debeat, atque etiam his omnibus accommodatam curationem, ostendant. PETITI supra commemoratam medendi rationem, quam TAYLOR, more suo, verbosius exposuit, describere non audeo, quare me in ea suffusionem curandi ratione, quae iam olim, cum morbi natura nondum satis perspecta esset, in vsu fuit, continebo.

§. 1302.

Ex nascente recentique suffusione oculus caligare incipit, vt aegro quasi nubecula obuerfetur. Haec incipiens, mox celerius, mox tardius, crassior apparet, et tandem se interiori potentiae ita opponit, vt illa etiam extrinsecus alius intuentis oculis pateat. Inueterascente suffusione acies magis et magis hebetatur, tandemque omnis amittitur*.

* Monendi sunt tirones, ea, quae oculis sic obuerfantur, non semper suffusionem indicare. Nam id ex aliis causis incidere potest, veluti, si in cornea ex inflammationibus pustulae et vlcera oriuntur, vel, his curatis, cicatrices manent. Etiam si crudus succus, vel pus, ex choroidea et processibus cili-

ciliaribus inflammatis in humore aqueo coit, et si in vitreo nec non in retina, vitium est, et praecipue, si sub hoc in choroidea arteriae venaeque, quae, vel sanguini, vel lymphae, accommodatae sunt, intumuerunt, ex quibus non raro ἀμύγγαις sequitur. Vide in PITCARNII Diss. Med. Theoriam morborum oculi p. 206. Ipse homo melius has maculas cernere potest, si in coelum serenum, per chartam acuminori perforatam, cui niger, vel viridis, color inductus est, contuetur.

§. 1303.

Est tamen differentia. Interdum enim suffusio pedetentim nascitur, et oculi inter initium parum, tandem vero magis, caligant. Alii vero ex ea subito, et intra paucos dies, obcoecantur, id quod incidere potissimum solet, si ictus oculum grauiter laesit, et rupta, vel inflammata, fuit illa ἀραχνώδης lentis tunica.

§. 1304.

Ipsa etiam suffusio varie colorata est. Habet enim colorem lacteum, cinereum, glaucum, aureum, plumbeum, raro coeruleum, viridem et rubicundum. Quid de singulis sperari possit, protinus dicam.

§. 1305.

Si sola lens opaca fit et contrahitur, illa vero tunica ἀραχνώδης integra est et pellucens, homo inter initia melius videt ea, quae e latere posita sunt, quam, quae ex aduerso. Etiam fere noctu et in tenebris, quibus pupilla diffunditur, is melius videt, quam interdiu et in magna luce. Tunicam vero ἀραχνώδη corruptam esse, cognoscitur ex prima origine, et morbo, qui hoc vitium attulit. Nam nasci solet ex inflammatione, qua etiam discussa, longe celerius acies hebescit, ac caligat, ita, vt breui omne lumen amittatur. In hoc suffusionis genere nullus sensus lucis relinquitur, nec homo in tenebris, et si pupilla dilatata est, melius videt. Ipsa autem suffusio, quae intus conspicitur, albicans est, et quasi rugosa.

§. 1306.

§. 1306.

Primum genus cataractae nasci videtur, si ille fucus, qui naturaliter inter lentem et eius velamentum est, et a quo illa alimentum accipit, deficit. Lens enim contrahitur, arida fit et opaca. Id, prae caeteris, iis incidit, qui dies noctesque legunt, scribunt, vel aliud opus, veluti caelatum, intentis oculis perficiunt. Dum enim muscoli oculorum recti valentius adducuntur, id quod fieri necesse est, si ea, quae coram sunt, et propiora, contueri volumus) lenti apprimitur velamentum, quae res prohibet, quo minus ille humor ex ipso velamento exire et secerni possit. Dum vero lens non recte alitur, illa, prout dictum est, corrumpitur. Interdum, si oculus extrinsecus percussus est, id etiam contractis valentius per inflammationem miculis incidere solet.

§. 1307.

Lentis autem velamentum, vel tunica ἀραχνώδης, vitiat, si illa repente rumpitur, ita, ut interdum lens, quam etiam corrumpi necesse est, in anteriorem oculi partem, quae inter corneam vaeamque est, transeat. Hoc vero oculo vehementer percussio incidere, mox etuli. Caeteroquin ex variis occasionibus in choroidaeae atque processibus ciliaribus inflammatio mouetur, quae oculi φλεγμωνή (281) dicitur. Nam haec, si magna est, etiam in illud lentis velamentum euocatur, et huic vitium adfert. Interdum inflammatio mouetur, si in humidis corrupta crudaque materia est, quae, dum in omne corpus diducitur, etiam in oculorum remotiores partes, atque hanc tunicam venit, in arterias lymphae accommodatas, transfunditur, subsistit, et itinera intercludit. Huic periculo ii subiecti sunt, quibus corporis habitus corruptus est, et praecipue, quos catarrhus diu multumque vexat, nec non alii, qui

qui non humentibus, sed siccescentibus, naribus sunt vel, qui earum emunctionem negligunt. Nam pituitus quae per nares excerni nequit, in oculum conuer- quandoque potest. Etiam itinera illa, per quae humor ferebatur, si vexata laxataque sunt, excoecantur id quod incidere potest, si ictus oculum extrinsecus grauitur laesit. Periclitantur etiam ii, quibus venereus morbus mercurio fuit curatus, et ii, quibus in capite alii pestiferi morbi, et vehemens prae caeteris dolor, fuit. Nec minus alii, quibus corpus imbecillum rarum atque obesum, est, et qui illud ignauia, somno, satietate, venere, hebetant atque soluunt, vel, qui ex loco salubri in grauem veniunt, aut corpus calore relaxatum subito frigore excipiunt *.

* Vitiata hac tunica, necesse videtur, etiam lentem vitari. Est tamen observatio memorabilis SANTORINI, qui lentem diaphanam inuenit, membranam vero, quae candidas strias, radiorum in modum compositas, habuit. *Obs. Anat. Cap. IV. §. 4. p. 82.* Confer MORGAGNUM c. l. Ep. XVIII §. 19. p. 329.

§. 1308.

Scire etiam necessarium est, ex inflammata illa tunica *κρυσαλλώδει* interdum pus inter eam et lentem coire, quod genus suffusionis, cum humor in hoc velamentum contractus inueniatur, cataractam cysticam, alii purulentam, alii, quod ille humor lactis cremoris similis esset, lacteam, appellauerunt *. Etiam ipsa lens liquefcere nonnunquam videtur, et in similem humorem verti **. Interdum ea contracta atque opaca et aliter colorata illo corrupto humore comprehenditur ***.

* Vid. TAYLOR'S *Treatise on the Diseases of the Crystalline humour* Cap. V. p. 23.

** Vide Obs. HEISTERI in oculo canis in *Ephem. N. C.* Cent. IV. Obs. 198. aliam VALSALVAE in homine in MORGAGNO c. l. Ep. XVIII. §. 17. p. 326.

*** In vetula inueni hoc cataractae genus, in qua multus humor

mor lacteus in lentis velamentum, vel tunicam *κρυσταλλώδη*, contractus erat, in ipso vero humore lentem opacam, luteolam, et quae vix maioris lenticulae esculentae magnitudinem habuit. Vid. Programma, quo Anno MDCCXXXVI. d. XVII. Martii sectionem publicam cadaueris indixi, ex quo hanc observationem etiam adduxit Celeberr. MORGAGNVS c. l.

§. 1309.

Proximum his vitium in lente crystallina est, si ea in suo velamento multum et ita intumescit, ut reliquae oculorum partes ab ea premantur. Hoc his incipiis cognoscitur: Oculus durus, digito renitens, attollitur, et magis, quam naturaliter consuevit, prominet. In eo grauitatis quidam et doloris sensus est. Intus in oculo illud, quod se opponit, colorem habet arinae aquae. Tandem, si malum inueterauit, pupilla dilatatur, et accedit *μυδρίασις*. Quoniam vero, vitreus humor, et retina, a lente, quae multum intumescit, premuntur, perit omnis videndi facultas, et dicitur *ἀμαύρωσις*. Glaucoma hoc vitium vocant. Aliud vero glaucomatis genus est, si vitreus humor intumescit, corrumpitur et obscurus fit. Is tamen saepe frequentius dissoluitur, et oculus, qui caligat, sanatus fit atque flaccidus, qui prementi nihil renititur. Necessesse vero est, corrupto vitreo humore, iam lentem vitiari.

† Suffusionum diuersa ab Auctoribus constituta genera, cum longum foret, enarrare libro compendiario hoc non possumus. Vid. *Nosologia methodica* a FRANC. BOISSIER DE SAUVAGES edita, in loco de *cataracta*. Non contemnendas observationes diagnosin diuersarum specierum suffusionis proposuit I. G. GÜNZIUS in Dissert. qua de *suffusionis natura et curatione animaduersiones sistit*. Lipsiae 1750.

§. 1310.

Primum genus suffusionis quandoque victus ratione et idoneis medicamentis auerti potest, atque etiam, si illud iam ad maturitatem peruenit, manu curari. Aliud videtur alterum, quod in eo non sola lens, sed etiam

etiam huius velamentum, cum illa quandoque tunica qua vitrei humoris sinus cingitur, vitium contrahit et acu deduci debet. Spem etiam felicitis curationis facit ipse suffusionis color, quem ex albido coeruleum vel parum flauescens, esse oportet, et, si oculus, non durus est, nec nimis mollis, et si ei sensus aliquis lumen relictus est, ita, ut in tenebris pupilla aliquantum contrahatur, in luce vero dilatetur. Vix sanabilis est suffusio, quae colorem habet, auro, aëri, vel ferro politum similem, si illa ex grauiori et diuturno morbo, maxime oculi phlegmone, orta est. Nec fere vlla spes iis est, qui sine hoc vitio, et antequam nascentem suffusionem aciem hebetem habuerunt, in quibus plerumque amaurosis accedit. Hoc magis timeri debet, ubi pupilla, amissa naturali figura, in aliam se vertit, si in multum diffusa et immobilis, oculo vero nullus sensus fulguris relictus est. Neque oculus exiguus, neque concauus, neque durus atque prominens, curationi opportunus esse solet. Neque idonea est senilis aetas, ac ne puerilis quidem, sed inter has media. Etiam considerari oportet corporis habitum, qui, si corruptus, et aliquod vitium in humidis est, mali moris et minus prosperae curationis periculum facit. Glaucoma inter initia per victus rationem et medicamenta quae noxiam materiam digerunt, et in inferiora deponunt, discutitur. Si vero adoleuit, nullam curationem recipit.

§. 1311.

Si oculi caligant, et suffusionis metum faciunt, experiri licet auxilia per victum et medicamenta. Mendendi vero rationem ab euidentibus causis instruere oportet. Qui igitur ex suffusione caligare coeperunt, eos nunquam oportet, oculos ad scribendum legendumque, vel aliud opus faciendum, frequenter intendere.

ere, sed ab omni negotio, quod firmam oculorum
 nem exigit, abstinere. Observatio maior necessaria
 t rerum communium, ad sanitatem vero necessaria-
 um, veluti, vt aluiis, et in foeminis menstrua, respon-
 eant, vt, si in viris haemorrhoides sanguinem fundere
 solitae sunt, illae non supprimantur, cum oculorum
 abecillitas, suffusio et glaucoma, saepe ex his oriri
 soleant. Si sanguis copia peccat, is detrahendus est,
 tum incisa vena, tum concisa cute, admotisque cucur-
 tulis. Interdum, si eiusmodi vitia hominem celerius
 corripiunt, eo maturius auxilia efficaciora rapienda
 sunt. Igitur, si phlegmone oculum tenet, sanguis ex
 angulari vena, imo etiam ex arteria, mittendus, et pal-
 lebris crebrius adhibenda est *ξύσις* (298), admotis et
 impositis omnibus, quae aduersus oculorum *Φλεγμω-*
ν possunt (292. 305). Si in humidis pituita abundat,
 oportet eam expellere, et curioso victu cauerè, ne in-
 utilis materia corpori supersit. In his casibus, et in
 corporibus adstrictis, plurimum proficere solent mine-
 rales aquae, quas diu et iterum potare oportet. Etiam
 profunt, quae urinam mouent, et ex his, praeter caeteris,
 succus millepedarum syluestrium, quarum viginti, tri-
 inta, et sub finem plures, viuae ex vino in mortario
 eruntur. Vinum autem horis matutinis per plures
 dies bibendum est. Etiam vtile est, cutim exulcerari,
 vel admotis cantharidibus (937. 938), vel fonticulis
 (926 ad 934), vel, id quod maximam efficaciam habet,
 etaceo (939), vt malae materiae exitus sit. Si aliud
 vitium in humidis est, danda sunt decocta et medica-
 menta ex mercurio, purgandis humidis apta: si post
 rauem sanguinis profusionem oculi hebescent, et ha-
 um valetudinum metum faciunt, danda sunt iura, ex
 quibus radices et herbae, quae aperiendi vim habent,
 decoqui possunt. Vbi vero oculus, qui caligat, intu-
 nescit, durusque fit, non inutilia sunt fomenta ex her-

bis emollientibus, a quibus sub finem, si aliquid ex timore et duritia minuitur, ad discutientia transeundi est. Saepe enim vitium his tollitur, si prius adhibuerunt auxilia, quae mox praecepi, et quae noxia materiam depellunt. Nam sine his fomenta perniciosa esse quandoque possunt.

§. 1312.

Si vero hac medendi ratione illa vitiorum genera non inter initia discutiuntur, videndum est, num minus curatio adhiberi possit. Haec potissimum locum habet in primo genere suffusionis, si non multum inveteravit. Nam ultimum genus, ubi, et lens, et eius velamentum, vitium contraxerunt, curationi non idoneum est. Etiam superuacua, imo non sine periculo, est curatio per manum, si ea adhibetur glaucemati, vel suffusioni, cui *μυδρίασις* et *ἀμαύρωσις* accesserunt. Atque ipsius quoque suffusionis quaedam maturitas est. Expectari igitur oportet, donec suffusio duritiem aliquam non nimiam habere videatur, cuius rei indicium esse solet, si homini lucis et rerum, quae oculis obuerfantur, aliquis sensus relictus est, is vero nec has, nec colores, satis discernere potest. Si tempus eligere licet, curatio, vere, esse debet, vel autumnus nondum ortus, vel iam fractis aestibus. Etiam ratio servanda est menstruorum et haemorrhoidum, quarum venae, si sanguinem fundunt, curationem minus tutam faciunt. Nec minus expectari debet, si humor in nares, fauces, vel pulmonem, destillat, et frequentes tusseres, scretus atque sternutamenta, vel in capite dolorem, in corpore febrem, movet. Necesse etiam est ut eo die, quo aeger curabitur, coelum apertum sit, serenum, haud nubilum, vel caliginosum. Et eum, qui curaturus est, recte valere oportet, cum ad hanc rem, et oculorum acies clara atque acris, et manus strenua ac stabilis, requiratur.

Post tempora PLATNERI ad dissipandas suffusiones adhibitum est extractum cicutae, raro, si vnquam, aliquid profuit. Laudata etiam est pulsatilla nigricans, de eademque scriptus a STOERCKIO liber singularis, Vindobonae 1771 editus. Vfu extracti hyoscyami albi quotidiano suffusionem plus semel discussam esse asseuerat FRANC. BOISIER DE SAUVAGES in *Nosologia Methodica*. Cum haec iisque similia cum exigua spe prosperi effectus adhibeantur, magnopere cauendum est, ne eorum abusu corpora aegrotantium pessumdentur. Fonticulorum effectus nonnunquam laudabilis vitus est in iis, in quorum humoribus prauitas quaedam erat. Sed et medicamenta illa, prudenter adhibita, corpus chirurgiae administrandae opportunius reddere possunt.

§. 1313.

Ante curationem aluius aliquoties ducenda, et homo per aliquot dies modico atque minus valenti ciboendus est. Potioni vero praestanda est aqua, vel ptina, aut alia ex potionum generibus imbecillissima. Quae omnia plurimum ad auertendam inflammationem facere possunt, cuius quandoque metus esse potest. Eo ipso die ante curationem iterum aluius lotio immissa solui debet, ne desidendi necessitas aegrum urgere cogat.

§. 1314.

Acu res agenda est, non tamen nimis acuta, nec nimis tenui. Si enim nimis acuta est, laedi possunt minores arteriae atque venae in vena et processibus variis. Si autem nimis retusa est, ea aegrius, et non, nisi premendo, demittitur. Optima esse videtur, cuius mucro paululum tenuatus, latior, non vero nimis acutus, est. Habere debet manubriolum, et in hoc signum, vt, si acus demissa fuerit, sciri possit, quarte ea plana sit, qua tenuata. Fieri potest acus ex ferro, satis duro, non vero fragili. Fere tamen melior, quae ex auro fit, quod crebrioribus mallei ictibus tratur. Si ex ferro est, magnam curam adhiberi oportet, vt omnis rubigo exteratur. Ob id illa, priusquamculo admouetur, trahi potest per pannum laneum

densum, qualis purpureus esse solet, et huius fricatione laeuigari. Etiam, antequam demittitur, per labra liua madida, duci potest.

* Veteres vsi sunt acu rotunda valde acuta. Vide figuram BARTISCH P. V. p. 65. qui caeteris argenteas praefert. TILLOT, qui nouam illam medendi rationem proposuit, utitur paulo latiori, cuius vero mucro, altera parte gibbus, altera planus, est. Vid. l. c. Cap. XI. p. 33. Eam delineat videtur SHARP Tab. X. p. 169. Is vero mediante phlebotomia prius scleroticam incidit, viamque facit, per quam acumen mittit. Etiam utitur ferramento, quod speculum oculi vocant. Sed hac ratione vix prohiberi poterit, quo minus per plagam hiantem, si oculus illo ferramento prematur, efferatur aqueus humor. Hoc vero si incidit, collabitur cornea, et vnea, et vix sine noxa deduci potest suffusio. Huius notatum quoque inuenio in *the Supplement to KENNEDY'S Ophthalmographia*, quae acerbior censura est in varios auctores, praecipue CHESELDENVM p. 97.

† Acubus diuersarum formarum vsi sunt huius *chirurgiae* ritibus; quas nuper recensuit CHRIST. FRIDERIC. LUDWIG. prolatione *de suffusionis per acum curatione*, iure laudatur, quam PLATNERVS hoc loco descripsit. Sed et ab aliis praefertur ea, quae mucronem habet tenuatum latiore, cuius latus alterum acutum, alterum obtusum est. Illo iubent velamentum lentis (capsulam vocant) diuidi. Sed vereor, ne acus acie diuidi secando nequeat velamentum istud, quia quod minus stabile est, sed facile dimouetur. Plerumque illi, qui velamentum istud putant acus acie scindi, id rursus puniunt potius et lacerant, aut vna cum corpore lentis a vitis soluunt et vel deprimunt, vel ad latus promouent.

§. 1315.

Opus est medicamento ad coercendam inflammationem opportuno. Optimum est, quod componitur ex alumine vsto, saccharo Saturni, vel aeris flore, quae tutiam vulgo appellant. Haec excipiuntur oui albo et adiecta aqua rosarum, spatula agitantur miscenturque. Ex hoc autem liquore exprimitur panniculus qui protinus ante curationem superdatur alteri oculi iniectaque fascia adstringitur.

§. 1316.

Locus lucidus esse debet, ut chirurgus ferramentum in hominis oculo cernere possit. Nimia tamen lux

si oculo aliquis eius sensus relictus est, efficere test, vt pupilla se nimium contrahat. Quare homo in lumine aduerso sedeat, sed, vt lux e latere in oculum, qui curabitur, admoueatur. Aduerso sedili, paulo altiori, infideat chirurgus. Caput a ministro conuolandum et immobile praestandum est. Etiamnum alii a lateribus obiiciuntur, qui hominem labare non sinunt. Leui enim motu eripi acies in periculum potest. Linamentis igitur et pannis super alterum oculum impositis, eoque deligato, oculus, qui operationem ex manu postulat, digitis super palpebras locatis, leniter perfricandus est, vt minores venae, ne acu laedi non debent, inflentur et se magis ostendant. Homo vero monendus est, vt oculum nasum non moueat et immobilem faciat. Tum chirurgus altera manu palpebras diducit, altera acum admouet. Primum vero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra, operetur. Acum, quam ea rationeprehendit, qua scribitur calamus solemus, ita in oculum demittit, vt digitus minimus, et alter, huic proximus, hominis temerari et angulo oculi huic propiori innitatur.

§. 1317.

Demittenda est acus, recta, per tunicas, loco fere medio inter corneam et angulum tempori propiorem, vt nulla vena laedatur. Is locus opportunus est, quia a cornea spatio duarum linearum distat*. Quamquam acus in oculum penetrauit, ea inclinanda ad eam suffusionem est, et vertendo altius imprimenda. Vbi ad suffusionem ventum est, ita inclinari debet in aequilibrium, vt mucro acus, et eius pars plana, supremae suffusioni admoueatur. Haec paulatim deprimi et infra regionem pupillae deduci debet. Vbi hanc transiit suffusio, ea paulo vehementius acu imprimi debet, vt in inferiori parte sub humore vitreo insidat. Si haesit, et

homo ea, quae ante oculum obuersantur, videre potest. curatio expleta est. Protinus vero oculus obduci palpebris contegendus est, ne noua lux eum offendat. Acus educi debet, commissis prius palpebris. Omnia curiosius agenda sunt, ne interiores oculi partes laedantur.

* Per quam partem acus in oculum demitti debeat, singulis studio executus est PETITVS, Medicus, in C. A. R. MDCCXXVI. p. 370, qui ostendit, laedi processus ciliares ad vnā lineam oculum perforetur. Si vero hoc fiat tertiam, quāramue, laedi aponeurosin musculi abducere. Huius autem laesionem sequi vomitum, nauseam, alia mala. Igitur concludit, aptissimum locum esse, qui a cornea aliquid vltra duas lineas distat. TAYLOR l. c. Cap. p. 33. acum ita demittit, vt inter corneam et locum, oculus perforatur, spatium sit vnus lineae cum dimidio.

§. 1318.

Post haec linamenta ex illa mīstura (1315) expressa imponi, et oculus deuinciri, debet. Primo die, ter quaque hora, linamenta, cum inaruerunt, iterum redefacienda sunt, vt inflammatio coerceatur. Si humor maior metus est, sanguinem mitti oportet. Nunquam vero ante septimum diem palpebrae diduci debent, cum insueta lux oculum concitare possit, et efficere suffusio redeat. Quiete opus est et abstinentia. Horum supinus cubet, ita, vt caput excitatum sit. Cibus primis diebus non alius assumendus est, quam liquidus, ne maxillae laborent. Vltimis diebus linamenta aqua tepida, cui parum spiritus ardentis admisceri potest, exprimi possunt, et super oculos dari.

§. 1319.

Septimo circiter die releuandus est homo, reuolunda fascia, aperiendusque oculus in loco obscuro. Vbi is videt, necesse est, vt clausis fenestris se in tenebris contineat, quo oculus pedetentim luci adsuescat. ob quam rem etiam oculus panniculo quadrato, qui viridem

ridem, vel coeruleum, colorem habet, commode con-
gitur, qui vero non fascia adstringitur, sed ita ac-
ommodatur, vt prae oculis pondeat.

§. 1320.

Incidere potest, vt sub hac curatione vitiata et
sede sua mota lens per pupillam in illum locum, qui
ter corneam et vueam est, veniat. In hoc casu prae-
piendum est aegro, vt supinus et in tenebris iaceat,
io lens iterum per pupillam in antiquam sedem re-
rtat, quae deinde demissa in oculum acu infra regio-
em pupillae deduci et imprimi potest, vt inferiori
rti infidat. Si vero illa manet, et dolorem mouet
que inflammationem, protinus incidenda est cornea,
lens per huius plagam volsella, vel minori hamulo,
ucenda. In hac curatione omnia similia debent esse
i, quae in hypopyi curatione praecepi (321. ad 323).
ec alia adhibenda est, si ex laesa arteria, venaue, ma-
r sanguinis modus in oculum effusus est, quem pro-
nus, et antequam is inflammationem concitat, euo-
ari oportet (321 ad 323).

§. 1321.

Est quoddam suffusionis genus, quod, cum nullam
urationem recipiat, exposuisse satis erit. Suffusio suo
oco est, quae vero, quasi tremula, semper labat. Hoc
ecidit, si processus ciliares, quos cum velamento len-
s cohaerere supra retuli, fuerunt aliqua parte disrupti
t a ligamento ciliari diducti. Aliud genus est, quod
on solum labat, sed huc atque illuc ita mouetur, vt
ens opaca, qualis in suffusione esse solet, pupillae op-
osita, mox cernatur, mox iterum quasi euanescat.
Oculus est concavus et sine durtia, pupilla vero dif-
usa, et quae naturalem figuram amisit. Nascitur hoc
genus vitii, si vitreus humor colliquefactus est, cui ari-
la lens innatat. Nec hoc vlla arte eliditur.

† His a PLATNERO dictis subiungenda sunt nonnulla eorum quae nouissimis annis de extractione cataractae scripserunt viri peritissimi. Ex illis §. 1320. intelligitur, tunicam corneam aliquando incisam esse, ut lens, sub curatione per pupillam in cameram oculi anteriorem ingressa, educeretur. Quod cum haud aegre factum esset, suffusionis curatione educatione lentis fieri posse olim quidam, ut FREITAGI, MERYVS, PETITVS, iudicarunt. Sunt etiam in Arabum RHASIS et ABENSINAE scriptis verba haud obscura, quae genus id curandi, quomodo demum cunque, ab aetate chirurgis oculariis cultum esse docent. Sed laus tamen inventionis haud dubie debetur DAVIELIO, chirurgo Franco gallo; non enim tantummodo cogitando iudicandoque, sed re ipsa et manuum opera effecit, ut hodie lens crystallina obscurata saepius per corneam incisam educatur, depressa vero, eius acu facienda fere rarius celebratur. In *Comment. Acad. R. chirurg.* Vol. II methodum suam perspicue perscripsit DAVIELIVS. Corneam acu cuspidata secante et paulum recurua perforat haud procul a sclerotica; hac posita, aculam aliam, non cuspidatam, et secantem atque etiam recuruam immittit, qua vulnusculum illud utrinque ita producit, ut id arcum referat corneae quasi circulo concentricum. Sed quia interea effluit humor aqueus, neque adeo acum ministerio cornea, iam laxior, diuidi commodè potest, forfice binas recuruas, oculorum duorum, cuique suas et proprias adhibet, quibus arcuata corneae sectio utrinque eo usque continuatur, ut eius fines, seu capita, seu cornua summitatibus pupillae respondeant, aut altius etiam ascendant. Ut autem haec omnia fieri tuto queant, ministrorum aliquis manum alterutram fronti ita admouet, ut digitis adducat palpebram superiorem, alteram sub mento dat, atque sic caput simul retinet. Chirurgus in altiori sedili sedens, alterius utriusque manus duobus digitis palpebram inferiorem detrahens, feramenta illa manu altera adhibet. Corneam ratione supra dicta satis incisam ferramento quodam obruso et polito, spatulam vocat, eleuat seu inuertit, ut faciem anteriorem velamenti lentis acu et cuspidata et ancipiti, diuidere aut orbiculum aliquem ex eo refecare possit. Quo facto, spatulam illam dat inter iridem et lentem, eademque hanc profusus soluit et liberat. Posthaec corneae partem illam, quam inuerterat, delabi sinit, et bulbi partem inferiorem paululum, sed summa moderatione adhibita, premit, ut per pupillam paulatim paulatimque ampliata lens in cameram anteriorem irrumpat, et ex hac deinde per genas descendat. Si cataracta mollior fuerit, fere mucosa, purulenta, lactea, casciosa, eaque rupta reliquias quasdam in oculo dimiserit, cochleare paruulum paratum habet, quod in ambitu pupillae iterum iterumque suspensa manu mouet, ut aliena omnia remoueantur. Omnibus peractis, corneae labra, sibi

mutuo

mutuo diligentius et curatius iunguntur, reliq. Hac autem methodo plures visum recuperarunt, laudemque et gratias meruit DAVIELIVS. Nihilominus tamen ea relicta est, quod numerus ferramentorum applicandorum et curationem trahit, et oculus irritat, forficesque oras incisae corneae vexatas dimittunt. LA FAYE igitur aliique forficibus repudiatis vsum scalpelli proposuerunt; vid. *idem Volumen Monument. Ac. R. chir.* qui nunc quoque ita inualuit, vt forficibus vix quisquam vtatur, nisi forte sub scalpelli visu aliquid acciderit, quod forficum applicationem necessariam esse ostenderet. Cultrorum autem huius chirurgiae causa inuentorum tot fere genera sunt, quot artifices celebriores. Differunt et figura et latitudine, et crassitie. Optimus ille videtur, cuius dorsum obtusum lineam rectam refert, mucro satis cuspidatus et per lineam geometricam anceps atque minime cedens est, latitudo inde a mucrone paulatim maior est, et, vbi maxima, corneae diametrum dimidiam aequat. Tenuior facilius transit, itemque vtrinque conuexus, quam crassior vel planus; conuexus praeterea iridem aliquantum reprimi, quo cauetur, ne scalpellus eam laedat. Scalpellus, quo CASA AMATA apud nos utebatur, crassus admodum erat, in facie iridi obuersa valde conuexus, in altera chirurgo obuersa paulum concavus. Huius iconem et descriptionem vid. in libello *de methodis suffusionem oculorum curandi a CASA AMATA et SIMONE cultis*, edito a CHRISTIAN. GOTTHOLD FELLERO. Lipsiae 1782. De RICHTERI et BERANGERII cultellis vid. illius Tractatum germanice conscriptum: *Abhandlung von der Ausziehung des grauen Staares. Goettingen 1773.* Tantum quidem de scalpello. Scalpellus autem corneam ab angulo oculi externo commode perforat in puncto lineam vnā ab coniunctiua distante, in diametro quidem transversa corneae, exit vero in recta opposito corneae puncto, atque eadem distantia a coniunctiua; vbi hoc loco mucro exit, paulatim promouetur, ita, vt acies eius corneam perfecerit vbique in eadem illa distantia a coniunctiua. Prima illa corneae perforatio aliquam vim, sed simul dexteritatem et moderationem a chirurgo requirit, ne cultelli mucro, qui iridi recta obuersus momento perforationis esse debet, eam laedat. Verum cultellus commode per cameram oculi promoueri non potest, nisi bulbus oculi, nimis mobilis, reddatur stabilis. Hoc autem fit, si ferramentum quoddam acutum in regione bulbi cultello opposita figitur. Veruculum seu hastam PAMARTIVS proposuit. Habet haec hasta mucronem cuspidatum, quem remora aliqua, spatio dimidiae lineae geometricae a cuspe distans, prohibet, quo minus alte coniunctiuam penetraret. Applicatur sic, vt mucro angulum oculi externum spectet. Iconem vid. apud RICHTERVM l. c. Hanc ipsam hastulam applicatam generi quidam digitalis ferruminando iungi iussit RUMPELTVS, chi-

rurgus dextrerrimus. Iconem vid. apud eundem RICHTE-
 RVM. Digitale id digito medio aut annulari impositum mu-
 cronem hastulae in eodem loco bulbi imprimit, dum interea
 digitus index manus eiusdem palpebram inferiorem didu-
 cit. Similem quidem hastulam vel, si mauis, vnum habet fer-
 ramentum, quo CASA AMATA ad bulbum oculi stabilien-
 dum vtitur. Id bis flexum refert figuram literae romanae
 S, in cuius capite est hastula illa. Iconem apud FELLE-
 RVM l. c. inspicere. Cuspis autem ferramenti imprimitur
 non in coniunctiua, sed in cornea eo quidem loco, qui a
 coniunctiua dimidiam lineam distat, et punctum illud, in
 quo cultellus corneam pertundit et ingreditur, e diametro
 spectat. Scalpelli chirurgus ita promouet, vt is eo ipso
 loco corneae, vbi hastula impressa est, e camera oculi egre-
 diatur. Cauetur sic coniunctiuae, cuius, vt pote sensilioris
 laesio alioquin inflammationem augere potest. Atque sic,
 vtrolibet modo, mobilitati bulbi prospicitur. Sed palpe-
 brarum quoque motus impedimento esse possunt. Quidam
 chirurgorum palpebram inferiorem digito vno alteroue de-
 trahunt, ministrum vero, qui caput hominis curandi reti-
 net, alterius manus digitis adducere superiorem iubent.
 Quod vt commodius fieri possit, vnci latioris et obtusi spe-
 ciem alii adhibent, CASA AMATA ad leuandam superiorem
 tali vnco simplici, ad deducendam inferiorem vnco du-
 plici, h. e. qui in vtroque extremo flexus est, vtitur, cuius
 inferiori flexui appenditur res aliqua v. c. clauis haud ita
 magna, modico pondere suo palpebram deducens. Non
 illa tantum sibi propria habet CASA AMATA, sed commo-
 dam etiam rationem sessionis adornat. Ipse sedet mensa al-
 tiori, homo curandus in sedecula demissiori, ad cuius latera
 sunt, sedilia duo, quibus insistant pedes chirurgi, sic qui-
 dem, vt sub curatione cubitus vterque genubus inniti
 commode possit. Reliqua curatio haud multum diuersa est
 ab ea, qua vsus est DAVIELIVS. Velamentum lentis alii
 simplici sectione aperiunt, alii pluribus quasi destruunt, ad-
 hibent autem vel acum ancipitem et acutam, vel lanceae
 genus, quod TENON inuenit, alii CYSTITOMVM, quem LA
 FAYE proposuit (vid. de his RICHTERVS l. c.) quidam etiam
 eodem scalpello, quo corneae incisionem perfecerunt, lentis
 velamentum incidunt. CYSTITOMVS reliquis praestare vi-
 detur. Relictas particulas lentis obscuratae, mollioris et
 dissilientis, aut mucosa lentem obtegentia cochleari illo DA-
 VIELII, quod in locum, quem lens reliquit, inferunt, exi-
 mere student. Inter haec vel aliquando post absolutam chi-
 rurgiam hanc, oculus serius, fit, vt corporis vitrei pars, ma-
 ior minorue, foras prorumpat. Sub ipsa curatione erumpit,
 si oculi bulbus aut durius premitur, seu a ministro, seu a chi-
 urgo, aut ab scalpello, aliisque ferramentis nimium vexa-
 tur, aut corpus vitreum nimis tenue et fluidum est. Si post
 cura-

curationem procidit, caussa tribuenda est contractioni tunicarum et muscutorum oculum mouentium. Symptoma hoc non adeo terret, neque aliud quicquam requirit, quam vt oculus a clausis palpebris quantocyus contegatur, et apta deligatione, minime constringente vel premente, medicamentisque et intus et foris lenientibus curetur. Sed de his multisque aliis prolixius agere in breuitate mea haud licet. Legantur scriptiones aliorum, ac praecipue RICHTERI supra laudatus liber eiusdemque Bibliotheca chirurgica. Addo tantummodo pauca. Quam difficilis primo intuitu videatur curatio ea, facile tamen plerumque administratur et felicem etiam exitum habet sub manibus vix mediocriter doctorum artificum. Quo factum est, vt curatio suffusionis, quae depressione lentis fit, a non paucis vilipendatur negligaturque. Sed hoc non recte fit. Incidere enim potest necessitas suffusionem depressione curandi, tanquam si oculus paruus, camera eius anterior exigua, pupilla arctior est; si oculus in orbita alte conditus delitescit; si lens obscurata maior est, quam vt sine violentia pupillae inferenda in cameram oculi anteriorem venire queat; si humorum prauitas insignis et magna neruorum sensilitas est.

A M A Υ Ρ Ω Σ Ι Σ.

§. 1322.

Caligare nonnunquam oculi consueuerunt, sine lipitudine, aut suffusione, si neruus opticus, et illa tunica, a qua videndi potestas proficiscitur, resoluantur. Quibusdam acies sensim pedetentimque hebescit, ac tandem caligat, aliis vero ea repente eripitur, qui subito occoecantur. Si vterque oculus lumen amisit, vel si vetustas accessit, accedit *Mydriasis* (1309).

† Mydriasis h. e. dilatatio et immobilitas pupillae a multis habita est pro symptomate amauroseos pathognomonico. Repugnant RICHTERVS, SCHMUCKERVS et post hos alii quoque. Sed in omni amaurosi mydriasin fieri PLATNERVS non dixit.

§. 1323.

Haec oculorum resolutio ex variis causis nascitur, veluti si in oculos hominis, qui diu in tenebris omni luce

luce orbatus fuit, repente corusca et splendens omnemque visum praestringens lux admittitur, vel si in febre ardente, huiusque ipso impetu, sanguis ex talo mittitur. Quandoque haec vitia post comitiale morbum relinquuntur: In quibus casibus omnibus vix unquam opitulari possumus. Eandem vero imbecillitatem quandoque facit humor, quo cerebrum et optici nervi premuntur. Idem resolvuntur interdum ex ictu, vel, si podagra, aliufue morbus, male, et reprimentibus, curatus fuit. Aduersus hos morbos, si ioculum non nimium occupauerunt, experiri licet ea, quibus malae materiae exitus datur. Ferramentis candentibus exulcerari debet summum caput, et cutis post aurem (958). Utilliter etiam, praecipue, si homini, cum his, continens somnus, nulla vero febris, est, admoventur ceruici et tergo cantharides (937. 938). Vlcus etiam, vel sic dictum setaceum, fieri potest in nucha (939); quae vlcera diutius seruanda sunt.

§. 1324.

At, si ἀμαύρωσις orta fuit post magnam sanguinis profusionem, vel post concubitum, qui frequentior, vel numero, vel natura, ratione aetatis et corporis, fuit, optima praesidia sunt, quae a victus ratione petuntur. Dari debent iura carniū, obseruatis iis, quae alibi (418) praecepi. Etiam prodest gelatina, et portio, quae ex nucleis cacao paratur. Post venerem, et, si post sanguinis profluuium verendum non est, ne sanguis iterum erumpat, dari etiam potest vinum meracius. Extrinsecus caput, et huius futurae, omne etiam corpus, linteis asperioribus assidue et frequenter perfricari debent. Proficiunt etiam thermae, vel naturales, vel arte compositae, si ex alto in caput destillant (1217).

§. 1325.

Interdum iis, qui ex hac imbecillitate caligare solent, nulla pituita ex naribus fertur. His proficit, si ubinde vapor aquae calidae, ex qua etiam herba maiore commode coquitur, naribus subiicitur. Tenacior pituita sternutamentis elidi debet.

§. 1326.

At enim, si id est ex malis ulceribus, si ἐγπης (919), porrigo (922), scabies, aliaque ulcerum genera, ex rinfecus admotis reprimementibus prohibita, fuere, procedere possunt curationes, quibus humida purgantur, et sudor etiam euocatur. Alii, qui ex morbo venereo lumen amiserant, illud receperunt, concitato per mercurium salinae profluuiio. Hoc fieri potest, si ossa, in posteriori orbitae parte, vel horum membrana, ex vitio intus orto, intumuerunt, quod vitium illa curatione dissipatur.

§. 1327.

HIPPOCRATES dixit, ex vulneribus, quae superciliis inferuntur, lumen amitti. Et VALSALVA aliquando mederi potuit oculo, qui a rostro galli Indici loco percussus, et protinus occoecatus, fuerat. Perfricuit supercilium ea parte, ubi ex orbita nervus, qui ramus nervi ophthalmici est, educitur.

Nervus ophthalmicus est prior trium ramorum maiorum, in quos nervus quinti paris diuiditur, qui etiam, ubi hi nervi in orbitam feruntur, cum nervo tertii paris committitur. Ab hoc autem muscoli oculum moventes nervos et moventi potestatem accipiunt. Musculi nervum opticum comprehendunt, quem, si conuelluntur, valentius comprimere possunt. Haec causa esse videtur illius caliginis, ex vulnere superciliorum ortae, quam HIPPOCRATES animadvertit. Nam, nervorum inter se iunctorum implicationes quandoque maximas commotiones in corpore praestare, vel sternutamenta probant, quae etiam ex affecto minori nervo, qui ab eodem nervo ophthalmico ad nares pertinet, moventur. Vide locum HIPPOCRATIS in Coacis Praenot.

Sect.

Seft. III. n. 391. T. I. Edit. Lind. p. 523. VALSALVA Dissert. Anat. II. et in hunc Celeb. MORGAGNI Epistolae XVII. et XVIII. Confer programma de Vulneribus super ciliis illatis, cur coecitatem adferant, quo Anno MDCCXXXI. Panegyrim medicam indixi.

† Capiti huic multa admodum subiungi possent. Verum cum nimia essent neque amauroseos curatio a chirurgis sed a Medicis requirenda sit, ea praeterire statui. Remitte tamen Lectores ad scriptores probatiores. Multa congesti FRANC. BOISSIER DE SAUVAGES in *Nosologia methodica* Propria quaedam habet RICHTERVS in *Nouis Commentarii Societatis Reg. Scientiarum Göttingensis*, Tom. IV. Alia et vtilia leguntur a SCHIMVCKERO proposita in *eius Vermischten chirurgischen Schriften*, Vol. II. Dissertationem singularem de *Amaurosi* conscripsit DANIEL NOTHNAGEL. Erlangae 1776. Sparsa quaedam exstant in RICHTERI eiusdem *Bibliotheca chirurgica*. *Dissertatio medica de Amaurosi* edita ab ALEXANDRO ROSS 1754 iterum descripta est in collectione illa, quae inscripta est: *Thesaurus medicus sive Disputationum*, in Academia Edinensi *Delectus* a GVLIELMO SMELLIO habitus. Edimburgi 1779. Tom. II.

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ.

§. 1328.

Strabones dicuntur, quibus oculi distorti sunt, et inaequaliter mouentur. Hoc interdum fit mala consuetudine, si pueri aciem diu multumque in ea, quae a latere, vel propius ab oculis, sunt, oblique flectunt. Vel, si vnus oculus, morbo quodam affectus, diu opertus fuit. His lux et omnia, quae contueri cupiunt, ex aduerso et magis remota esse debent. Vbi puer adoleuit, eradicanda est consuetudo, alia, et priori contraria, ad quam rem plurimum facere potest, si puer in speculo diu et saepe obtutum in proprios oculos figit, et quidem, vt rectum recto, laeuum laeuo, oculo acriter et diu consideret. Hoc fere melius est, quam, si in oculos illigantur iuglandium putamina, quae parte anteriori, quae pupillae obuersa est, foramen habent, quibus etiam efficitur, vt oculus, si homo eo videre cupit, recte vertatur *. Nonnunquam intus in oculo processus ciliares, qui ex ligamento

ento ciliari educuntur, et qui lentem cum suo velamento in sede sua continent, atque etiam, si ea, quae ram sunt, intueri volumus, illam ad corneam adducunt, ex aliqua parte resoluti sunt, et vi sua destituti. Nam, sequitur, ut ex altera parte, ubi fibrae tegrae sunt, illae contrahantur et adducantur, atque ipsa lens cum suo velamento in eam partem vertatur et adducatur. Quo vero, si talis homo ea, quae ram sunt, videre cupit, pupilla ex aduerso oblique collocatae lentis sit, oculus musculis suis paulo in eam partem contorquendus est. Hoc etiam fieri solet, si oculus ex alio vitio, veluti corneae ulceribus et cicatricibus, caligat, quare ille musculis in eam partem artitur, per quam melius homo cernere potest. Vel, omnis acies erepta in amaurosi fuit, is quasi negligitur, et non mouetur. Si, id quod in pueris rhachitiae aegris frequens est, inaequaliter intumescunt ossa, praecipue sphenoidium, per cuius foramina nervi oculos feruntur, premi solent nervi, qui ad musculos pertinent, et resoluuntur. Quae nervorum resolutio ex aliis quoque causis fieri potest. Plerumque oculus ita distorquentur, si orta a vulnere, vel iridolitis, aliisque occasionibus, magna suppuratione, musculi laesi sunt et contracti. Quibusdam hoc vitium a natiuitate est, quibus in partu ab obstetrice oculus vexatus fuit. Aliis illud haereditarium est, quoniam parentes etiam oculis obliquis et distortis fuere. ab his causis haec imbecillitas relicta fuit, nulla ope iuuari potest. Ea tamen foedior esse solet, ubi fornae hominis negligentia quoque accessit **.

* Vid. BARTISCH. p. II. p. 13.

** Vid. PORTERFIELD in the *Medical Essays* Vol. III. Obs. XII. pag. 160.

† De Strabismo leguntur in *Philosoph. Transact. Anglic. A. 1778.* Vol. LXVIII. et ex his excerptae in RICHTERI *Biblioth. Chirurg.* Vol. V. observationes nonnullae, quas DARWIN inseruit.

VRINAE REDDENDAE DIFFICULTAS.

§. 1329.

Venio ad ea, quae circa vrinae itinera et vesicam oriri solent. Vrina interdum non redditur, cuius rei plures causae sunt. Quandoque vitium est in renibus, vel in vreteribus, per quos vrina in vesicam destillat. Id vero ex dolore intelligitur, qui lumbis et id, quod super inguina est, occupat, accedit frequens vomitus. Locus vero sub pectinis ossibus, quae vesicam tuentur, nec tumet, nec dolet. Huius vitii curatio a Medicis requirenda est. Vbi vero vesica suo humore distenditur, eo loco sub pectine et tumor est et dolor. Tumor etiam digito occurrit, in viris si in anum demittitur. Vbi valde intenta est vesica inflammatio cum metu gangraenae excitatur, et aeger inter miseros cruciatus etiam cibum et bilem perire non reddit. Interdum sibi vrina in vesicae ceruice viam facit, et per vlcus, ex gangraena, vel suppuratione natum, erumpit.

§. 1330.

Si vesicam inflammatio tenet, id quod ex dolore, febre, et aliis indiciis (1329), sciri potest, protinus sanguis mittendus est ex brachio, dandaque sunt, quae leniunt. Proficit decoctum radicis althaeae, hordeum. fl. verbasci, papaueris rhoeados; vel componi potest ex seminibus papaueris et amygdalis cremor, quibus omnibus parum nitri adiicitur. Homo etiam in balneum demitti, vel eius abdomini oleum anethi illi potest. Balneum vero nocet, vbi iam inflammatio adoleuit, et in scroto gangraenae metus est. Nec illi decocta utilia sunt, vbi vesica iam multum distenditur. Si vero malum his vinci non potest, oportet vrinam manu emoliri, vel demissa in vrinae iter et vesicam fistula

tula, quam Graeci καθετήρα vocant, vel, si haec de-
mitti non potest, facta plaga et perforata extrinsecus
suffraganea. De quibus curationibus protinus dicam.

† Si quam partem vesicae vel vrethrae inflammatio tenet,
saepe multum auxilii aegrotis affertur, si plures sangui-
fugae, decem vel duodecim, in perinaeo adhibitae partes
eas sanguine suo exhauriunt; et nihilo secius necessariae
sanguinis missiones aliaeque fiunt, quae ab symptomatibus
indicantur.

§. 1331.

Nec vrina efferri potest, si eius iter collapsum est,
quod senectute fit, vel, si medulla, quae per spinam
curritur, et ex qua nervi ad vesicam pertinent, laesa, et
nervi resoluti sunt*. In hoc casu saepe res postulat,
ut toties vrina vrget, eam toties demissa in vesicam
tula euocare. Ex hoc vitio fere semper contrarium
accidit, ut post homini vrina sine voluntate destillet.
Auxilio eodem etiam quandoque egent, quibus, quod
diu continuerunt, vesica multum intenta, et ob id
suae tunicae laxatae fuerunt. Fistula in vesica relinqui
potest, et in eam etiam immitti decoctum, quod in
vesica aliquem sensum excitare potest. Cum hordeo
coquitur ex aqua herba hyssopi, marrubii, maioranae,
tae, alchymillae, et adicitur parum, octava circiter
pars, aquae vulnerariae. Vbi vesica iterum ad con-
suetudinem suam et pristinum robur rediit, id quod
saepius post plures dies accidit, recipitur fistula.
oportet vero hominem monere, ut frequentius min-
uet, ne vesica multa vrina in eam contracta iterum
stendatur laxeturque**.

* Vrinae suppressionem ex luxatis vertebrae lumborum vide
in Eph. Nat. Cur. Dec. III. A. IV. Obs. 126. p. 257.

** Catheter, ubi is in vesica relinquitur, septimo circiter quo-
que die educendus atque purgandus est, cum is ea materia,
quae ex vrina desidit et ei inhaerescit, asperior fieri, et
vrinae iter offendere, possit. Etiam ad id idonei sunt ca-
tetheres flexiles, quos infra describam, vel, qui ex plumbo
facti sunt, parum incurui, nec valde longi.

§. 1332.

Obferuatione compertum eft, laxata intentaque vefica, aliquando fuper pectinis offa tumorem manere quamuis vrina prouenire videatur. Haec res nonnullis opinionem fecit, ibi fuppurationem futuram effe qui etiam ad aperiendum tumorem confilia dirigerent non dubitauerunt. Vbi vero tandem fiftulam in veficam recte compulerunt, magna vis vrinae profufa effluit et omnis tumor defedit. Non difficile eft, abfceffum a tumore, qui ex leuata vefica nascitur, difcernere. Abfceffus durior eft, vel in parte media mollior, huius vero tumorem fibi ex omni parte aequalem effe oportet.

- * Vid. qui omnium optime de vrinae reddendae difficultate fcripfit, FRANC. COLOT *de l'Operation de la Taille* p. 266. Conf. DE LA FAYE in notis in DIONYSII Librum p. 200. Si vefica multum intenditur, oriri poteft hernia veficalis de qua §. 793. 850.

§. 1333.

Vrinam etiam naturaliter reddi, prohibent quaedam, quae fe intus opponunt. Interdum cruentae vel purulenta, ex renibus descendunt. Incidere poteft, vt fanguis in vefica cogatur et poft laboriofis nitibus magnisque doloribus excernatur, qui, fic per vrinae iter expreffus, lumbrici figuram accipit*. Rati alii verique vermes hoc iter intercludunt**. Longe frequentius calculus prolabitur. In omnibus his calibus fiftula demitti, et id, quod fe oppofuit, emoueri debet.

- * Vid. Eph. Nat. Cur. Dec. I. A. VI. Obf. 46. p. 88.

- ** Vid. IO. RHODII Obf. Med. Cent. III. Obf. 36. p. 15. Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. I. Obf. 77. p. 183.

- † Ad hunc cafum non femper opus eft cathetere feu fiftulam, fed ceruus faepius fufficit, a quo vrinae itineri minor vti infertur.

§. 1334.

Casus asperior est, si vesicae varii generis tumores creuerunt. Hoc plerumque in parte interiori incidit; si vesica exulcerata, vel asperiori calculo, etiam medicamentis valentioribus, vrinam mouentibus, agitata, fuit. Tumores interdum duri sunt, sine dolore, et molles, carni putri similes, qui tactu dolorem exant. Et haec tubercula prohibent, quo minus vesica se contrahere et vrinam exprimere possit. Huiusmodi haec curatio est. Vesica ea ratione, qua iis, quibus calculus eximendus est, inciditur, et illa tubercula medicamentis lenioribus, quae pus mouent, in vaginam demissis, in pus vertuntur *.

Vid. COLOT. p. 274. qui etiam, carnem putrem et tubercula exteriori vesicae incrementum, ostendit, quod vero morbi genus nullam curationem recipere potest.

§. 1335.

Vulgatissimum vero vitium est, quando in vrinae itinere tumores nascuntur, qui illud praecludunt, et, nec vrinam efferri, nec fistulam demitti, sinunt. Hoc vitium vrinae crebra cupiditas, sed magna difficultas, est, quae guttatim, sub acerbissimis doloribus, redditur. Nec res, et summa illa vrinae difficultas, plures fefellerunt, et opinionem fecit, in vrinae itinere, ex putri carnis natas esse carunculas, id quod vel ideo a vero propositum visum fuit, quod hoc valetudinis genere iis praeteritis conficiendum est, quibus diu purulenta sanies ex urethra effluxit, et quibus haec maligna et venerea gonorrhoea alienis reprimentibusque medicamentis tentata. Igitur, hac coniectura ducti, praesidium petierunt a medicamentis rodentibus adurentibusque, quae in vrinae iter, vel per fistulam argenteam, ad id commodatam, bacillo, vel etiam cereo, illita, deferunt, ut tumores illos tollerent *. Sed non raro ratio minus feliciter cessit, et illorum valentiorum

medicamentorum usu, omnia exasperata, et graues etiam inflammationes concitatae, fuerunt. Incisa autem cadauera ostenderunt, id, quod urinae iter pracludit, non putrem carnem, vel carunculam, esse, sed frequentius callum et cicatricem ex malo ulcere, per gonorrhoeam, relictam **. Nonnunquam intumescit ille eminentior locus in vrethra, carunculam feminalem, vel caput gallinaginis, vocant, ubi et vesiculae minales et glandula prostatica, per minores fistulas, exitum habent ***. Interdum vero alia itinera, praepue ea, quae ex glandulis, quas COWPERVS delineavit, et mucosas vocavit, educuntur, a mala materia intumescunt, et cum ea ad urinae iter pertineant, haec praeccludunt *. Nec a vero alienum est, quod adhaeruerunt, laxari intus in urinae itinere, interiores tunicam, et venas praeter modum intumescere ac varicosas fieri **. Incidere tamen potest, ut, quae olim plurimorum fuit sententia, iam vero vix non ab omnibus relictis, ulceribus, in urinae itinere serpentibus putris caro supercrescat, vel ut alia nascantur tubercula, quae medicamenta requirunt, ad continendum exedendumque putrem carnem idonea ***.

* Iam GALENVS *Lib. I. de Locis affectis Cap. I. T. VII. Ed. CHARTERII* p. 381. Tria potissimum esse scripsit, quibus urinae iter praeccludi soleat. Aliquando corpus ipsum (vrethrae) intumescere, ut nullum iter relinquatur, idque fieri, vel ex inflammatione, vel scirrhus, vel abscessu, vel alio tumore. Nonnunquam carnem ex ulcere, calloso corpus (cicatricem) ex crasso lentoque humore nasci. Interdum vero se opponere, vel calculum, vel cruentum, verpus, vel crassum lentumque humorem. Dicit, se vidisse aliquando hominem, cui caro, vrethrae innata, catheter demisso, fuerit rupta, ita, ut urina et cruenta et carno traxerit. Cum vero Saeculo decimo sexto in Europam accessissent venerei morbi morbi contagiones, ab India occidentali profectae, illaeque latius manarent, et totam fere Europam affligerent, longe plures a medentibus operae aduersus hanc valetudinem petierunt. Horum non pauci circa medium illius saeculi, excitati fuerunt, et inter haec principes ANDREAS LACVNA, *Segouiensis*, et ALPHONSUS FERRIVS

FERRIVS, quorum prior Anno MDLI. Romae; alter Anno MDLIII. Lugduni, singulari industria, de hac caruncula scripserunt. Hi autem, et fere omnes, qui eos secuti sunt, medicamenta rodentia, medio cereo, in vrinae iter demittenda praeceperunt. Vide variorum medicamentorum ab Autoribus adhibitorum compositiones, in FRANCISCO RONCALLO, qui etiam nouum inuentum superaddidit. Proposuit enim fistulam flexilem, vel, vt vocat, vermicularem, ex argento factam, et fascia tenui sericea super eam confuta, comprehensam. Hac fistula media, carunculae melius admoueri medicamenta, et ipsam etiam fistulam, si res illud postulare videatur, per plures dies in vrinae itinere atque vesica relinqui posse, ostendit. Vid. FRANCISCI RONCALLI Exercitat. Med. Chirurg. de noua methodo extirpandi carunculas et curandi fistulas vrethrae. Brixiae MDCCXX.

Carunculae seu species fungosae carnis excrecere solent ab usu s. ab abusu iniectionum oleosarum et balsamicarum. Hanc causam difficilioris excretionis vrinae subesse docet sanguis ad contactum cereorum ex pene effluens.

In cadauere hominis, qui hoc morbo, quo per longum tempus conflictatus fuerat, inuenit IOANNES CONRADVS BRVNNERVS nihil aliud, quam *in medio vrethrae insignem stricturam et coarctationem, veluti ex adustione, circa prostates mira cicatricum ex ulceribus antiquis, inueteratis, nunc persanatis, facies fuit conspicua, et summa meatus angustia, quae catheterem vltiori progressu prohibuit.* In Ephem. N. C. Cent. I. Obs. XCVII. p. 200. et in alio homine ex Empyemate mortuo, qui viuus etiam eodem morbo vexatus fuerat, reperta fuit, hinc inde *mera angustia et coarctatio vrethrae, qualis in vasis umbilicalibus, post partum occallescentibus obtingere solet.* Vid. c. l. Obs. LXXI. p. 143. DIONIS in Chirurgia Demonstr. III. p. 271. se nunquam in corporibus carunculam, sed cicatricem et callum inuenisse asseuerat. Is vero etiam medicamentis rodentibus ad callum excidendum vtitur, quae mediante cereo admouere iubet. Haec vero medicamentorum genera interdum graues inflammationes mouisse mortemque attulisse probat SAVIARD Obs. 74. p. 324. Vid. plura lectu digna in Notis, quas DIONIS Libro adiecit G. DE LA FAYE p. 199. sq.

† Multo saepius in vrethra eorum, qui gonorrhoea maligna diu multumque afflicti, post mortem nihil alieni repertum esse, testatur MORGAGNI in Lib. de sedibus et causis morborum. In illis igitur interior tunica vrethrae debiliior et relaxata videtur subinde admisisse nimium humorum in vascula affluxum, et inde orto tumore effluxus lotii cohibitus

bitus. In eorum, qui succos acres et scorbutum in corpore alunt, vrethra omnis cellulositas intumescit, si gonorrhoea laborant. Ab eadem causa, etiam sine abusu iectionum possunt existere vrethrae constrictione, carunculae, ulcera impura, callosa. Cacterum de natura, incommodis et curatione caruncularum multa scripserunt DE PEYRONIE et PETITVS in *Monum. Ac. R. Chir.* Vol. Quaedam etiam *Petr. Camper in Demonstrat. Anatom. pathologic.* Lib. II. qui simul eas in cadaueribus ab se non quam repertas esse fatetur.

*** Hoc pluribus obseruationibus probant ANTONIVS BENI VOLI p. 19. et GIROLAMO MARINI in *Pratica delle Operazioni di Chirurgia Cap. IV. p. 58.*

* Vide *Glandularum harum Descriptionem* COWPERI Tab. I. 5. Tab. II. G. et huius iter a retenta materia ampliatur Tab. III. H. et I. Confer quae habet TERRANEVS de *glandulis vrethrae virilis* p. 112. et additam iconem.

** Haec defendit GARENGEOT *des Operations* T. II. p. 21.

*** Hoc propriis et aliorum Obseruationibus probat IOHANNES ADAMVS GENSELIVS in *Ephem. Nat. Cur. Cent. Obs. 84. p. 349.* cum quo sentit Celeb. ASTRVC de *mor. Venereo, Lib. III. Cap. IV. p. 310.*

††† Frequens causa vrinæ suppressae cernitur in tumore prostatico eorum, qui gonorrhoea virulenta aut laborant aut laborarunt. Intumuisse eam intelligimus, si digitus in anum datus tumorem eum percipit; praeterea homo sine nixibus micturienti compellitur ad desidendum, atque homo auctis nixibus effluxum vrinæ accelerare conatur ea prorsus retinetur. Si in cauo vrethrae impedimentum quoddam est, vrinæ flumen aut nullum, aut exiguum, tenue, aut diuisum, aut non rectum sed obliquum et quod contortum esse solet. Vrethra explorari quoque potest specillo; id enim in loco impedito resistantiam offendit.

§. 1336.

Ab his obseruationibus vero noua medendi ratio ducenda fuit. Aliena sunt et vrinæ difficultates augent omnia acriora, quae, ore sumpta, vrinam movent. Nam, et haec, et omnia, quae rodunt, aduruntque, in vrinæ iter, varia ratione, eum in finem demissa, ut putrem carnem ac carunculas exedant, pessima sunt, quae malum concitare possunt, et motum inflammatione, accendere. In vrinæ iter coniciantur

ex cerei minores, vel bacilla, quae ex carbaso, panno
 oleo tenuissimo, certa ratione contorto, fiunt, Gallis
ongies. Haec oportet, nec nimis plena esse, nec
 nimis tenuia, et parte sua extrema, paulo magis te-
 nata. Ea oleo vncta, in vrinae iter, intorquentur,
 in eo relinquuntur. Necesse vero est, vt ab initio
 his bacillis tenuiora adhibeantur, post paulo ple-
 ora. Si vrinae iter adeo coarctatum est, vt illa de-
 titi nulla ratione possint, non desistendum, sed res
 perienda est, adhibita chorda chelys ex animalis in-
 stino parata. Vbi tenuior intorqueri in vrinae iter
 obtuit, post paulo plenior adhibenda est, et post ba-
 lum inferendum. His vero inungenda sunt medi-
 menta lenia, adeps liquata, oleum, butyrum sine
 le, quibus, si vlcus est, modice reprimentia adiici
 possunt, et variis misturis temperari. Haec vero in
 inae itinere contineri debent, id quod magis necessa-
 um est, si illud valde angustum, callusque, qui ei in-
 reuit, durior est. His enim bacillis ea, quae se appo-
 terant, et comprimuntur, et molliuntur, vt humor
 possit transfluere. Homo, si vesica exoneranda est,
 acillum debet recipere, et iterum vnguento illitum,
 aserere, atque etiam illud fascia, quae ventrem cir-
 umit, alligare*. Auxilio quoque est balneum, vt
 homo saepe in aqua calida, super herbas, quae molli-
 ndi vim habent, desideat.

* Hanc curandi viam prius ingressus esse videtur Medicus,
 cuius *Observationes RIVERII Operibus adiectae sunt, Obs. 22.*
p. 695. Is vero bacillo ex plumbo vsus est, quo vrinae
 iter dilatavit. Bacilla plumbea illis cereis praefert ASTRUC-
 CIVS *c. l. Lib. III. C. IV. p. 320.* qui iubet, ab initio tenu-
 issima, mox pleniora, oleo illita, immittere, et sic viam
 aperire.

† Cereorum seu bacillorum seu candelarum vsu hodie nihil
 frequentius est, tum quod, si recte adhibentur, aegrotis
 multum auxilii affertur, tum vero etiam, quod nonnulli
 cereos arte arcana ab se parari gloriantur, eosque vendendo
 immensam nummorum vim corradunt congeruntque. Prae-
 cipua

cipua eorum utilitas spectat quidem vrethram, si a var
 intus impedita est, expediendam; possunt tamen et orifi
 um vesicae liberare ab obstruentibus calculis, grumis sa
 guinis, pituita, itemque ad latus reprimere venas vari
 fas, quas haemorrhoides vesicae vocant. Vice cathete
 fungi quodam modo possunt in vesicam usque propuls
 si cauae sunt candelae. Gonorrhoeam malignam repress
 stimulo suo reuocant. Parari autem magna diligentia
 bent, ne aut nimis crassae aut asperae aut in capite suo a
 teriori acutae pungentesque sint. Quamobrem non soli
 salua imbui chorda chelys ex intestino animalis parari
 debet sed in suo capite diligenter digitis dentibus
 comprimi ante applicationem, ut capitis illius ora acut
 deleatur, fiatque laeue id et subrotundum. Materie
 emplastica varia est, qua tela ex lino tenuis imbitur
 Sicallus, si angustia, si effluxus impurus restituendus in v
 vrethrae est, emplastrum emolliens aptissimum est; si vlcer
 si carunculae, cera flaua et extractum saturni varia ratio
 remisceri possunt, ut cerae librae pondo adiciatur extra
 illius vel uncia dimidia, vel integra vel unciae duae qu
 tuorue. Acria, vix ipsa therebinthina, recte admiscetur
 quod vel mollissima candela aliquantum irritat vrethra
 intus sensu acuto pollentem. De usu haec scire lice
 Non raro cereus tanquam corpus alienum, sanata callositate
 concitat effluxum muci copiosioris, qui a purulento disce
 ni debet. Remoto cereo desinit ille. Prodest tum len
 purgatio alui iterata, usus balnei frigidi, aqua mineral
 acidula. Quia ne mollior quidem cereus omni stimulo
 caret, nunquam longiori, quam opus, cereo utendum. Ne
 cereus, noctu praecipue, gliscat in vesicam, providendum
 Itaque aut cubitum iturus educat ponatque, aut cerei ca
 put, quod foras spectat, filum sat longum atque tenax ha
 beat, quo possit certo retrahi; nam sola inflexio capitis
 illius casum grauem cum non satis tuto cauet. Cereu
 diutius retentus adhibitusque amittit vim medicinale
 suam. Subinde nouis utendum. Antequam cereus in
 vrethram datur, homo, si potest, urinam reddat, ne oculu
 retrahendus sit cereus; nam recens immixtus hominem ac
 mingendum compellit, cui quidem stimulo non obsequen
 dum est; breui enim cessat. Si cereo reuocandus est efflu
 xus materiae malignae, urinae reddendae difficultas primo
 augeri videtur, quoniam vlcus clausum tantisper tumidius
 fit; verum, effluxu reuocato, difficultas ea cessat. Vrethra
 subinde per horas, educto cereo, quiescat.

§. 1337.

Sunt alia quaedam, quae prohibent, quo minus
 urina reddi possit. Id incidit grauidis, si intus a par
 tu,

aliter collocato, urinae iter comprimitur. Et haec illam curationem per fistulam argenteam desiderat. Nec difficile est huic vitio mederi in viris, si alius adstricta est, et rectum stercore duro plenum. Interdum magni acerbique dolores, quibus ii excruciantur, quibus haemorrhoides ex inflammatione tument, extatis spasms, urinae iter praecludunt. His ea auxilia opitulantur, quae aduersus hos tumores alibi proposui (1015. 1016). Etiam abscessus fiunt ex variis causis, in perinaeo et circa anum, cum quibus, nisi celeritas accesserit, magnus dolor grauisque inflammatio esse solet (990 ad 992). Casus asperior est, si tales abscessus viam in vesicam reperiunt, ut multum pus cum urina exeat. His pus euocandum est, obseruatis omnibus, quae supra (993 ad 996.) praecepi. Intraerea vero, si ex urinae difficultate periculum imminere videtur, etiam fistula argentea adhiberi potest.

ΚΑΘΕΤΗΡΙΣΜΟΣ.

§. 1338.

Si vero in his, aliisque, casibus necessarium est, manum, et demissa in vesicam, argentea aeneaue fistula, catheterem vocant, urinam emoliri, eum, qui curaturus est, oportet habere illarum fistularum plures, ut omni corpori, ampliori, minorique, aptae sint. Viris incuruae et longiores, foeminis vero rectae et breues sunt idoneae. Oportet eas laeues esse, neque nimis plenas, neque nimis tenues. Parte extrema, qua in vesicam inferuntur, clausae atque retusae, vtrinque vero ad latus perforatae sunt. Habent etiam ex eodem metallo filum, quod in eas coniicitur, ut, si forte se aliquid in fistula apposuerit, id eo possit emoueri.

§. 1339.

Alia genera fistularum sunt, quae iam olim PETRVS FRANCVS delineauit *. Extrema parte non vt priores, ad latera perforatae sunt, sed infra apertae. Nam incidere solet, vt in vrinae itinere, illa interior tunica, quod, vel laxata est, vel inflammata, intumescat, vtque ea, si illi catheteres demittuntur compellunturque, illis foraminibus recipiatur et grauiter offendatur. Igitur in his, a FRANCO excogitatis, extremo ori adaptata est glebula, quae illi argenteo filo, quod per fistulam traiectum fuit, ita ferruminata est, et accommodata, vt hanc claudat, atque vt fistulae extremum sit clausum, nullamque asperitatem habeat. Vbi hoc catheteris genus in vesicam demittendum est, adducitur illud argenteum filum cum sua glebula, et fistula clauditur. Vbi vero in vesicam ventum est, filum cum glebula per fistulam intro compellitur, vt vrina per hanc exire possit.

* Vid. *Traité des Hernies Chap. 31. p. 115. GARENGEOT des Instrumens T. I. C. VIII. Art. 3. p. 259. et fig. p. 278.*

† Si catheteres pluribus foraminibus minoribus perforati sunt, non adeo multus metus est, ne tunica interior vrethrae offendatur, maior vero, si illi vtrinque incisi sunt. De figuris catheterum docte exposuit atque varietates tres, scilicet catheterem Rauianum, Cheseldenianum, Scharpianum, pingi curauit PETRVS CAMPER l. c. Ea ab illis, qui vel catheteres in masculorum vesicam demittere vel calculi curationes perficere satagunt, legi vtique debent. Paucis enim verbis comprehendendi non sic possunt, vt lector satis instruat.

§. 1340.

Etiam in illis catheteribus, vel fistulis, quae mulieribus aptatae sunt, aliquid fuit mutatum. Habent enim, quibus fuleus impressus est, super quem, si fistula in vesicam coniecta fuit, demitti potest stilus, vel etiam, si res cogit sectione vrinae iter aperire, scalpellus *.

* Vide Iconem in HEISTERI *Chirurgia Tab. 32. fig. 7. p. 1016.*
§. 1341.

§. 1341.

Sine negotio in mulieribus, quibus vrinae iter bre-
 e rectiusque est, catheter in vesicam coniicitur. Hoc
 vero in viris, quibus id longius est et incuruum, non
 raro etiam intus ex inflammatione aliisque occasione-
 bus (1335.) extumidum, vel coarctatum, plus difficul-
 tatis habet. Nam summum periculum est, si catheter
 prohibita vi promouetur, ne eo vrinae iter, vel vesica,
 conuulnerentur, ex qua re grauis inflammatio atque
 gangraenae metus oriri potest. Haec catheterem de-
 mittendi ratio non nisi usu discitur, quare tirones se
 in hac re sedulo exercere, tam in demortuorum quam
 uiuentium corporibus, oportet, ut sibi exercitatione
 facilitatem pariant.

§. 1342.

Duae vero sunt catheterem demittendi rationes,
 quarum prior, quae non, nisi frequenti usu et exerci-
 tatione, addiscitur, maiorem securitatem praestat,
 quamuis altera minorem curanti difficultatem facere
 videatur. Qui priorem rationem ineunt, hominem
 resupinum, super subsellium aut lectum, collocant, chi-
 rurgus altera manu colem masculi continet, altera fistu-
 lam, oleo perunctam, in vrinae iter demittit, ita, ut
 huius pars gibbosior pubi hominis obuersa sit. Eam
 leniter premendo promouet, ubi vero ad vesicae cer-
 vicem ventum est, colem paulo magis super fistulam
 adducit, huius autem manubrium, quod iam perinaeo
 obuersum erat, ita flectit, et quasi in gyrum vertit,
 ut illud iam aduersus umbilicum sit, qua motione
 fistulae extremum in vesicam compellitur.

§. 1343.

Altera vero ratio curationis eiusmodi est. Collo-
 cato, ut dictum est, homine, fistula ita demittitur, ut
 eius manubrium umbilico admoveatur, et ut pars gibba
 peri-

perinaeo hominis obuersa sit. Quando, adducto etiam cole, ad vesicae ceruicem ventum est, fistula, simul cum cole antrorsum inclinata, in vesicam compellitur.

§. 1344.

Cum sic fistula in vesicam peruenit, educitur ex eodem filum, vel in altero genere, quod infra clausum est, promouetur cum filo glebula illa, ut vrina per fistulam effundi possit. Si vero, calculi inueniendi causa, catheter demissus fuit, ille curiosius agitandus est, ut calculus, vel tactu, vel etiam, si catheter eum pulsat, auribus percipi possit. Vbi euacuata fuit vrina, recipitur fistula, si vero res desiderat, ut illa relinquatur, demittenda est alia flexilis, ex filo argenteo intorto, singulari artificio fabricata, quae ventri media fasciâ alligatur.

† Catheteres flexiles, in vrethra relinquendos quidam parant ex tela sericea cerata, quae super chordam suo tempore remouendam conuoluitur, et filis ceratis circumductis in speciem fistulae formatur. THEDENIVS ex resina elastica, quam hodie repererunt et ita vocant, eos efformat. Aliquando accidit, ut, cathetere in vesicam immisso, nulla effluat vrina, quod foraminula eius sanguine spisso obturantur. Praestitum esse debet catheter, in cuius capite cochlea foemina est, et siphon fat magnus, cui est cochleae mas, quo educi ex vesica humor queat. Hunc apparatus video ab ALEXANDRO ZELLAI vocari, *Antlia aspirante* in singulari libello Italico, verso teutonice et inscripto: *Betrachtungen über das Verfahren den Urin aus der Blase zu ziehen, übersetzt von IOH. DAVID HOMBERG. Breslau 1775.*

PARACENTESIS VESICAE.

§. 1345.

Nonnunquam autem tantum mali subest, ut illud nec hac ratione vinci possit, sed necessarium sit, ut vrina exitum habeat, vesicam ferramento, extrinsecus aperire. Igitur, qui curaturi sunt, ceruicem vesicae incidunt scalpello ancipiti, eo loco, ubi plaga sit, si calcu-

calculus methodo, quam cum apparatu magno vocant, e qua infra dicam, eximendus est. In plagam coniungunt fistulam paulo pleniorē argenteam, quam tantum relinquunt, et ventri alligant, donec id, quod in urinae itinere inhaeserat, fuerit sublatum. Fistula commode panno serico cerato obuoluitur. Prae caeteris aptae sunt fistulae argenteae flexiles, vel plumbeae (1344).

§. 1346.

At vero, cum haec plaga non facile coire, et saepe ulcus, vel fistula, manere soleat, per quam humor destillat, quidam acu, seu ferramento, vtuntur, ei simili, quo aqua hydropicis emittitur (756), quod acutum fistulam, ex argento affabre accommodatam, habet. *Troicars*) Neceffe vero est, vt ferramentum et longius sit et paulo plenius. Id vero alia et ea parte demittitur, qua vesica aperitur ab iis, qui calculum sectione, quam lateralem vocant, promere solent, qui opportunior esse videtur, quod plaga facilius sanescit*, quem infra describam.

* Vt is, qui cutaturus est, scire possit, num ferramentum in vesicam peruenerit, DENYSIVS in *Obseru. Chirurg. de calculo Tab. XI.* illud mutauit, et ita accommodauit, vt quamprimum cuspis in vesicam penetrauit, per fistulam argenteam, quae plura in suprema et infima parte foramina habet, vrina efferatur. Alii ferramento, seu acu vtuntur, cuius fistula fulcum habet. Nam interdum plaga amplianda est, et tunc super illum fulcum commode scalpellus demitti et vulnus incidi potest, donec satis pateat.

§. 1347.

Postquam autem ante aliquot annos, quidam supra pectinis ossa, vesicam incidere, et calculum ea ratione, quam olim PETRVS FRANCVS proposuerat, eximere iterum instituerunt, pluribus ille locus caeteris aptior visus fuit, qui ferramentum illi prorsus simile, quo aqua hydropicis euocatur, supra pectinis ossa, oblique, atque vesicae ceruicem versus, demittunt. Recta enim in-

feri

feri non debet, ne peritonaeum, quod supremæ vesicæ inhaerescit, conuulneretur. Etiam per hanc plagam euocatur vrina. Cum vero vulnus non facile sanescat et ex vrina, si per id effluit, mala vlcera in tunica illa cellulosa, quæ sub peritoneo est, nascantur, oportet hominem supinum cubare. Per naturale autem vrinæ iter, si id fieri potest, in vesicam demittenda est fistula vt per hanc vrina exeat. Rarius euenire poterit, vt in foemina vrinæ iter ita interclusum sit, atque id, quod se opposuit, aliter tolli nequeat. In eo vero casu hac ratione aperiri posset vesica. In viris magis tuto id fieri solet, inciso eo loco, per quem calculus sectione, vt vocant, laterali expellitur.

§. 1348.

Emissa vrina, et iis, quæ se intus opposuerunt, remotis, vulnus glutinandum est. Plurimum confert; si aeger iunctis et inter se deuinctis cruribus cubat, et si fistula in naturali vrinæ itinere relinquitur, vt per hanc vrina exeat.

† Punctio in perinaeo incerta, dolores mortemque affert; saepe enim non peruenitur in vesicam; et si eo peruentum fuerit, multus tamen dolor sequitur. Et vt fistula inferri queat, opus est dilatatione vulneris, ope sulci in fistula acus triquetrae reperiundi; in quo scalpellum chirurgus mouet, sic, vt fere chirurgia calculosi fiat. Nihilominus tamen LE DRAN eam rationem commendat in *consultations*. Vesicæ perforatio, quæ super ossa pectinis sit, plerumque non magis fida est; nam fistula acus triquetrae a vesica depleta deseritur, neque omnis vrina per fistulam eam effluere potest. A multis igitur iam praefertur ea ratio, quam FLVRANT inuenit et in *Miscellaneous chirurgicis* (*Melanges de Chirurgie par Mr. POUTEAU*) proposuit. Vesicam urina plenam et turgentem acu triquetra recurua, cui fistula argentea flexilis est, in intestinum rectum immissa, pertundi iubet. Hoc ipsum facile fit, quia tali casu vesica admodum tumida in intestino illo digito explorantis chirurgi sese sponte offert. Si digitus laeuæ manus in intestinum datus, maximæ turgescen-tiae locum percepit, eo, non retracto, veluti duce vtitur chirurgus, quo acus triquetra vna cum sua fistula a manu dextra chirurgi ferri possit vsque ad eum maxime turgentem vesicæ

vesicae locum. Peritus, aut saltem sat intelligens, lector haud aegre videt, acus mucronem ipsius, dum infertur feramentum per anum et intestinum vsque ad locum illum vesicae, in fistula sua reconditum ideoque acum, quantum necesse fuerit, retractam esse debere, ne quid, quod volumus, laedatur. Quodsi igitur, ista prudentia adhibita, fistulae orificium cum vesicae locum attingit, id ei apprimitur, quo facto, acus ipsa a pollice audacter et sic protruditur, vt mucro eius atque paene eodem temporis momento fistula in vesicam penetret et tam longe quidem, vt lamina fistulae fere ani orificium attingat. Eo autem ipso tempore laminam fistulae manus sinistra proxime ano admouet atque apprimat, vt dextra acum ex fistula educere queat. Posteaquam vrina effluxit, fistula in vesica relinquitur, eiusque lamina splenis impositis contegitur, atque haec omnia fascia apte applicata, in loco suo retinentur. Ita fit, vt per fistulam tamdiu vrina exeat, vsque dum impedimenta in vrinae itineribus reperiunda, sublata sint. Interea autem temporis propriis diuersisque remediis opus esse potest, de quibus iam non est agendum. Prioribus quidem temporibus fistulae orificium apertum esse, et vrinae effluxum liberum permittere debet; postea vero, si causae impediti per vrethram effluxus imminutae videntur, illud epistomio ligneo obturari potest, ne stragula praeter necessitatem madentia incommodo sint. Nullo modo committendus est fistulae intempestius egressus ex vesica; ergo in alui depositione lamina fistulae digitis retineri debet. Acus huius triquetrae iconem delineauit etiam PETR. CAMPER Lib. cit.

SECTIO PERINAEI.

§. 1349.

Interdum in perinaeo ex inflammatione abscessus fiunt, id quod accidere solet, si minor calculus ei loco inhaerescit partesque offendit, ac indies ex materia, quae ex vrina desidit, increscit, vel, id quod frequentissimum est, si gonorrhoea virulenta, sumtis medicamentis calidis, acrioribus, purgantibusque, vino, venere, agitata, vel reprimentibus cohibita fuit. Hoc si incidit, quod ex cognitis suppurationum notis sciri potest, ab initio diligentia adhibenda, vt auertatur inflammatio, cum tales abscessus difficilius ad sanitatem perueniant. Sanguis mittendus, alius ducenda est lotio.

lotionibus, et danda sunt omnia, quae aduersus inflammationem possunt. Si vero nihilominus tumor : suppurationem spectat, extrinsecus imponenda sunt, quae molliunt, et pus maturant. Hoc vero incisionem tumore mature euocandum, ne vlcus, quod intus exserpat, et in plures sinus diuidatur. Si inflammatio a calculo mota fuit, is euellendus est, caeteroquin verum vlcus purgandum, et obseruatis iis, de quibus protinus dicam, glutinandum est.

§. 1350.

Longe frequentius, in vrinae itinere, ex abscessibus, qui intus rumpuntur, vlcera manent et fistulae quae etiam nascuntur, si aduersus illas, sic dictas, carunculas (1335) adhibita fuerint, adurentia medicamenta, vel aduersus gonorrhoeam, acriora. Etiam calli nascuntur, vel calculi inhaerescunt, qui vrinae iter praeccludunt. Et haec res, si aliter succurri non potest, quandoque perinaei sectionem postulat. Ad hanc tamen nemo praeceps properare debet, cum non pauca sint, quae curationi difficultatem facere possunt.

§. 1351.

Vbi vrinae iter incidendum est, in id, si via patet prius coniicitur catheter, qui sulcum habet, et super quem, etiam in calculi curatione, vesica inciditur. Si vero illud ferramentum demitti nequit, res scalpello agenda est, vel in eum locum, incisa prius cute, coniiciendum est illud ferramentum, quo aqua hydropicis emittitur, seu acus triquetra, cuius fistula sulcum habet (1346). Super hunc enim, educto ferramento, scalpellus demitti, et plaga latius aperiri, potest.

§. 1352.

Cum via sic perfecta est, singulis vitiorum generibus propria curatio adhibenda est. Si calculus inhaeret.

t, eum oportet euellere. Si vlcera, aut fordida, aut tera, callosa, aut supercrescentia, in vrinae itinere nt, vel, si aliquid durius et asperius ibi natum est, id, od exulceratum est, circumpurgandum, durum vero molliendum, et, tum scalpello, tum medicamentis, tollendum est. Medicamenta melius vlceri admoventur, linteolum caesitium, cuius ora in fila resoluta est, ediante specillo, in plagam coniicitur, et per glandis turale foramen educitur. Linteolum enim, quod medicamento, ad exedendum callum purgandumque us idoneo, illinitur, in vrinae itinere relinquitur, bis de die adducitur, vt pars nouo medicamento ta subeat. Inter medicamenta fere optima sunt: guentum Arcae, cui aliquid mercurii dulcis adiicitur. Si autem vlcera, vel fistulae, in plures sinus diuidentur, necesse est, hos omnes incidi. Callus commo- scalpello praeciditur, vel exasperatur.

§. 1353.

Sunt aliae obseruationes necessariae. Vlcerata, quae, gonorrhoea, in vrinae itinere relinquuntur, interim tolluntur, si extrinsecus cuti mercurius, illaque mpositio, quam Neapolitanam vocant, perinaeo illitur. Si malo vetustas accessit, et vlcus callosum est, que plures sinus, qui altius penetrant, habet, id nullam curationem recipit. Si vitium ex morbo venereo tum est, huic morbo ante omnia, et antequam locus ciditur, medendum est. Saepe incidit, vt inflammata, quae perinaeum tenet, etiam in scrotum euocetur. otinus illud incidi oportet, et vlcus, altius concisum, purgari. Nec magnum periculum est, si scrotum corrumpitur (134). Vbi non solum vrinae iter, etiam ceruix vesicae, maiori plaga, incidi debet, in ne prius ferramentum compelli debet excauatum (allis *Gorgeret*) et super hoc fistula plenior ex argen-

to, demitti. Interea autem lotiones ex decocto herbarum dei, addita pauca aqua vulneraria, vel, si aliquid diggerendum est, adiecto melle cum rosa, in eam immitti possunt.

§. 1354.

Si incisa vesica fuit, omnia auxilia adhibenda sunt, quae inflammationem auertere possunt. Sanguis inutilis detrahendus, abdomen oleo inungendum, et, tum huic, tum vulneri, adhibenda fomenta sunt. Aegro oportet ab omni fere cibo abstinere, potione autem non immodica, ex ptisana. Nam, si plus aequo bitur, vesica impletur, si nimis parum, vulnus vrinacri irritatur. Nec vulnus prius medicamentis indigentibus agitandum, aut callus scalpello exasperandum est, quam, ubi, leuata inflammatione, se suppuratum ostendit. Illi superdari debent ab initio linamenta sicca, post vero balsamum ARCAEI. Si vlcerata ac fistulosa omnes incisae, dura autem in pus versa, fuerint, incisa fistula argentea, et linteolum etiam caesitium, si adhibuitum fuit, recipi possunt, per naturale vero vrinacri iter, alia fistula, minus plena, seu catheter flexilis, vesicam demitti, et ibi relinqui, debet, ut vrinam per hanc, non per plagam, exitus detur. Vulnus alendum est, glutinandumque, quod saepe difficilius curationem recipit, ita, ut nonnunquam, praecipue in corporibus siccioribus, gracilioribusque, fistula maneat. Necessarium est, ut aeger, et extentis, et iunctis, feminibus ac corporibus, iis etiam inter se fascia deuinctis, iaceat. Summa cura prouidendum est, ut vrina per argenteam fistulam quae semper in vesica relinquenda est, non per vulnus, destillet. Fascia vulneri idonea est, quae ventrem comprehendit, duas alias habenas, ei a tergo, ad similitudinem literae π assutas habens. Habena ad perinaeum, ubi vulnus, et quae ei imposita sunt, conteguntur, et ab hoc ad ventrem ita dantur, ut dexterior finis

inferior dextra, procedat, et vtraque cum alia, quae circumdatus est, deligetur. Hac fascia etiam, et id saepius dicendum sit, vtendum, si vesica propter ulculum incisa fuit. Ne scrotum a destillante vrina irritetur, ea, quae per fistulam, in vesica relictam, fluit, vasculo excipi, ipsum vero scrotum panno secco cerato contegendum, inuoluendumque est, et suspendendum *.

* Hanc medendi rationem, vt vanam, repudiavit ASTRUCIUS l. c. Lib. III. Cap. IV. p. 318. Addit enim, se nonisse plures, quibus, diu a Chirurgis excarnificatis, ex hac curatione, longe grauior *σπαραγγελη* fuerit relictā, etsi caeteroquin illa feliciter cesserit, et vulnere cicatrix induta fuerit. Vrinae enim iter ex cicatrice multum coarctari, et fere intercludi. Sed illud, vt videtur auerti potest, si argentea, vel plumbea, fistula in vesica, relinquitur, donec omnia ad sanitatem pervenerint, et, si etiam, post finitam curationem, illa bacilla, ex panno cerato, in vrinae iter coniciuntur, et in eo continentur, quibus illud ampliatur. Pluribus exemplis hanc curandi rationem confirmavit supra laudatus COLOT l. c. Eam vero, neque omni tempore, neque in omni aetate, neque in omni corpore, neque etiam in omni vitio, experientiam esse, quilibet videt. Interdum vero, vbi aliter homini succurri nequit, etiam temeraria medicina profuit.

FISTULA PERINAEI.

§. 1355.

Quandoque in perinaeo fistulae relinquuntur, si magna suppuratione, vel etiam gangraena, orta, multa exciderunt, vel, si necessarium fuit, plagam diu vitare, cum tardius purgari potuerit vesica et vrinae iter. Etiam id incidere solet, si maior calculus, inciso perinaeo euulsus, et vesicae ceruix maiori vi rupta, vel, vulnere non idonea curetio adhibita fuit. In hoc casu perinaeae vlceris concidendae et exasperandae, vulnus vero appositis medicamentis, quae carnem nutriunt (338), implendum est. Ad id vero necessarium est, vt aeger super extentis cruribus, feminibus inter se deligatis,

Aaa 2

iaceat,

iaceat, et vt vrina, per fistulam, in vesica relictam euocetur. Vbi orae vlceris purgatae fuerunt, et vulnus impletum, raro id deligari oportet. Si autem fistula ex toto claudi nequit, opera danda est, vt coarctetur. Si vero his curationibus prohiberi non potest, quo minus per plagam vrina exeat, autores quaedam machinamenta inuenerunt, quibus vlcus fistulaeque comprimitur.

* Vide NVCKIVM fig. XI. HEISTERVM Tab. XXVI. fig. 10.

† De fistulis tum vesicae, tum perinaei animaduersiones nonnullas PETR. CAMPER l. c. collegit, quas legisse non possint eos, qui illarum curationes in se suscipiunt. Idem lingua sua vernacula edidit. Animaduersiones in Hippocratem, Celsum et Paulum de fistulis et prolapsu ani, quae Germaniae superioris Chirurghi germanice versas legere possunt. Inscriptus libellus est: *Abhandlungen etc. über die Fisteln und Vorfälle des Afters etc. von PETER CAMPER, Leipzig 1781.* Atque hae paucae chartae legi omnino debent. Auctor enim medendi viam fistulis, qua linum in fistula dederunt eoque et cute et fistula incisa est, multis laudibus extollit. Praeterea et de ani prolapsu lectu digna proposuit quae, nisi sero demum mihi innotuissent, suis quaeque locis adiecissem.

VARIAE QVAE CALCULOSIS ADHIBENTVR, CVRATIONES.

Monendus est Lector, omnia, quae ad variam calculosorum curationem, et huius historiam, attinent, deberi studio Doctissimi Viri IVSTI GODOFREDI GÜNZII, Anat. et Chirurg. Prof. Publ. Extr. in hac Academia celeberrimi. De singula beneuolentia, quam mihi, hoc labore, praestitit, dicta sunt quaedam in Praefatione.

§. 1356.

Corpora, calei similia, in omni fere corporis humana parte, ex succis nostris concrescunt, veri calculi ex lotio tantum, cum in rene, tum in vesica. Solent autem ex hac tantum sectione eximi, si aegris aliter succurri non potest, neque certae notae interitus sunt *. Nam, qui renibus inhaerent, eos fini oportet

nir

i lumbos in tumorem attollant, in quo casu, vel ru-
 o abscessu, vel inciso, educi debent **.

De generatione calculi renum et vesicae GÜNZIUS nihil dixit. Cuius interest, de eius causis bene scri-
 pta legere, is librum pathologicum GAVBII euoluat. Cura-
 tio calculosorum medicamentis intus sumendis calculos sol-
 ventibus incerta est, infida, fastidiosa plerumque. Nostri me-
 moria famosum fuit remedium, quod Magnae Britanniae
 Parlamentum quod vocant, magno pretio redemit a virgine,
 STEPHENS appellata; quod valde compositum atque mul-
 tiplex paulo post repudiatum fuit, adeo ut DE HAEN cal-
 culos ab eo generari posse crederet. Descriptioeem eius
 vid. in *Mercurie historique & politique Mens. Jul. an. 1739.*
 p. 97. vel in Tractatu singulari Anglica lingua scripto a IACOB
 KIRCKPATRICK, quem ad manus non habeo, sed versionem
 teutonicam Hamburgi 1739 editam et inscriptam: *Accu-
 rater Bericht von der Wirkung der Madame Johanna Ste-
 phens Blasensteins - Arzneyen, durch IACOB KIRKPATRIK.* De-
 ferta haec quidem via curandi duxit ad alias. Intellexere
 enim, alcalina medicamenta posse proficua esse; alii igitur
 sapone, alii aqua calcis viuae concharum vstarum, vel intus
 sumenda vel in vesicam iniecta vsi sunt; quae prodesse pos-
 sunt; si causa calculi acido-mucosis alimentis tribuenda.
 Testas quorum calcinatas patres nostri dudum adhibuere,
 Thermarum Carolinarum aquas etiam laudant, quae tamen
 omittendae, si calculus asper vrinam reddit cruentam aut
 dolores sequuntur, aut signa vlcera sunt. Quidam spiri-
 tus acidus minerales, Elixir acidum Dippelii soluere ter-
 ram calculi alcalinam posse iudicarunt, ea igitur prae-
 biis exiguis repetito dederunt. Nostri aetate nonnulli plan-
 tae, quae vna vsi vocatur, multum tribuerunt. Quae
 quidem in laxis corporibus calculum soluere non posse, loco
 tamen mouere, et vlcera prodesse posse videtur. Duriores
 calculi a nulla medicina intus sumta mutantur.

Calculus ex iis morbis est, qui, cum omnes homines eorum
 in se causam habeant, et perpetuo alant, sine dubio nullo
 non tempore cogniti fuerunt. Per ardua esse debet et an-
 cept, omnis Chirurgia, quae hoc morbo laborantibus adhi-
 betur. Tamen et nullum malum est, cum quo acerbior do-
 lor coniunctus sit, quodque, longius trahendo, hominem
 quotidie iugulet. Et haec effecisse videntur, ut, antiquissi-
 mis etiam temporibus, calculosi non dubitarunt, se crudeli
 et valde ancipiti curationi subiicere. Nemo ignorat, HIP-
 POCRATIS aetate inuentos fuisse, qui audebant calculum e
 vesica euellere, et aegros a certissima aliter morte liberare.
 Is enim et medicae et chirurgicae artis parens discipulos
 iureiurando obstrinxit, ut a calculosorum curatione abstine-

rent. Debebant autem viris in hac re exercitatis relinquere. Quod multi interpretati sunt, ac si HIPPOCRATES letificam, aut crudelem, et ab humanitate alienam, habuisset. Posse etiam hoc per AVINZOARIS verba confirmari, qui calculi sectionem, tam turpem rem, et abominabilem miseramque, esse dixit, ut non tantum non exerceri, sed ne adspici quidem, ab honorato viro debeat. Vid. IO. HENR. MEIBOMIVS in *Comment. ad iusiur. Hippocr.* p. 162. Arabes irreligiosum habebant naturalia intueri, a quo Graeci alienissimum fuerunt. Alia vero letalitaris ratio est, quam HIPPOCRATEM putauerit cum calculi sectione coniunctam esse. Nam in *Aph. 18. Lib. VI.* ait: κύστιν διακοπέντι θανάτωδες, vesicam con- vulneratam habere, mortem affert, qui Aphorismus ex *Lib. I. de morbis* desumptus est. Sed quid clarius est hoc, HIPPOCRATEM in *Iureiurando* non ad interitus periculum respexisse, quod cum vesicae laesione coniunctum sit, verum ad difficultatem curationis. Nimirum addit, debere ipsam illam committi, qui omne studium in ipsa exercenda posuerint. Quo videtur discipulos monere voluisse, nolint hanc ancipitem Chirurgiam temere suscipere, sed debeant sibi eam artem longa exercitatione comparare. Conf. IOH. HENR. MEIBOMIVS *loc. cit. Cap. XVI. p. 153. seqq.* et aptissima et interpretatio, quam dedit LAVREMBERGIVS in *Porticu Aesculap. Cap. 9.* Existimat enim in Coorum republica ministros aliquot Medicorum publice constitutos fuisse, qui calculi curationem perficerent. Itaque HIPPOCRATEM voluisse medentes deberent his ministris, suis publice constitutis ex conductis, eam faciendam relinquere. Veteres autem existimasse videntur, in ea curatione, quam artifices calculosis adhibebant, urinae iter, carneamque vesicae partem, patefieri, non corpus vesicae, quod putabant membraneum esse. Vid. CELSVS *Lib. VII. Cap. XXVI.* et *Auctor Isagog. Cap. XVIII.* Ex quo patet, quomodo accipi debeant, quae HIPPOCRATES de letifero vesicae vulnere habet. Etsi ea sic quoque interpretari licet, ut, HIPPOCRATEM, credamus, neminem vidisse, qui ex vulnere vesicae servatus sit, aut voluisse, ut plurimum eos decedere, qui vesicam percussam habeant. Recentiores vero viderunt, ac frequenti observatione confirmatum est, non semper mortem sequi, si vesica vulnus accepit. Vide supra §. 679. Praeter ibi citatos auctores, observationes de perlanatis, grauioribus praecipue, vesicae vulneribus habent FRANC. ROSSETVS in *Part. Caes. Affert. Historiol.* p. 256. seqq. Par. MDXC. C. STALPART VAN DER WIEL *Cent. I. Obs. LXXXI.* et, quos ibi citat, DIONIS in *Cours des Oper. Demonstr. III.* p. 243. Ed. MDCCXL. Amyandus apud DVGLASS. in *Lithotom.* p. 42. FRANC. COLOT. in *Tr. de l' Operation de la taille* p. 48. seqq. et alii permulti. Quis autem dixerit, qua curandi via illi Medici vsi sint, qui HIPPOCRATIS aetate, calculosorum curationes

curationes perficiebant? Non improbable est, eam viam tenuisse, quae a CELSO patefacta fuit. Est enim, quod quam maxime antiquitatem probat, simplicissima. Post HIPPOCRATEM, nullus ex medendi artis scriptoribus de calculi curatione quaedam proposuit, aut videtur in hac Chirurgia egregie versatus fuisse, praeter AMMONIVM, quem CELSVS scribit Lib. VII. Cap. XXVI. eo nomine λιθότομον cognominatum fuisse, quod ferramentum repererit, calculo maiori in vesica findendo aptum. Est autem probabile, AMMONIVM non alio modo, quam, qui a CELSO propositus est, viam ad vesicam aperuisse. Eandem viam etiam MEGEM tenuisse, qui iunior AMMONIO fuit, et Romae vixit, CELSVS in *Praef. ad Lib. VII.* ex eodem CELSO *Cap. XXVI. Lib. VII.* planum est. Docet enim, quale ferramentum excogitauerit ad calculum spinosum eximendum; quanto magis indicasset, quam curationem calculosis in vniuersum adhibuerit, si diuersa fuisset a Celsica? Calculum vero sectione curare non infrequens res fuisse videtur, cum HEROPHILI, tum quoque CELSI, atque GALENI, aetate. Vt enim hoc omittam, quod GALENVS, vel qui alius Auctor est, in *Isagog. Cap. XVIII.* memorat, ferramentum, quo ad explorandum calculum vesicae vtimur, ab ERASISTRATO καδυτης nominatum fuisse, FLORVS in *Epit. Liu. Lib. LV.* ait: Alexandri filium, regem Syriae, decem annorum puerum, occisum fuisse corruptis Medicis, qui eum calculi dolore consumi, ad populum mentiti, secauerunt. GALENVS autem cum in *Isagog. l. c.* tum in *Comment. ad Aph. 18. Lib. VI. Hippocratis.* ac praecipue HELIODORVS apud GALENVM de *Fasciis C. XVI.* de hac Chirurgia, tamquam vulgo nota, scripserunt. CELSVM igitur, qui *loc. cit.* primus ex veteribus, quorum nempe scripta ad nos peruenerunt, quae curatio calculosis adhiberi debeat, longa oratione exposuit, non, quam ipse repererit, declarasse, verisimile est, sed quae fortassis iam inde ab HIPPOCRATIS aetate perfecta fuit. Qui, a CELSI vsque ad PAVLI AEGINETAE tempora, in medendi arte inclaruerunt, si a GALENO recedas, etsi de calculosis aliqua, de curatione tamen nihil, dixerunt. PAVLVS vero in omnibus CELSVM secutus est. Vid. *Lib. VI. Cap. LX.* Neque Arabes Medici ab hac via deflexerunt, quod ex AVINCENNA *Lib. III. Fen. XVIII. Cap. VII.* et ALBVCASI *Part. II. Cap. LX. et LXI.* disci potest. ALBVCASIS tamen aliquid mutasse dicitur, quod ad latus natis sinistrac, et in feminis, ad radicem coxae, voluit plagam fieri. Fortassis vero hic locus idem fuerit, quem CELSVS imam sinistriorem oram dixit, et sub qua virgini incidere sic iussit, vt plaga transversa sit. *loc. cit.* ALBVCASIS etiam scalpelli non ancipitis iconem dedit, quod hodie plerique credunt ab ipso repertum esse, et parum ab eo diuersum, quo CHESELDENVS vtitur. Plurium Me-

dicorum, qui inter Arabes, in manu medendi arte, praeclare versati sint, memoria intercidit. Neque inter eos, qui Saeculis XIII. XIII. et XV. in Italia et Gallia hanc artem exercuerunt, aliquis esse dicitur, qui de calculosorum curatione dignum quid memoria proposuerit, praeter GVIDONEM, qui a CELSO monstratam, neglectamque eo tempore, viam quasi iterum aperuerit. *Tract. VI. Doctr. II. Cap. VII.* Factum est, ut, quia plerique, quod ea aetate frequentissimum fuit, a CELSI lectione abhorrebant, calculosorum curatio, qualem GVIDO proposuit, *Guidoniana* nominaretur. Eam tamen ipse sine dubio non perfecit. Dicit autem, quomodo fieri debeat secundum BRVNVM, THEODORICVM, ROLANDVM, ROGERIVM, aliosque Magistros. Hi ipsi, si a ROGERIO secesseris, aequae ample, ac GVIDO, de calculi sectione dixerunt. Haec veterum curatio, apparatus parui nomen accepit, paulo post, quam IOANNES DE ROMANIS aliam inuenerat, cui, ob ferramentorum numerum, apparatus magni nomen impositum fuit; quasi solis ferramentis differrent. CELSVS eam voluit in eo tantum corpore experiendam esse; quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit. Et nemo, praeter audacissimos homines, vel nebulones aliquot, inuentus est, qui ausus sit, eam curationem adultis adhibere; non, quod non possit, sed, quod non tuto possit. Praeterito saeculo circa A. MDCLXIII. homo, aliquis in Gallia exstitit, RAOUX nomine, qui se dicebat hac via, quae, quod paucissimis ferramentis perficitur, minus, quam illa, quae cum magno apparatu est, terrere debet, cum pueros tutius curare, tum ex adultorum etiam vesica, calculum euellere posse. Burdigala Lutetiam venit, ut calculosos ibi curaret. Deprehensus autem fuit, in puerorum curatione, non plus praestare posse, quam, qui ex Chirurgis, cum minore ferramentorum apparatu, calculum euellebant. Adultos etiam plerosque ita secuit, ut vesicam non aperiret. Habebat autem tam expeditum manuum usum, ut facile calculum supponeret, quod, ubi vidit aliquando cognitum fuisse, fuga sibi consuluit. Vid. de MINGELOVZEAUX *Comment. sur la Chirurgie de GHAULIAC T. II. p. 739. sqq. Burdig. MDCLXIII.* CAROLVS DRELINCVRTIVS in *Legende du Gascon. Paris. MDCLXV. FRANC. COLOT. l. c. pag. 28. seqq.* FRANC. TOLET in *Tr. de la Lithotomie p. 146. seq. Paris. MDCCVIII.* Nostra aetate paucissimi medentium sunt, qui hac via perfecta, vel pueros tuto a calculo liberari posse, existimant. Est autem princeps GIROLAMO MARINI, qui imperitiae accusat, quicumque tenerae aetatis pueris a IOANNE DE ROMANIS propositam curationem adhibere velint. In *Pratica delle principali operazioni di Chirurgia Cap. XI.* Alia argumenta, quibus utilitas huius curationis confirmari posset, adducta sunt a Cel. HEISTERO in

in *Instit. Chirurg.* p. 902. et 979. Vid. etiam DENYSIVS in *Obseru. Chirurg. de Calculo.* p. 95. Si a sectione calculi recedamus, qui in itinere vrinae haeret, vnicus casus est, in quo eam, cum pueris, tum adultis, adhiberi oportet. Est autem is casus, si calculus collo vesicae ita insidet, vt perinaeum in tumorem attollat. G. DE LA FAYE in *Notis ad Dionisii Chirurg.* p. 221. Huic curationi tum demum nomen parui apparatus (*petit appareil*) impositum fuit, vbi, prout supra dictum est, alia a IOANNE DE ROMANIS reperi- ta fuerat, quam magnum apparatus (*le grand appareil*) nominabant, propter ferramentorum numerum, quibus perficitur. Haecenus a plerisque creditum fuit, laudem huius inuentionis Italici, ac sigillatim IOANNI DE ROMANIS, deberi. Nuperrime autem hanc ipsi gloriam detrahere, et suae genti tribuere, voluit, leuissima coniectura ductus, qui originem Artis Chirurgicae in Gallia exposuit in Libro, qui inscribitur: *Recherches critiques & historiques sur l'Origine, sur les divers états & sur les progrès de la Chirurgie en France.* Paris. MDCCXLIV. p. 258. seqq. Vult autem latronem illum, cuius historiam, praeter alios per- multos, AMBROSIVS PARAEVS habet *Lib. XXIV. C. XIX.* et cui haecenus fere creditum fuit, calculum ex renibus ex- sectum fuisse, vesicae calculo laborasse. Esse vero hunc hominem a GERMANO quodam COLOTO liberatum, qui ipsi eandem curationem adhibuerit, quae vulgo *Mariana* nominetur. Puto equidem nihil magis his opinionibus de COLOTI curatione repugnare, quam quod FRANCISCVS COLOTVS ipse, qui vltimus ex ea familia fuit, gloriam inuentionis eius curationis ad IOANNEM DE ROMANIS re- fert *loc. cit. pag. 20. 64.* IOANNES DE ROMANIS, qui Pa- tria Cremonensis de Casali maiori erat, artem suam Romae exercuit. Vid. MARIANVS SANCTVS in *libello aureo de la- pide ex vesica per sectionem extrahendo. Cap. XVIII.* et IO- ANNES ipse in Epistola ad MARIANVM, [quae ad calcem huius libelli est. Nihil ipse de hac noua curandi via scripsit, sed fuit ipsa a discipulo eius MARIANO SANCTO, Baroli in Appulia nato, in libello iam allegato, aperta. Tamen ex hoc etiam libello non apparet, quo tempore IOANNES hanc viam repperit. Alii initio Saeculi XVI. factum fuisse dicunt, alii MDXXV. vt COLOTVS *loc. cit. p. 64.* plerique circa an. MDXX. DVGLASSO probabile visum est, An. MD. propius id factum esse, quam An. MDXX. et MARIANI libellum, non, vt vulgo putatur, *Venet. MDXXXV.* sed MDXXIII. in lucem prodiisse. MARINVS, qui Medicae Artis Doctor fuit, viuo IOANNE, suum libellum edidit, in quo aliquot in locis fatetur, se esse in hanc curandi viam a IOANNE ductum. Tamen factum est, vt non a IOANNE, qui reperit, nomen acciperet, sed a MARIANO, qui de- scripsit, et fortassis ornauit, MARIANA vocaretur. Nomen

vero magni apparatus a ferramentorum numero habet. CELSI curatio, praeter scalpellum, solo vnco, vel etiam interdum digito, perficitur, quo calculum promimus. Contra in MARIANA adhibebantur olim, praeter scalpellum, specilla incurua, quae sulcum in longum ductum habent, et vulgo itineraria, vel fistulae, nominantur, exploratorium, seu aliud specillum rectum, ductores duo, aperiens, seu dilatatorium, forceps, specillum globulo instructum (*Bouton*), quod MARIANVS verriculum dixit, cochlear, et interdum peculiare ferramentum, quod MARIANVS duo latera nominauit. Praeter haec omnia, loco forcipis, saepe vnco dentato vsi sunt. Putant omnes, si a FALCONETO recedimus, hanc MARIANI curationem, praeter hoc quod ferramentis, loco etiam sectionis, quam maxime a CELSI curandi via differre. De qua re commodior dicendi locus erit, vbi ad lateralem sectionem, peruenerimus. Exequamur iam breuiter MARIANAE historiam. Inter MARIANI discipulos Romanus aliquis Chirurgus fuit, OCTAVIANVS DE VILLA nominatus. Nam hunc solum a MARIANO artem calculosos curandi accepisse, nullo argumento probari potest. Ab hoc demum Gallo-Franci Chirurghi eam acceperunt, etsi fortassis et Italos eandem docuerit, ex quibus NVRSINOS, qui scilicet herniarum curatione excellebant, hanc curationem per Europam sparsisse, IO. RIOLANVS Filius et CAMILLVS FALCONETVS, nescio, qua auctoritate, affirmant, ille in *Enchirid. Anat. Pathol. Lib. II. C. XXXI.* hic in *Quaest. an educendo calculo, caeteris antefereendus apparatus lateralis?* p. 6. Ille autem OCTAVIANVS, cum saepius Parisios euocaretur, quia per Tresnel, oppidulum prope Tricassium, iterum facere debebat, artem suam dicitur cum LAVRENTIO COLOTO communicasse, qui, etsi Medicus erat, tamen manu etiam medendi artem exercebat. Ab eo tempore, vt Medicam artem olim AESCVLAPII, sic calculi curationem COLOTI, familiae, saltem in Gallia, propriam mansisse. Vid. FRANC. COLOT *l. c. pag. 66. seqq.* COLOTVS hanc ab OCTAVIANO acceptam artem, tanto cum dexteritate, exercebat, et tam prosperos etiam successus habebat, vt Henricus II. Rex ipsum Lithotomum Regium constitueret, quod A. MDLVI. factum est. Quem titulum COLOTI seruauerunt vsque ad FRANC. COLOTVM, qui vltimus ex ea familia fuit. Huius loco TOLETVS Lithotomus Regius factus est. Obiit Anno MDCCVI. et egregias obseruationes de calculi, aliorumque morborum vesicae, curatione fecit, quarum libellus An. MDCCXXVII. *Parisis* prodiiit. In hoc legi potest breuis historia COLOTORVM p. 67. *seqq.* Plura tamen de COLOTIS lithotomis habentur apud PAREVM *L. XVI. C. XLVII. et L. XXIII. C. XVIII.* GUIDON. PATIN *Lettres choisies Tom. I. p. 284. 335. 372. Tom. II. p. 107. 248. Tom. III. p. 339. Nouuell. Lett. Tom. II. p. 213. 231.*

314. *Recherch. sur l'Orig. de la Chirurg. loc. cit.* Vid. etiam IO. VAN HORNE *Microtechnie* p. 451. *Lips.* MDCCVII. A COLOTIS auxilium petiit, quicumque fere et in Gallia, et extra eam calculo vesicae laborabat. Et probabiliter ad hos etiam pertinet, quod de COLET aliquo apud GROENEVELTVM in *Diff. Lithol.* p. 53. Ed. MDCLXXXVII. habetur, nisi forte TOLETVM voluerit, cuius eo iam tempore aliquod nomen erat. Item, quod de CALLOT quodam apud TOLETVM *l. c. pag.* 157. et apud TITSINGH in *Heelkundige Verhandeling over den Steen en het Steensnyden* p. 95. *Amst.* MDCCXXI. legitur. PHILIPPVS COLOT, auus FRANCISCI, duos sibi Chirurcos adiunxit, RESTITVTVM GYRALTVM, et SEVERINVM PINAEVM, quorum hic Regis iussu, decem alios Chirurcos illam calculosis medendi artem docuit. FRANCISCVS autem COLOTVS ait, neque hoc, neque, quod Nosocomiorum Parisiensium Chirurgi COLOTOS in his aedibus viderint calculosos curare, hanc vim habuisse, vt *Mariana* curandi via plane aperiretur *l. c. p.* 72. *seqq.* Et si vero COLOTI secreta artis non aperiebant, tamen iam inde a medio saeculo decimo sexto in Gallia Chirurgi fuerunt, qui, CELSI via relicta, ad *Marianam* transibant, vel ex parte etiam, aliam reperiiebant, quae ad *Marianam* accedere videbatur; siue ab OCTAVIANO, vel alio quodam MARIANI discipulo, instructi fuerint, siue didicerint ex MARIANI libello. Exemplo potissimum PAREVS esse potest, qui hanc curandi rationem satis accurate exposuit *Lib. XVI. Cap. XLII. seqq.* atque perfecisse etiam videtur. Vere enim a se perfectam esse, nullibi ab ipso propositum esse inuenio. Laudem vero dexterrimorum Chirurgorum sibi compararunt, qui *Marianam* curandi viam ingressi sunt, ex superioris seculi Chirurgis Gallo-Francis IOANNES BONNET, FRANCISCVS THEVENIN, RVFFINVS, *Pater et Filius*, IACOBVS HARAN, IONNOT, GOVINVS et pauci alii. Vid. DEVAUX in *Ind. funer.* GUIDO PATIN *Lettr. Nouell. Tom. II. p.* 63. 213. *seq.* TOLET *l. c. Praef.* et p. 33. 155. 179. Nostra aetate plurimi ex Gallo-Francis Chirurgis, qui calculosos curant, hanc potissimum Chirurgiam exercent, quae cum magno apparatu fit. Extra Galliam paucissimi Chirurgi fuerunt, vel nunc etiam sunt, qui *Marianam* curationem ita calculosis adhibuerunt, vt famam sibi aliquam parerent. Expodata vero fuit, idque primo loco a Germano homine GVALTER. HERM. RYFF in libello, quem Germanice scripsit, *de calculi renum ac vesicae curatione Arg.* MDXLIII. 4. deinde a GOVRMELENO *Operat. Lib. II. p.* 178. *seq.* PAREO *loc. cit.* HILDANO in *Lib. de Lithotomia Vesicae Basl.* MDCXXVIII. 4. qui liber in Operibus multo auctior habetur. IOSEPHO COVILLARD in *Chirurg. Operateur L. II. Sect. I. Chap. X.* IOANNE GROENEVELT in *loc. cit.* DE LANAY in *Dissert. sur les maladies et sur les Operations de la pierre. Paris.* MDCC. TOLETO

l. c. ALGHISI in *Litotomia ovvero del cavar la pietra, in Firenze, MDCCVII*. LE DRAN in libro, quem inscripsit: *Parallele des differentes manieres de tirer la pierre hors de la vessie*. Par MDCCXXX. et aliis nonnullis, qui de Operationibus Chirurgicis scripserunt, maxime DIONISIO, GARENGETO, et HEISTERO. Affirmare nolo, omnes, quos haecenus dixi, *Marianam* curationem, vel exercuisse, vel descripsisse, plane eam, quam MARIANVS, viam ingressos fuisse. Sufficit, vesicam sub ossibus pubis patefecisse, et loco calculi, super quo, medio digito, ad perinaeum adducto, olim secabant, itinerario, aliisque ferramentis, usos esse, quae, ut magnus apparatus esset, efficiebant. Nam in hoc credebant *Marianam* curationem consistere. Hac aetate iam factum est, ut medentium plures scalpello ancipiti utantur et ductore canaliculato. (*Gorgeret*). Super hoc non dilatatorium, sed indicem potius dextrae manus, ita demittunt, ut, eum lente promouendo, collum vesicae aperiant. Calculo euulso, plures etiam fistulam, praecipue flexilem, plagae imponunt, quo, quod e calculo, vel arena, in vesica supererat, commode effluere possit. Praeter haec recentioribus hoc potissimum laudi dandum est, quod de concinne magis et ad curationem tuto perficiendam aptioribus parandis, ferramentis solliciti fuerunt, quod satis patet, si icones apud PAREVM cum illis apud TOLETVM compares. Nuper vero LE DRAN, cum in modo ligandi aegrum, tum in scalpelli figura aliqua, immutauit. Utitur autem scalpello acutius reliquis, et cuius alter margo, siquidem anceps est, rectus est, l. c. *Tab. III. Fig. 4. et p. 55*. Ad haec, si maior calculus sit, quam, ut promi possit primam sectionem, siue metu magnae ruptionis ac lacerationis partium, non possit, dilatari priorem plagam a latere iubet. Excogitauit etiam ad hanc sectionem faciendam nouum scalpellum, cum specillo sulcato, et ductorem canaliculatum, qui in dorso sulcum in longum ductum habet. Vid. *Obseru. nostras de Calcul. curandi viis pag. 69. seqq. et Tab. I*. Nouissime tamen et in his denuo aliqua mutasse videtur. Vid. LE DRAN *Operat. de Chirurg. p. 304. Par. MDCCXLII*. Iam olim tamen hanc plagae dilatationem proposuit et cultellum curuum ad eum finem reperit TOLETVS l. c. p. 115. seq. Conf. etiam DE LAUNAY l. c. p. 105. ALGHISI l. c. p. 81. et SCHAEFER in *Differt. de variis lithotom. gener. pag. 21. Argentor. MDCCXXIII*. Reliqui fere omnes *Marianam* curationem ita perficiunt, ut infra docebitur. Ad hanc calculosorum curationem ea pertinet, quam PETRVS FRANCVS primum descripsit loc. cit. *Cap. XXXIII*. et quae propterea ab HILDANO loc. cit. *Cap. XVI*. et GROENEVELFO l. c. p. 52. *Franconiana* nominatur. Est autem haec. Plaga facta, si calculus in eam incidit, vno extrahendus est, si vero non, tutanda immitti potest, qua

vulnus

vulnus per aliquot dies apertum seruetur, ex quo deinde calculus vel sponte exit, vel facile eximitur. Post FRANGONEVM proposuit hanc curationem DELEAVSON *l. c. Cap. X.* et praecipue HILDANVS *l. c.* qui eam vehementer laudat. Laudarunt etiam, idoneisque exemplis eius vtilitatem comprobarunt FR. COLOT *l. c. p. 182. seqq.* et TOLET *l. c. Cap. XX.* sic tamen, vt indicarent, raro accidere, vt hanc curationem adhiberi oporteat. Alia calculum curandi via est, quam vulgo apparatus altum (*le haut appareil*) nominant. In hac enim calculus euellitur, vesica super ossibus pubis patefacta. Etiam casu a PETRO FRANCONO reperta est, quare a plerisque *Methodus Franconica* appellatur, ab aliis apparatus vel sectio hypogastrica. Refert autem PETRVS FRANCO *l. c. p. 139.* accidisse sibi aliquando, annum enim non addit, et falli adeo videntur, qui An. MDLX. ponunt, vt, cum infanti bimulo CELSI curationem adhibuisset, non posset calculum, qui nimis magnus esset, protrahere. Quare, ne sibi exprobrari posset, nesciisse calculum euellere, digitis sinistrae manus, quos in anum miserit, se calculum sustulisse, dumque minister imum ventrem, proxime sub vmbilico, compresserit, vt calculus super ossibus pubis promineret, abdomen cum vesica super calculo incidisse, quem feliciter extraxerit, et vulnus sanauerit. Tamen FRANCO medentes monet, ne, quod ipse coactus fecerit, imitentur. HIPPOCRATIS enim auctoritate obsecatus, existimabat, vulnera, quae corpori vesicae infligantur, mortem afferre. Primus probabiliter post FRANCONEM hanc Chirurgiam proposuit et laudauit, ac nomen *haut appareil* dedit ROVSSETVS in libro, quem inscripsit *l'Enfantement Césarien pag. 77.* et qui prodiit *Parisi. MDLXXXI. 8.* Iterum eandem proposuit, et tres perficiendi modos adiecit in libro *Part. Caesar. Assert. Historiol. inscripto p. 266. seqq.* Correxerit autem eam, praecipue in hoc, quod vesicam non super calculo aperire docuit, contra iussit vesicam siue lotio repleti sinere, siue liquorem idoneum immittere, quo se super ossibus pubis, tumore aliquo, prodens, tuto incidi possit. Et non solum ipse experimenta in mortuorum hominum corporibus cepit, p. 266. verum etiam viuo adhibitae ab aliquo curationis exemplum habet, p. 282. quod adeo primum eorum omnium fuerit, quae de illa curatione, consulto instituta, habentur. Post ROSSETVM, mentionem huius curandi viae fecerunt HILDANVS *loc. cit.* primum, vt reiceret, deinde, vt laudaret, RIOLANVS in *Anthropogr. L. II. C. XXVIII.* et in *Animadu. in Veslingium*, GROENEVELTVS *loc. cit.* BARBETTE in *Chirurg. C. XXVI.* TOLETVS *loc. cit. Chap. XV. p. 137.* DIONIS *loc. cit. Demonstr. III. p. 230. et alii.* Maiori studio eandem olim laudauit, et Chirurgos ad eam exercendam excitare voluit *Parisiensis Medicus, NICOLAVS PIETREVS.*

In schola enim Medicorum *An. MDCXXXV.* quaestionem proposuit: *An ad extrahendum calculum dissecanda ad pubem vesica?* Haec dissertatiuncula, quod inter rarissimos libellos est, iterum impressa fuit in DOUGLASSI *Lithotom. Douglass. pag. 121. Lond. MDCCXXIII.* et in CHESELDENS *Treatise on the High Operat. p. 141. Lond. MDCCXXIII.* Conf. de hac dissertatiuncula GUID. PATIN. in *Lettres choisies Tom. I. XX. p. 61.* Cum PATINVS scribat, PIETREVM hanc curationem pluribus et viris et feminis adhibendam curasse, probabilia utique sunt, quae de BONNETO, Parisiensi Lithotomo, habentur apud TOLETVM *loc. cit. p. 139.* et DIONIS. *loc. cit. p. 230.* et, qui *An. MDCLI.* obiit. vid. DEVAUX *c. l.* Confer tamen PATINVS in Epist. ad BARTHOLINVM, quae est inter *Bartholinianas XX. Cent. III.* GROENEVELTVS etiam se coactum hanc curationem aliquando calculoso adhibuisse memorat *l. c. p. 152. Edit. Lond. MDCCX.* DIONIS, etsi descriptionem dedit curationis, quam non tentavit, eam tamen perficiendi talem modum proposuit, qualis fere a DOUGLASSO etiam adhibitus fuit. Non dubitavit quoque eam reliquis calculum curandi viis praeferre, *l. c. p. 231. seqq.* Ante DIONISIVM experiri eam SOLINGENIVS sic voluit, ut vesica non liquore idoneo, verum aere immisso, distenderetur. *Chirurg. Part. III. Cap. XX.* Circa *An. MDCC.* COLOTVS a Magistratu Parisiensi iussus est, virgente fortassis FAGONIO, vid. DIONIS *l. c.* experimenta in cadaueribus instituere. Vid. FR. COLOTVS *l. c. p. 43. seqq.* et *Auctor. Praef. ad COLOTVM p. XV.* Ita vero de iis ad Magistratum retulit, ut nullo modo in viuis tentandam, sed periculi plenissimam esse, diceret. Eo ipso tamen tempore PROBY, Dublinensis Chirurgus, puellae calculo laboranti, hanc curationem adhibuit. Vid. *Transact. Phil. MDCC.* Inde usque ad A. MDCCXVIII. neminem iuuenio, qui eius vel mentionem tantum fecerit. Nam hoc anno IACOBVS DOUGLASS Medicus de hac, tamdiu neglecta, curatione, coram Societate Regia Londinensi, ita exposuit, ut non solum eam tuto fieri posse, per Anatonem ostenderet, ROSSETI praecipue argumentis usus, verum etiam praestantiam eius, prae caeteris omnibus, confirmaret. *Transact. Phil.* Altero anno MDCCXIX. exunte et MDCCXX. Iacobi frater, IOANNES DOUGLASSVS, Chirurgus Londinensis, quatuor aegros hac via curavit. Seruavit etiam eorum tres, quarto per nervorum distentiones sublato. Vid. IOHN DOUGLASS *a new Method of cutting for the stone Sect. XI.* DOUGLASSVM plures ex Anglis secuti sunt, PAVLVS MACCGILL, BAMBER, THORNHILL, et praecipue CHESELDEN, de quibus legi possunt CHESELDENS *Treatise on the High Operat. Lond. MDCCXXIII.* 8. quem nimis acriter, sine causa, taxat HVSTON in *Lithotomus Castratus Lond. MDCCXXIII.* 8. Vid. etiam ANONYMVS

NYMVS in the Method of performing the High Operation, Lond. MDCCXXIII. 4. MIDDLETON in a Short Essay on the Operation of Lithotomy, as it is performed by the new method aboue the os pubis, Lond. MDCCXXVII. 4. SAMVEL PYE Obs. on the several methods of Lithotomy, Lond. MDCCXXIV. 4. Proxime post, quam in Anglia restituta haec curatio fuerat, tentauerunt eam in Germania Cl. HEISTER vid. *Dissert. de Alto apparatu. Helmst. MDCCXXVIII.* PROEBISCH Chirurgus Borussicus in Tract. de alta operatione germanice scripto, *Regiom. MDCCXXVII.* et RVNGIVS, Chirurgus Bremensis, HEISTER *l. c. p. 49.* Tribus calculosis hanc curationem etiam adhibuit SENFFIVS, Chirurgus Berolinensis, eorumque duo seruati sunt, vnus mortuus est. vid. ELLER in *Obs. Chir. p. 209. seqq.*

Inter haec Parisiis in cadaueribus experimenta capta sunt, auctore potissimum WINSLOVIO, quae tamen adducere Chirurgos non poterant, vt in viuus tentarent, donec Cl. MORANDVS et BERRIERVS hanc curationem duobus calculosis adhiberent. vid. MORANDVS in *Tr. de la Taille au haut appareil, Par. MDCCXXVIII.* Ab hoc tempore neminem fere scio inuentum esse, qui hanc Chirurgiam perficeret, maxime, postquam CHESELDENVS eam exercere coepit, quam vulgo sectionem lateralem nominant. Et dixit contra Hypogastricam sectionem LE DRAN *l. c. p. 95. seqq.* et DENYSIVS *loc. cit.* defendit contra et reliquis praefert MATTHIAS ERNEST. BORETIVS in *Diss. de Operatione alta Anglis High Operation dicta, Regiomonti, MDCCXXIII.* MIDDLETONVS, qui ab initio improbauerat, *loc. cit. Praef.* DE BREVILLE, Medicus Parisiensis in *Qu. an educendo calculo caeteris anteponeendus altus apparatus? Paris. MDCCXXXIII.* Demum vero, ante tres annos, eam instaurauit quasi; et quo cum facilius, tum tutius perfici posset, noua aliqua ferramenta reperit Cl. LE CAT, cuius curandi viam inferius proponam. Dignum vero animaduersione est, cum omnes fere vesicam aqua repletam incidi voluerint, PIETREO itinerarium demittere, et super hoc aperire vesicam placuisse *l. c.* quod operosius imitatus est SERMESIVS, Medicus Amstelodamensis. vid. *Lithotomia Douglassiana ofte een nieuwe wijze van steensnyden, te Vtrecht, A. MDCCXXVI.* Pertinet autem huc, si TIMMIO fides haberi potest, HENRICI HESSI, Chirurgi Hafniensis, inuentum. Excogitauit scilicet fundam, cuius iconem dedit TIMMIVS, quam, loco forcipis, per plagam, super osse pubis factam, in vesicam demitteret. Impedire autem eo voluit, ne vesica contunderetur. Et fertur a TIMMIO MDCCXXV. calculum hac funda protraxisse, sed, quia plures calculi in vesica laterent, oportuisse ipsum reliquos forcipe euellere, vid. TIMMIVS in *Anglorum et Gallorum obseru. de sectione Hypogastr. germanice Brem. MDCCXXXI.* et confer *Act. Erudit. MDCCXXIX. Mens.*

Mens. Aug. pag. 347. Tab. IV. vid. etiam COLOT. loc. cit. in fine. Veniamus ad illam calculosos curandi viam, quam lateralem nominant, qui plaga a latere cum perinacitum itineris vrinae et vesicae fit. Ad hanc referuntur vulgo *Rauiana, Cheseldeniana, Lecatiana duplex, Fulbertiana*, et quae a FRATRE IACOBO reperta est, quamque omnium primam esse existimant. Nemo ignorat, FRATREM IACOBVM de BEAULIEU, in oppidulo *Beaufort*, in Burgundia natum A. MDCXCVII. Parisios venisse, ibique, cum Medicis et Chirurgis Regiis suam curandi rationem exposuisset eam permultis calculosis, praesentibus etiam Medicis, adhibuisse, vid. MARTINVS LISTERV in *the Journey to Paris. Lond. MDCIC. 8.* BVSSIERIVS in *Transact. Phil. A. MDCIC. MERYI Obseru. sur la maniere de tailler dans les deux sexes pour l'extraction de la pierre pratiquée par Frère Jacques, à Paris MDCC. 12.* DIONIS l. c. *Demonstr. III. p. 239. seq.* Cum hoc, quod ex monachorum ordine erat, esseque sibi artem, quam exercebat, quasi diuinitus reuelatam, non obscure indicabat, tum, quod aegris gratis opem ferebat, effecisse videtur, vt bene omnes de IACOBO ab initio sentirent. Adeo Magistratum quoque iussu factum est, vt Frater IACOBVS A. MDCHC. in Nosocomiis Charitatis et Domus Dei Parisiis calculosos curaret. Breui autem post plures ex Chirurgis Parisiensibus IACOBI curandi rationem ita damnarunt, vt, eam, ne emendatam quidem, tuto adhiberi posse, contenderent. Quod praecipue MERYVS, DE LAUNAY et COLOTVS fecit. Quare, vt IACOBVS eo tempore nondum sciuerit, curationem suam recte perficere, eam tamen existimo non diiudicari ex iis debere, quae Chirurghi Parisienses de ipsa scripserunt. Vt vero nullam dubitationem videtur admittere, FRATREM IACOBVM, primis temporibus, multa pericula per mortes egisse, sic MERYVM quoque aliosque ipsum docuisse, certissimum est, qua ratione plura saltem incommoda euitare posset. Fertur autem Iacobum in rectam viam duxisse HVNOLDVS, Medicus Andegauensis, qui librum scripsit, cui titulus: *Histoire du procédé de Frère Jacques*, et cuius, nondum impressi, mentionem fecerunt Cl. FALCONET loc. cit. pag. 8. et MORAND. in *Mémoir. d' l' Acad. R. des Sc. A. MDCCXXXI. p. 217. seqq.* Imo ipse IACOBVS A. MDCCII. breuissimum libellum edidit, quem inscripsit: *Nouvelle methode de tailler, & tirer la pierre de la vessie. 4.* Ex his libris Cl. MORANDVS patere contendit, IACOBVM iam hoc tempore, eam curationem exercuisse, quae nunc a CHESELDENO nomen habet, vel, quam certum est A. MDCCXII. Argentorati, a Fratre IACORO, adhibitam fuisse. Tamen in hac altera periodo historiae Fratris IACOBI multa nondum expedita sunt. Exposuit eam, sed breuiter tantum, MORANDVS in *Comment. A. R. Sc. A. MDCCXXXI.* Sed fusius contra

eum dixit Cl. HEISTERO in *Institut. Chir.* p. 988. seqq. quam litem nostram facere nolumus. Ad historiam IACOBI, praeter antea allegata, pertinent ea, quae DE LAUNAY *l. c.* p. 130. seq. COLOT. *l. c.* p. 82. et FILGVS in *Diss. de variis lithotomiam administrandi modis et Ravianae praestantia, Giesiae, MDCCXXVII.* §. 24. contra IACOBVM dixerunt. Conf. etiam IAC. DOUGLASS. *History of lateral Operat. Chap. I. seqq. Lond. MDCCXXVI.* 4. ELLER. *l. c.* p. 195. seqq. et SCHAEFER in *Dissert. de Variis lithotom. gener. Argent. MDCCXXIV.* Vulgo habetur, neminem IACOBI curandi viam ingressum esse, accepi tamen ab amicis, Argentoratensium Chirurgo, LE MAIRE, IACOBVM secutum esse. Post IACOBI curationem de RAVIANA dicendum est. Hanc ex illa quasi natam esse, nemo negat. RAVIVS secanti IACOBO additit, aegros post sectionem mortuos secavit; Deprehendit igitur curationem, si partes sectas consideres, optimam esse, errores vero, quos IACOBVS committebat, evitari facile posse, modo in instrumentis aliqua mutantur, et curatio perficiatur a Medico, Anatomes gnaro. Confirmantur haec eo, quod, cum RAVIVS *Marianam* curationem pluribus calculosis non infeliciter adhibuisset, hac relicta, ad IACOBI curationem transibat, quam plus, quam 2000 hominibus adhibuisse fertur. Plures sunt, qui RAVIVM non ipsum emendasse *Iacobianam* curationem volunt, sed usum esse MERYI consiliis et Cl. HEISTERVS *Ravianam Marianam* esse dicit, in *Dissert. de Appar. alto* p. 11. Sed primum RAVIVS iam MDCLIC. hanc curationem perfecit, vid. FALCONETTUS *loc. cit.* p. 8. Deinde, si RAVII scalpellus, qui non multum ab illo differt, quo medentes in *Mariana* vtuntur, cum eo comparatur, quem MERYVS reperit, quanta diuersitas! quanta etiam in sectione ipsa, ac probabiliter etiam in partibus sectis! Nam RAVIVS cum prostata vesicam incidit, MERYVS prostatam solam, neque eam, ut videtur, totam discindi voluit. Nam, quod nonnulli contendunt, RAVIVM prostatam non conuulnerasse, non possunt tamen aliquem adducere, qui in mortui corpore viderit, quae partes in hac curatione inciderentur. Descriptionem vero *Ravianae* curationis dederunt Cel. ALBINVS in *Ind. suppellect. Anat.* praeter quem vid. ALBINI Patris *Orat. in obitum RAVII*, ERNDTL in *Itin. Angl. & Bat.* p. 119. seqq. IAC. DOUGLASS *l. c.* Chap. VI. FEHR in *Dissert. de calculo vesicae* pag. 17. seqq. BAS. MDCCXVI. FILGVS *l. c.* §. 29. seqq. SCHAEFER *l. c.* p. 7. & 25. seqq. BORETIVS *loc. cit.* pag. 11. seqq. Autor Praef. ad COLOTVM p. 48. seqq. ELLER *loc. cit.* p. 195. seqq. LE DRAN *Parallele* p. 109. seqq. praeter HEISTERVM et GARENGETTVM. Dicunt autem, se hanc rationem viuis adhibuisse HEISTERVS *loc. cit.* p. 966. seq. et FILGVS *loc. cit.* p. 44.

itemque **LE DRAN**, etsi aliud itinerarium adhibuit. *loc. cit. pag. 118.* Narratum mihi etiam fuit a Chirurgo, harum rerum perito, **SENFFIVM RAVII** curationem imitatum esse, quod videtur etiam **HEISTERVS** confirmare *loc. cit. p. 984. seqq.* In Belgio vero a variis Chirurgis exerceri, habet **SCHAEFERVS l. c. p. 26.** **DENYSIVM** paruum calculum promere vidit, sic tamen, vt is maximam vim adhibere deberet, **BORETIVS l. c. p. 13.** **DENYSIVS** ipse libellum edidit sub nomine *Observat. Chirurg. de calculo, Lugd. Bat. MDCCXXXI.* in quo hoc vnum agit, vt *Rauianae* praestantiam prae caeteris omnibus asserat, ac se solum scire *Rauianam* curationem exercere. Scripsit contra **DENYSIVM TITSINGH Heelkundige Verhandelinge over den Steen en het Steen-Snyden, Amst. MDCCXXXI.** Sed plerique affirmant, post **RAVII** mortem, magni huius Medici curandi viam neglectam in Belgio iacuisse, donec **CHESELDENVS** de illa paranda iterum et restituenda cogitaret. Factum hoc est An. **MDCCXXVI.** idem opus eodem tempore suscipiente **D. BAMBER.** Vterque, vt in *Hypogastrica* sectione, vesicam aqua replebat, et **CHESELDENVS** praecipue alia quaedam mutabat, quae exposita sunt apud **IAC. DOUGLASS l. c. in Postscript.** Cum vero ex aegris primum sectis aliquot, ex putridis vlceribus, inorerentur, quae in cellulosa membrana nascebantur, quae circa anum est, **CHESELDENVS** aliam viam ingressus est. Aperuit eam in the *Appendix to the fourth Edition of the Anatomy MDCCXXX.* et clarius exposuit **DOUGLASS in the Appendix to the History of the lateral Operat. Lond. MDCCXXXI. 4.** Vid. etiam **MORAND. Mém. de l'Academ. A. MDCCXXXI.** **CHESELDENVS** vero, etsi iisdem ferramentis utitur, quibus in *Mariana* utuntur, tamen in itinerario, scalpello, qui dorsum habet, in ductere canaliculato et forcipe, aliqua sapienter mutauit, vid. **DOUGLASS. in Append. vbi ferramentorum icones habentur.** In hac via ita progressus est, vt ex viginti septem, quos continuo curauit, nullum, ex quadraginta sex, duos tantum perderet, de quibus sperari vix poterat, vt curarentur. Nihil etiam adhuc perdidit de praestantia sua **CHESELDENI** Chirurgia, sed ab aliis etiam Chirurgis Anglis exercetur, ex quibus imprimis **Cl. SHARP** est, qui elegantem descriptionem cum iconibus ferramentorum dedit in *Treatise on the Operat. of Surgery.* Successus vero, quem **CHESELDENVS** habuit, **Cl. MORANDVM** mouit, vt A. **MDCCXXIX.** Londinum peteret, quo posset ab ipso **CHESELDENO** in hanc viam duci. Vid. **MORANDI Epist. ad SENACVM in Mercure de France Dec. MDCCXXIX.** **MORANDVS** post reditum A. **MDCCXXX.** in nosocomio Charitatis pariter ac in vrbe, cum **PERCHETO**, sedecim calculosos ita hac ratione curauit, vt vterque septem seruaret, inter quos ille puer fuit, cuius historiam habet **GARENGEOT in Op. T. II. pag. 198.**

198. *seqq.* et de qua conf. sis, quae dixi in *Obs. de calculi curandi viis p. 41. seqq.* Eodem tempore de CHESFOLDENI curatione egit LE DRAN, cumque plures eius utilitates esse animaduiceret, hoc maxime fecit, ut eam vix differre a Mariana probaret l. c. p. 139. Magis autem se caeteri Chirurghi huic curationi opposuerunt. Contra eam reliquis omnibus praestare egregie probat FALCONETTUS in *Quaest. citata.* Quod enim de sectione laterali in vniuersum dicitur, idem esse, ac si de *Chesfeldeniana* diceretur, inferius docebitur. CL. MORANDVS cum exercere eandem non destitit, neque Regis iussu ea interdictus est, quod in suo Operationum libello SHARPIVS posuerat, tum plures etiam discipulos habuit, quos hanc Chirurgiam docebat. Vid. *Refut. d'un passage du Traité de Mr. Sharp sur la taille laterale,* Par. MDCCXXXIX. Quam multi vero calculosi per lateralem sectionem in Gallia seruati sint, videre licet in *Hist. A. R. Sc. An.* MDCCXXXI. MDCCXXXIV. MDCCXXXII. MDCCXXXVII. *seqq.* Exercuerunt autem hanc Chirurgiam in Gallia, Rupellae LA HAYE, Rothomagi LE CAT, Gadibus in Hispania VIRGILI. Inter hos magnum nomen sibi peperit LE CAT, qui, cum primum iisdem ferramentis vteretur, quibus MORANDVS, alia deinde reperit, quibus curationem tutius perficeret. Vid. G. DE LA FAYE *Remarques sur Dionis p. 251. et Tab. adiect. II.* Ferramenta autem sunt itinerarium, et duo scalpelli, quibus peculiare fasciae genus addi debet, ad ligandos caculosos, quod caeteris omnibus praestat. Olim in ante allegato libello *Obs. IV. hanc amicissimi* LE GAT curationem descripsi, qualem ab aliis acceperam. Post haec tempora ipse LE CAT, me humanissimis literis docuit, pleraque in ea descriptione falsa esse, quod cum gratus agnosco, tum Lectores moneo, ne se descriptione illa in errorem induci patiantur, proximeque talem eius descriptionem exhibebo, qualem me integerrimus amicus LE CAT per literas docuit. Indicaui etiam, quam prosperos successus sua curandi ratio haberet. Retulit tamen mihi amicus, qui ipsum LE CAT secare vidit, et cui hac in re plenam fidem habere possum, ipsum A. MDCCXLI. nouam curationem tentasse. Excitatus enim per prosperrimos successus, quos *Rauiana* habuit, et per famam, quae ferebat, RAVIVM, illaesa prostata, lateralem vesicae partem incidisse, itinerarium aliquod, peculiaris formae, ingeniosissime excogitauit, cuius iconem dedit MONROVS in *Med. Ess. of Edimb. Vol. V. Tab. VI. Fig. IV.* verius autem descriptum est in *Actis Eruditorum Lipsi.* MDCCXXXV. *Menfe Febr.* Praeter hoc scalpellum quoque addidit, ancipitem quidem, diuersum tamen a reliquis, et speculo ani, quod iam antea inuenerat, vtitur, ad intestinum rectum ad latus ducendum, vesicae vero lateralem sinistram, partem aliquantum deprimendam. His nouis

ferramentis An. MDCCXLI. sapienter excogitatam, et saepius in cadaueribus tentatam, curationem tribus aegris ita adhibuit, vt vesicam in aliis, inter vtrumque vreterem, in aliis, inter prostatam, et vreterem sinistrum, ac super receptaculo seminis, eiusdem lateris, patefaceret. Sed nulum ex iis, quos curauit, seruare potuit, et cum sectionem difficillimam esse cognouit, tum prostatam praecipue se forcipis immisioni extractionique calculi, opponere. Quae vero fama de RAVIO, vesicam solam aperiente, *Albiniana* descriptione confirmata, LE CAT excitauit, ad hanc curationem reperiendam, ea iam ante octodecim circiter annos, FVLBERTVM, Chirurgum Parisiensem, mouit, vt pariter noua quaedam ferramenta excogitaret, quibus posset ad lateralem vesicae partem, illaesa prostata, peruenire. Prima experimenta in cadaueribus cepit A. MDCCXXVII. in viuis vero An. MDCCXXXI. Vid. *Mémoires de l'Acad. de Chirurg. Tom. I. p. 664. & 673.* Nemo adhuc intuentus est, qui hanc curationem imitaretur. Confer. de hac curatione KESSELRINGIVS in *Dissert. de Methodo Foubertiana, Halae, MDCCXXXVIII.* Ego in *Observ. Chirurg. citato libro Obs. I. et FVLBERTVS ipse in Mémoires de l'Academie de Chirurg. Tom. I. p. 650. seqq.* vbi animaduersione dignum est, FVLBERTVM non, vt alios, quot aegris haftenus suam curationem adhibuerit, indicasse. Ferramenta, quibus FVLBERTVS utitur, primum KESSELRINGIVS *loc. cit.* deinde ipse FVLBERTVS *loc. cit. Tab. I.* iconibus expressit. Vtilissimae etiam eo loco habentur, partium sectarum icones, quae viam curandi planissimam faciunt, et quae in hoc genere, quantum equidem noui, primae sunt. Commoda et incommoda huius curationis breuiter a me exposita sunt *loc. cit.* fusius a KESSELRINGIO. Comparauit eadem inter se etiam G. DE LA FAYE *l. c. p. 254. seqq.* Contra hunc directae est epistola, quae sub titulo: *Lettre de Mons. ***. Chir. de Province à Mons. ***. Maître Chirurgien de Paris. Parisiis MDCCXL. prodiit.* Acriter tamen perstrinxit ea, quae in hac epistola pro FVLBERTO dicta sunt, COGHLANVS in *Observ. critiq. sur la lettre d'un Chirurgien de Province à Mons. ***. Chirurgien de Par. MDCCXLI.* cui libello addi potest vtriusque scripti recensio critica, in *Actis Erudit. Lips. MDCCXLV. Mens. Febr.* Haftenus breuem historiam dedimus curationum calculosorum, quae adhuc innotuerunt; superest, vt ex partibus sectis, constituamus, cum, an omnes vere diuersae sint, tum, quo, quaeque tempore, reperta sit. Primum igitur omnis calculosorum curatio in eam diuidi potest, in qua vesica super ossibus pubis inciditur, et eam, in qua sub his ossibus, via ad vesicam paratur, per quam calculus euelli possit. Deinde haec curatio, quae in perinaeo fit, vel mediam vesicae, aut potius vrethrae, partem afficit, vel lateralem. Ad
harum

harum alterutram, omnes curandi rationes pertinent, de quibus haftenus dictum est, praeter *Franconianam*, quae ideo a reliquis quam maxime distincta est, et a PETRO FRANCONONE reperta. Nemo fere ignorat, vulgo in *Mariana* eam itineris vrinae partem incidi, quae ante prostatam est; et plagam, qua cutis inciditur, futurae, quae in perinaeo est, a latere sinistro, respondere. Vt forceps immitti, et calculus promi possit, os vesicae, in iter vrinae patens, vehementer dilatari, ac saepius cum prostata, rumpi debere. Bene autem omnia cedere, si hae partes ita sindantur, vt ruptio plagae, scalpello factae, respondeat. Vid. COLOT *loc. cit.* p. 84. 86. et praecipue LE DRAN *l. c.* p. 154. *seqq.* De illa vero curatione, in qua a latere plaga fit, diuisae sententiae sunt. Volunt eum in *Rauiana* vesicam solam, post prostatam, a latere aperiri, quam sectionem FVLBERTVS et LE CAT imitari voluerunt. Multi tamen RAVIVM contendunt, vesicam non alia via, quam *Cheseldeniana* parefecisse, in qua iter vrinae in membranea parte, prostata tota, cum adiacente vesicae parte, a latere inciditur, quod radicem coxae sinistrae respicit. Vt haec interna plaga recta fere retrorsum eat, tamen externa aliquantum oblique deorsum ducitur. Eaque musculus bulbocavernosus ut plurimum a latere tantillum conuulneratur. Sed lateralem sectionem ponamus *Cheseldenianam* curationem esse; haec enim propemodum ab omnibus exercetur, qui se dicunt calculosos laterali sectione curare. *Cheseldeniana* vero a *Iacobiana* non differt, nempe ea, quam FRATER IACOBVS, vel Argentorati, vt hoc exemplo utar, calculosis adhibuit, vel, quam MERYVS laudauit *l. c. Chap. I. II.* Vid. Cl. MORAND in *Mém. de l'Acad. loc. cit.* p. 216. Peruulgata res est, RAVIVM, de sua curandi ratione quaesitum, respondisse: legas CELSVM, et MERYVS suspicatus est, IACOBVM hanc curandi rationem ab aliquo accepisse, cui per CELSI sectionem, in mentem venerit, eiusmodi curationem excogitare, *loc. cit.* p. 64. MORANDVS vero planissimum fecit *l. c.* p. 222. *seqq.* lateralem sectionem, quantum ad partes sectas attinet, ipsissimam CELSICAM, omniumque adeo antiquissimam, esse. Videtur autem haec sententia et GALENI aliquo loco confirmari posse, qui in *Introd. loc. cit.* ait, Chirurgos, vt possint calculum promere, carneam cervicis vesicae partem incidere. Quare sectio lateralis debet ita diuidi, vt alia cum paruo apparatu, alia cum magno, fieri dicatur. Illa *Celsica* foret, haec adhuc *Iacobiana* nominata est. Vt haec in vniuersum FALCONETO etiam probari videantur, tamen sententiam proposuit, per quam lateralis sectio, cum magno apparatu facta, *Iacobiana* multo antiquior fuerit. Ante FALCONETVM communis opinio erat, IOANNEM DE ROMANIS, quando nouam calculos curandi viam excogitabat, hoc sibi propositum habuisse, vt

masculorum vrinae iter, muliebri simile faceret, ac breui-
 prem in vesicam viam pararet. Contra FALCONETVS
 existimat, IOANNEM DE ROMANIS probabiliter credidisse,
 se, quam reppererat, via, aequae facile, ac *Celsica* curatio-
 ne, ad vesicam peruenire posse l. c. p. 9. Quicumque
 IOANNIS animus fuerit, certum mihi est, inter eos, qui
 ante IACOBI tempora, aliam calculosis curationem adhibe-
 bant, quam, quae vel cum paruo apparatu, vel in hypo-
 gastrii ima parte fit, permultos fuisse, qui vel data opera,
 ceruicem vesicae, super itinerario aperiebant, vel in ea
 opinione constituti, se, *Marianam* curationem perficere.
 Conf. FVLBERT. l. c. p. 660. Inter hos primus est PETRVS
 FRANCO, cuius verba apponam: *Estant le rasoir à l'endroit
 de la dite canule (sic vocat itinerarium) il faut copper le col
 de la vessie sur la cavité d'icelle. La fait, on tramera le
 dit rasoir par dedans icelle, le quel comme avons dit par cy
 devant coppa des deux costez, selon qu'il est figuré: ayant
 fait assez bonne ouverture vers la capacité de la vessie &c.*
 Et paulo anteq̃ dixerat, plagam in latere sinistro faciendam
 esse, quo loco in *Celsica* fiat l. c. p. 130. Reliqui, quos
 noui, sunt: IOANNES ANDREAS A CRVCE l. c. Lib. VII.
 p. 23. qui vult, totam ceruicem ita aperiendam esse, vt calcu-
 lus in conspectum prodeat, quod certe in *Mariana* non
 potest. FRIDER. DE LEAVSON in latere sinistro, duos
 tresue digitos ab ano, incisionem vult fieri l. c. C. VIII.
 DVRANTES SCACCHVS in extremitate natis sinistrae, plagam
 fecit, vt ceruicem vesicae aperiret loc. cit. p. 187. Vid.
 etiam HILDANVS loc. cit. Cap. IIII. COVILLARD loc. cit.
 p. 101. Hos omnes, si non plane *Cheseldenianam* curatio-
 nem adhibuerunt, proxime tamen ab ea abfuisse oportet.
 Post IACOBI tempora, praecipueque post RAVII et CHE-
 SELDENI prosperrimos successus, plerique, qui *Marianam*
 exercebant, hanc ita sensim mutarunt, vt nouam curatio-
 nem facerent, quae dici possit media inter *Marianam* et
Cheseldenianam esse. An haec fortassis causa est, quod
 tanta sit diuersitas in numero calculosorum, qui in noso-
 comio Domus Dei *Parisis An. MDCCXX. seqq. et An.
 MDCCXL.* seruati sunt? de qua re vid. MORAND *Traité
 de la Taille au haut appareil* p. 263. et COGHLANVS loc. cit.
 p. 35. Conf. etiam de recentiorum ratione *Marianam* cu-
 rationem exercendi DE LAUNAY loc. cit. p. 99. au côté de
l'urethre. TOLET loc. cit. p. 173. LE DRAN *Parallele* p.
 59. KOENE loc. cit. p. 19. 21. G. DE LA FAYE l. c. pag.
 223. Vid. etiam ex veteribus PAREVS loc. cit. Cap. XLII.
 Curationum igitur, quae calculosis adhibentur, duo sum-
 ma genera sunt. Promitur enim calculus, vesica vel super
 oisibus pubis, incisa, vel sub illis. Sed hoc quidem tribus
 modis fit. Iter enim vtinae, vel recta plaga aperitur,
 quod in antiqua *Mariana* fit, vel obliqua, qualem, recen-
 tiores

tiores faciunt, qui recedere a *Mariana* non volunt, vel transfuersa a latere. Haec antiquissima est, et cum aliqua in ferramentis varient, quae sine itinerario adhibetur, *Celsica* nominatur, quae cum ipso, quamuis vulgo *Iacobiana* nominetur, deberet utique *Franconiana* appellari. Fateri tamen oportet, hanc potissimum in eo a prioribus differre, quod, cum in hac ceruix vesicae et haec ipsa aperiatur, in illis iter vrinae solum.

Quod GÜNZIUS in praecedente nota et ante eum Franco-Galli chirurgi dudum suspicati sunt, esse scilicet, qua B. S. ALBINUS in *Suppellestili anatom. Rauil* de loco inciso dixit, prorsus falsa, id PETR. CAMPER in L. II. *Demonstr. Anatom. Patholog.* luculenter asseuerat, et iconibus etiam additis, non vesicam, ut ALBINUS dixerit, sed vesicae ceruicem a Rauio incisam esse, docet.

* Inter curationes, quae manu fiunt, paucissimi medentium calculi exsectioni ex renibus, nephrotomiam vocant, locum concedunt. HIPPOCRATES, ubi renum morbos recenset, primo loco calculum nominat. Cui, cum dolor accesserit, superdanda esse, quae tepefacere possint. Si sub his tumor ortus fuerit, cui pus subsit, iuxta renem secandum esse, et, calculo vel arena exempta, vulnus curandum. In *libro de Intern. affection.* p. 539. Hanc curandi rationem improbarunt ex veteribus AVICENNA *Lib. III. Fen. 18. Tract. 2. Cap. 18.* et SERAPION in *Prax. Tract. IIII. Cap. 22.* Forte, quod aliqui ausi sunt, etiam ubi ren non intumuerat, et pus conceperat, calculum excindere. Talis debuit sectio esse; qua arcigero Parisiensi calculus exemptus esse dicitur, modo vere renem calculo laborauerit. Vid. PAREVS *Lib. XXIII. Cap. XIX.* et MEZERAY *loc. cit.* ROSSETVS contendit, hanc curationem, sine praesentissimo mortis periculo, adhiberi posse; debere tamen non in dorso, sed circa ilia, fieri, in *Enfant. Caesar. Assert.* t. 78. et *Part. Caesar. p. 222. seqq.* Eadem fere RIOLANI mens fuisse videtur, in *Anthropogr. Lib. II. Cap. XXVI.* Vult autem, si tumori pus subsit, causticum imponendum esse, in *Enchir. Anat. Path. Lib. II. Cap. XXIX.* Huius curationis, a DOMINICO MARCHETTIS aliquando feliciter perfectae, exemplum habetur in *Transact. Philos. No. 223. p. 340.* Improbatur et varia argumenta in eam rem adducit NICOLAUS TVLPIVS in *Obs. med. Lib. III. Cap. 27.* A TVLPII sententia hodie ex medentibus paucissimi recedunt. Vid. ex recentissimis IOANNES DOUGLASS. in *Med. Essays of Edinb. Tom. I. Obs. XXI.* sed pauci, etiam ubi calculus abscessum formauit, plagam facere audent. Vulnus enim non coire dicunt, sed perpetuam fistulam manere. Nolo negare, cum renes profunde sub musculis, in dorso siti sint, et magna pinguedinis vis circumfusa, non leuem fistulae metum esse debere. Sed, si sponte tumor ortus est, isque pus concepit,

quis ruptionem tumoris prohibeat, quin se ad internas partes puris materia conuertat, et hominem tollat? Quare, opera danda sit, ne inflammationi occasio adferatur, pendens tamen Medici esse puto, non tam expectare, donec abscessus rumpatur, sed maturum protinus incidere. Quod enim diutius pus intus continetur, eo maior fistulae esse debet. Et varia huius curationis exempla habentur. Vid. de *Nephrotomia* GEORG. WOLFFG. WEDEL in *Diff. Lithotomia Jen. MDCCIII*. Cl. HEISTER in *Inst. Chir. p. 1 seq.* IACOBVS MERY *loc. cit. p. 2 seqq.* et FRANG. COLCOTER *loc. cit. p. 36 seqq.*

† De *sectione renum* dissertationem historicam et criticam descripsit HEVIN in *Monum. Ac. R. chir. Vol. III.*

§. 1357.

Omni tempore vulgo crudelis ac temeraria curatio habita fuit, quae calculosis adhibetur. Neque negari potest, Medicinam in hoc etiam nunc saepius fallere quamuis in nulla fere chirurgia tam multum elaboratum sit. Igitur, quo plura in hac et genera et tempora periculi sunt, eo minus ad eam festinare conuenit. Et qui eam experiri volunt, ante in pluribus mortuorum corporibus se exercere debent.

§. 1358.

Calculus, qui vesicam infestat, nullam aetatem magis exercet, quam puerorum. Inimicior etiam ex illis est, qui ab humilis fortunae parentibus nati sunt. Ex quo conicere licet, calculo ut plurimum cibum et potumque occasionem adferre, ex cruda acida et viscida materia paratum. Probabile tamen est, aliquando etiam ex naturali aliquo renum ac vesicae vitio nasci. Per multa enim calculosorum exempla habetur, qui, cum pueri facti fuerint, tamen adolescenti ac viri facti, iterum tertiumque calculum in vesica aluerunt*. In adultis contra raro calculus in vesica nascitur, sed tantum increscit. Ut plurimum enim vel paruus lapillus, vel arenulae aliquot, quae cum puris vel sanguinis particula, concreuerunt, cum loti

renibus, in vesicam deuoluuntur. Ex quo simul constare debet, quam variae possint calculorum in adultis causae esse. Vbi eiusmodi lapillus in vesicam descendit, super eo, ex tartareis particulis, quae in lotio sunt, plures crustae concrescunt, nisi mollis et renosus calculus sit. Saepe fit, vt, si talis calculus confringitur, is, qui ex renibus descendit, exsiliat. Vt vero tartarea materia super lapillo, concrescere potest, et etiam super omni corpore, quod quacunque via, in vesicam delatum est. Et hic verus vesicae calculus est. Inuenta vero sunt in calculis, siue ex viuis, siue ex mortuis extractis, ferramenta varia, acus, bacilli, glandes plumbeae, pilorum fasciculi, pennae, turundae, ceci, et alia permulta **. Nullam tamen dubitationem admittit, calculum in vesica, etiam ad puris sanguinisque particulam, et forte etiam muci, qui vesicam obniti, adnasci posse, praecipue, quando vesica intus pluribus cellulis inaequalis est, in quibus lotium aliquamdiu retinetur ***.

* Ex pluribus exemplis, quae afferri possent, aliquot tantum allegabimus. FRANC. TOLETVS *loc. cit. p. 256.* virum habet, cui, cum admodum puero, calculus sectione extractus fuerit, quinquagesimo tandem aetatis anno, iterum calculus in renibus nascebatur. Aliud exemplum memorat de LAVNAY *loc. cit. p. 40 seq.* quod eo maxime memorabile est, quod, cum a prima sectione fistula remanserit, calculus tamen XVII. vnciarum, in vesica concreuit. Bis etiam a calculo liberatus fuit RIOLANVS, quod ipse testatur in *Animadu. in SPIGELIVM*, ter ELLAIN, Medicus Parisiensis apud GOURMELENVM in *Operat. p. 185.* et alius apud COLOTVM *loc. cit. p. 15.* Plura exempla hominum, qui ter, quater, imo quinques, secti fuerunt, vid. apud HEISTERVM in *Inst. Chir. p. 1003.* et in *Mém. de l' Acad. de Chir. Tom. I. p. 415 seqq.*

** Multa exempla collecta vide in PLATNERI *Diff. de calculo ad Vesicam adhaeresciente §. X.* quibus addi possunt IOSEPH. COUILLARD in *Obs. Iatrobir. p. 39.* qui calculum extraxit, circa glandem plumbeam concretum, quale exemplum DIONIS quoque memorat *loc. cit. p. 243.* vid. etiam COLOT. *loc. cit. p. 48.* Pilorum fasciculum, circa quem calculosa materia coiecit, OL. BORRICHIVS vidit. confer. ACT. HAFN. *Vol. II. Obs. LV.* Acus lutoriae, calculo inhaerentis, historiam

vide sis in *Zod. Med. Gallic. Ann. III. p. 29.* Duos calculi super fistulae, ex quibus tabaci fumum fugimus, frustis, cocteros habet KOENE *loc. cit. p. 8.* Homo, ex quo hi calculi extracti sunt, ante calculo sectus fuit. Cumque in vulnere pruritus haberet, qui ipsi molestus erat, illa fistulae funi immisit, quibus vulnus fricaret, cumque nimis breuia essent in vesicam illapsa sunt. Turundam ex linteo factam, et calculo obductam, quae ante triginta quatuor annos, in accessu super osse pubis, perdita fuerat, ex vesica matrona eduxit COLOT. *loc. cit. p. 49 seqq.* Claviculam in calculo inuentam memorat MATTHAEVS in *Obs. adi. Eiusd. Quaeq. Med. p. 128.* Aciarium, quod puella pruriens in vesicam intruserat, et super quo calculus concretus erat, ex LVISCRORETIVS habet *loc. cit. p. 18.* Vid. VALLISNIERI *Oper. Tom. III. p. 310 seqq.* Haec docent, si ob quodcunque vitium fistula in vesica relinqui debet, per quam vrina euocari possit, non nimis diu relinquendam esse, ne, si arenulae adhaerint, non possit sine itineris vrinae grauiore noxa recipi.

*** Conferri meretur HOVSTETI *Commentatio de calculis testicula inclusis in Mémoir. de l'Acad. de Chir. Tom. I. pag. 395 seqq.*

§. 1359.

Transeamus vero ad ea, ut, quae aliquis in calculo habere possit notas, indicem. Earumque ut permulta sint, tamen, vnica tantum certa calculi indicia praebet. Quorum igitur vesicam calculus infestat, frequens vrinae mittendi cupiditas est, et grauitatis in perinaeae ac circa pubem sensus. Dolor etiam in his partibus fere perpetuus est, et ad motum in equo et rheda incrementum crescit. Augetur etiam, vbi vrina mittenda est, quae saepius, vel intercipitur, vel, quasi tenuiore filo fluit. Redditur autem vel aquosa vrina, vel, quae mucum, aut quasdam quasi squamulas, secum trahit. Vbi motus praecessit, etiam sanguis fluit inter maximos dolores aut cruentum. Vrina etiam non in omni aegri positu profluit. Solent vero aegri, praecipue pueri, partim scalpere colem, partim extendere. Frequenter etiam contra voluntatem, ac cum molestia, arrigunt. Vehementissimus dolor est, vbi nouissimae lotii guttae exprimendae sunt, tumque et desidendi cupiditas est. In his

omnibus signis est, quod fallat. At fidem calculi ciunt digitus in anum demissus, et ad vesicam datus, maximeque fistula, quae per vrinae iter, in vesicam compellitur. Tamen ne cum hac quidem in omni usu satis certi medentes sunt. Nam, si parvus calculus est, effugere fistulam potest, si mollis et arenosus, et tunica inclusus, suspicionem carunculae facere, tales saepius vesicae increscunt, vel indurati interni vesicae velamenti. Quare medentes non satis habere debent, fistulam semel in vesicam demisisse; Et, ubi remissa est, huc illuc moueri oportet, quo, si forte calculus aliquo in loco lateat, vel maximam partem, tunicae vesicae inhaereat, per longam tamen et curiosamquisitionem inueniatur. Certo autem indicio, calculum intus esse, cognoscitur, si fistula in calculum indens sonum edit. Multum etiam iuuat cognouisse, num vnus, an plures calculi in vesica sint, mobilesne sint, an adhaerescant, magni, an parui; et num vesica sana sit, an vitium in velamentis habeat. Sed in haec expedit, saltem in pueris, tam digitis, in anum coniectis, inquirere, quam fistula, in vesicam compulsa.

§. 1360.

Neque vero tutum est, omnes calculosos curare. Secari igitur non debet, cui vesica intumuit, et callo indurata est, cuius vesicae velamenti calculi increuerunt, cum cuius vrina purulentum quid, et mali odoris excernitur, maxime, si aeger ex lumbis dolet, et vitii renis indicia habentur. Senium quoque abstertere medentes potest, ac si valde corruptus habitus est. Etiam omne neruorum vitium inutilem aegris hanc Chirurgiam facit, et vita periclitatur, si vel nimis magnus calculus est, vel tunica quadam inclusus: Quod si aeger ac necessarii tamen hoc auxilium adhiberi malint, quam nullum, proposito metu, nullam fere spem super-

supereffe, indicandum est. Et nunquam licet certam salutem promittere. Plurimum tamen spei facere potest aetas iuuenilis, corpus robustum, ac in caetero sanum, calculus, qui nec nimis magnus, nec nimis parvus est, qui aliquem laeuorem habet, ac moderate duritiem, neque ad vesicam adhaerescit. Videntur etiam curatio prosperos successus habitura esse, si quod cum vrina excernitur, neque cruentum, neque purulentum, est.

§. 1361.

Igitur, vbi vltima experiri statutum est, omnia cum spectius agenda sunt. Neque enim id in omni tempore experiendum est, sed vere atque autumate. Nam internas praecipue partes, cum solis ardor, tum frigus, laedit. Videndum tamen, an non ex mora periculum futurum sit. Quare, si porrigi aeger in illud tempus non potest, quod curationi commodiorem locum praebet, arte subueniendum est, vt, siue caloris siue frigoris, nimia vis auertatur. Ad haec nunquam tutum est, crudum corpus curationi subiicere. Praestare vero illud victu, quam medicinis, praeparare. Et assumere aeger cibos boni succi debet, ex quibus chyli parari possit facile meabilis. Neque concedendum est, vt aeger ventriculum multis cibis oneret. Proximis diebus ante curationem, sanguis, incisa vena, mittendus est, nisi vel summa debilitas, vel aliud quid, obstiterit. Hinc vtile etiam est, aluum soluere, quae potissimum quo die curatio adhibenda est, clysmate iniecto elui debet. Nam extrema aluus, si a duris faecibus distenditur, facile cum scalpello, tum calculo, vbi euellitur, laedi potest. Praeter haec, vbi ad extrema peruentum est, Medicus exire iubeat, cum omnes, quibus opus non habet, tum praecipue cognatos aegri, qui sermonibus lacrymis, aut vultu tantum, flectere eius animum possent. In qua re tantum discriminis est, vt robustissimi

s hominibus eo aliquando ita solutae vires fuerint, calculo feliciter exempto, tamen, interposito aliquo atio, decederent.

§. 1362.

Cum nostra aetate tam multum in calculosorum ratione elaboratum sit, vt plures viae habeantur, ibus ad vesicam perueniri et calculus promi potest, nuenire inter medentes debet, quam ex his curatio- nis aegro adhibere expediat. Neque enim omnibus lem conuenire potest. Quare, si calculus insolitae gnitudinis est, neque vesica multum vitiata, et par- oportet super pubis ossibus secare, contra, si vesica nementer adstricta ac pene scirrhusa est, ceruix ve- ae a latere aperiri debet. Eandem *Franconianam* cu- tionem, vel etiam, si puer est, *Celsicam* adhiberi oportet, vbi calculus vesicae ceruici ita infedit, vt repelli, fistula in vesicam coniici, non possit. Etiam in na- ra calculi multum discrimen est. Igitur, si magna us aspritudo est, et si quasi ramos habet, tutissimum, *Cheseldenianam* curandi viam eligere. Si mollis et enosus, et vrina multas arenulas secum trahit, prae- t eadem via, vel etiam *Mariana*, incedere, modo non ures calculi sint. Nam molles calculi magni non nt. Interdum tunica inclusi calculi sunt, vel fungi carunculae vesicae increuerunt. In quo casu, vel *Franconiana*, vel a *Cheseldeniana*, sectione praesidium tendum est; ab hac, si calculus, aut fungus, inferiori sicae parti inhaeret, ab illa, si superiori. Requiritur men, vt Medicus in his omnibus curandi rationibus ercitatus sit, vel, vt saltem in mortuorum corpori- is saepe tentauerit. Aliter adhibere conuenit, in qua exercuit, et quae per plures aegros respondit, quam- s altera praestaret.

§. 1363.

Qui nostra aetate calculosos curant, plerique *Marianum* sequuntur, vel cum magno, quem vocant *apparatu*, fecant. Quo maior apparatus est, eo curiosius omnia agenda, et quorum vel incidere tantum usus possit, ante curationem, ita disposita, in promptu habeantur, ut curatio nullo casu turbari queat. *Instrumenta* igitur sunt 1) *Specilla* ex durissima chalybe parata, et magis, quam fistulae, quibus urinam emittimur, incurua. Debent etiam longius, quam *Fistulae*, rostrum, et in dorso, qua parte incuruum specillum est, sulcum in longum ductum habere, in extremo rostro apertum, quo factum esse videtur, ut itineraria nominarentur. Qua parte a Medico neri oportet, plena esse debent, ne facile vacillent. Necesse est etiam, ut, qui calculosos curare vult, cum quia aetas variat, tum, quia in itinere urinae quaedam diuersitates sunt, varie magna ac plena, varieque incurua specilla habeat. 2) *Scalpellum* latum et anceps, quod cum fixum non sit, fasciola, ex linteo secta, circumligari oportet, quo non solum fixum sit, verum etiam sine laesionis metu, firmiter a Medico teneri possit. Praestat tamen, ut per pollicem tantum, versus apicem, acutum sit. Sunt etiam, qui fixum esse malunt, et ex acutis labris, quod perinaeo obuertitur, parum incuruum, quod sursum conuersum est, fieri rectum. Expedit vero ad minimum duo eiusmodi scalpella parata habere, in quibus primum hoc sit, probe acuta sint. 3) *Ductor canaliculatus*, (*Gorgere* super quo forcipes in vesicam coniici debent. Requiritur, ut ex auersa parte lingulam habeat, ex aduerso manubrium paulo plenius et sinistrorsum conuersum. Huius loco etiam duo ductores adhiberi possunt, quorum alterum feminam, alterum marem appellat. Ille, ut canaliculatus ductor, lingulam et manubrium habet.

bet, praetereaue cristam, quae per totum ductorem, in longum ducta, in medio eminet. In altero ductore haec crista deest, isque non in lingulam, sed quasi in furcam terminatur. 4) Forcipes aliquot, quibus calculus euelli debet; In quibus primum fere esse oportet, ut ex chalybe paratae sint, probe induratae, cum interdum vis adhibenda est, frangantur. Deinde aliae magnae esse debent, aliae paruae, et ex crisque, aliae rectae, aliae incuruae. Qua parte calculus mordere debent, dentatas esse oportet, et tantum excauatas. 5) Vncus ex chalybe factus, qui interdum in vesicam coniici debet, vel ad paruos calculos promendos, vel ad maiores etiam, si in vulnus intraverunt, ut prehendi forcipe non possint. Oportet tunc uncum, fere ut forcipes, dentatum esse. 6) Fermentum, quod, cum in altero extremo, cochlear ferat, in altero nodum, (*Bouton*) in dorso autem cristam habeat, plane, ut ductor, femina dictus, triplicem uncum habet, ut infra ostendam. Praeter haec vas aliud ad manus esse debet, oleo tepido plenum. Nam, haecunque ferramenta in vesicam imittuntur, oleo tepido inuncta esse oportet. Praestat etiam quasi iursa quadam praecinctum esse, cui ferramenta ita haereant, ut manubria promineant *, quam ipsa in statina disponere, quae a ministro teneatur. Is enim plurimum minus sua curat, quam ad ea attentus est, quae Medicus curans facit. Denique habere etiam Medicum fascias, seu ligamina decet, quae, si aegro iniicienda sunt, ut immotus praestetur.

* Figura tales bursas expresse runt ALGHISI l. c. *Tab. VII. et* HEISTERVS l. c. *Tab. XXX. Fig. VI.*

§. 1364.

Haec omnia ad curationem necessaria sunt. Oportet vero etiam de positu aegri sollicitum esse. Optimum est, mensam paratam habere, quae non facile di-

dimoueri possit, super hac, vel sedile inuersum, ponitur, vt dorsi summum duas, vel tres, latas manus margine mensae absit, vel latus aliquis asser, eadem margine distantia, mobili iunctura firmandus est. Isq; fulcro mobili in dorso instructus sit, cui in mensa, in longum ductae, aliquot incisurae respondent, quo asser modo altior statui, modo demitti, possit. Inter asserem vero et marginem mensae, saccum firmine plenum, vel culcitram, imponi oportet, qui resistere possit. His deinde linteum insternitur, qua parte aeger super asserem collocatur, puluinae subiiciuntur. Tum aeger his ita imponitur, et figuratur, vt coxae super marginem mensae collocentur, et, cruribus diductis, calces ad coxas, manus demissae ad malleolos externos, dentur. Interdum tamen manus ad genua tantum adduci queunt. Vt vero contineri possit, deligari inter se debent. Crudele est videtur, et cum terrore, aegris incusso, mortem ipsam aliquoties induxit, longam fasciam, quae quatuor capita habet, ita ceruici iniicere, vt inde variis ductibus ad manus pedesque, descendat, quibus aliquoties circumducitur. Praestat igitur manui laqueum iniicere eamque et pedem, vel genua, inter se deligare.

* Figuram talis mensae vide apud ALGHISI *loc. cit.* *Tab. VI.*

§. 1365.

Quae vbi hoc modo ordinata sunt, curandum est vt ministri, suo quisque officio, recte fungantur. Quinque autem ministris opus est, qui omnem curam scire debent, et animo intrepidi esse. Tres praeuales aegrum continent, quorum vnus, qui per aegrum mensam conscendit, super humeros eius iugumque incumbit, duo a lateribus obiciuntur, qui altero cubito inter crus cubitumque aegri immisso, laqueum quasi tendunt, et aegrum eo certius immotum.

pra

stant, altero cubito, seu manu potius, extremum
is, circa malleolos, comprehendunt. Quartus, a
tro aegri latere, post eum, qui crus dextrum con-
et, altum sedile conscendit, et corpus ita inclinat,
super abdomen calculosi, incumbere videatur.
ne aequè peritum ac circumspectum esse oportet,
eum, qui curare vult. Debet enim dextra manu
tum aegri dextrorsum molliter continere, simul-
vtriusque manus indicem digitum, reliquis in-
am contractis, ita versus anum protendere, vt,
tro futurae perinaei, sinistro sinistrae perinaei parti,
posito, cutis in contrarias partes tendatur. Quo
vt proxime ad futuram perinaei, in latere sinistro,
is inter vtrumque indicem pateat, qui recta fere
ga incidi possit. Ad haec omnia quinti ministri
tes sunt, latum illum scalpellum, quo plaga fit,
lico curanti ita porrigere, vt in se eius aciem con-
cat. Ac nisi Chirurgus manu sinistra plagam faci-
quintus minister semper a dextris eiusdem stare
et.

§. 1366.

Vbi haec ordinata sunt, Medicus ex incuruis, et
catis specillis id, quod maxime conuenire itineri
nae existimat, leniter prius oleo tepido vinctum, sic,
praeceptum est (§. 1338), circumspicte admodum,
vesicam demittit, et calculum quaerit. Qui vbi
vertus est, manubrium specilli sinistra fortiter ap-
hendit, idque altius in vesicam demissum, sic reci-
pi, vt cum aegri iacentis corpore, angulum fere
tum faciat. Post haec necesse est, specillo quasi
nu inniti, quo iter rinae aliquantum deorsum
teatur; Eique dorsum specilli, qua parte sulcum
bet, debet intus sic apprimi, vt inter quarti ministri
itos (§. 1365), cutem perinaei, paullulum oblique
orsum, in tumorem attollat, quod desiderat, vt

manubrium specilli tantillum ad inguen dextrae inclinet.

§. 1367.

Chirurgus deinde scalpellum apprehendit, quo quintus minister, linteo obuolutum, tenebat, transversumque ori tenendum dat. Antequam enim incidere possit, in positum specilli, dextrae manus indice, denuo curiosius inquirendum est. Vbi cognitum est, fulcum specilli illi perinaei loco subesse, qui inter ministri digitos patet, scalpellum, ex ore receptum tamquam calamus tenet, quo ad scribendum utitur. Hinc acies scalpelli latum digitum sub scroto, perinaeo obiicitur, et cutis fere usque ad anum, profunda plaga, inciditur. Protinus autem manubrium scalpelli ita sursum attolli debet, ut apex recta fere fulcum specilli spectet, ad quem etiam demittendus est. Depresso iterum manubrio, sursum agi possit, et urinae patefieri. Hoc sufficere potest, si calculus parvus est. Ut plurimum vero necesse est, specillum ad cartilaginem, qua ossa pubis continentur, apprehendere, in eiusque sulco, scalpellum deorsum agere; deorsum autem et intus ad prostatam usque, iter urinae in plaga diduci possit, manubrium specilli aliquantulum ad anum inclinatur, et scalpellus ita demittitur, ut altera acies sursum, altera deorsum, conuersa sit. Plaga facta, dum specillum restituitur, debet et scalpellus recipi. Nam haec duo ferramenta ita oportet, ut non, nisi unum, et iuncta inter se, videantur. Atque in plaga facienda, praecipue methodi calculi ratio habeatur, quo facile promissum

§. 1368.

Scalpellum vero non, nisi ita, recipiendum est, ut ad superiorem plagae angulum adducatur. Tunc is, qui scrotum continebat, hoc sinistrae tradit, de

specillum præhendit, apicemque fulco specilli leuiter præmit. Inter hæc Medicus ductoris canaliculati gulam, a latere scalpelli, in fulcum specilli coniicit; eoque vt eam vere esse intelligat, ductorem aliquoties sursum deorsumque, et in vtrumque etiam latus, trahet. Vbi sic eius rei fides facta est, iubet scalpellum tollere, dumque manubrium specilli ad anum intrat, ductorem alte in vesicam demittit: quo facto, eius rei certum indicium vrina præbet, quæ effluit, specillum sinistra recipit, ac ministro dat. Deinde, eadem manuum vicibus, ductorem sinistra præhendit, tamen elabi e vesica non patiatur. Sed indicem traxerit manus canali ductoris imponit. Eum vero, sursum nitendo, non tam recta intrudi oportet, sed per vices eleuando deprimendoque, paulatim moueri, quo via aperiatur. Recepto digito, super eum ductore, forceps, siue recta, siue incurua, in vesicam compellenda est, subitoque hæc ferramenta inuertenda; vt ductor superior sit. Isque eodem e momento extrahitur. Qui duplici ductore vtuntur, vbi is, quem marem nominant, in vesicam demissus est, simili ratione specillum recipiunt: deinde eodem ductoris cristæ, fissuram alterius, qui femina tractatur, imponunt, vt super ea in vesicam compelli possit. Plerique hos ductores aliquoties diducunt, vt vnus amplient, tumque eos sinistræ manus digitis præhendunt, vt, inter ipsos, forceps immitti possit, quo facto ductores recipiendi sunt.

§. 1369.

Cum iam eo venit, vt calculus protrahatur, et forceps immitti, sine vi quadam, non potuit, conuenienter forcipem lente aperire, atque huc illuc inclinare, vulnus aliquantum dilatetur. Quo facto, claudere quo forcipem oportet, et calculum quaerere, vt,

cum super eo forceps diducta fuerit, ipse, sine molestia attrahendae vesicae, commodè prehendi possit. Deinde autem ea parte prehendi, qua angustissimus est, caudumque etiam, ne, cum adduci forceps coeperit, calculus intus effugiat. Quare, nisi specillo capitato (*bouton*) quod, inter brachia forcipis, immitti debet, calculus aliter collocari queat, praestat ipsum cum capite quasi demittere, eaque tantillum diducta, iterum ita prehendere, ut facile promi possit. Vbi igitur tenuis teneri calculum patet, non rectè protinus attrahendus est, sed forceps torquendo, sic tamen, ut leniter id fiat, in utrumque latus, per vices, moveri deinde ultimoque ad anum deprimi, ut calculus eo facilius producat. Sed interdum maior calculus non videtur, nisi ruptis nimium laceratisque partibus, extrahi potest. Illum alii ita curare volunt, ut, firmiore aliqua forcipe immissa, frangant*. Et si vero magna cura habenda, tamen non semper satis caueri potest, ne vesica commulatur. Et cum opus sit, quo singula frustra pertrahantur, forcipem saepius in vesicam immitti possunt facile mortiferae inflammationes excipi. Quare praestat, vel inter forcipis brachia, scalpello quod apicem obtusum ac dorsum habet, immittere vulnus ampliare.

* Talis forcipis iconem dederunt PETRVS FRANCO *loc. cit.* p. 137. ex veteribus, ex recentioribus autem ALGHISI *cit. Tab. XV. Fig. I. & II.* vid. etiam HEISTERVS in *loc. cit. Chir. Tab. XXVIII. Fig. 7.*

§. 1370.

Sed aliae etiamnum varietates sunt, quae animi versiones quasdam desiderant. Saepius enim plures calculi sunt, quod, cum ante curationem, saltem non semper, cognosci possit, ubi primus euulsus est, is in aliqua parte laeuorem habet, necesse est, specillo capitatum iniicere. Super huius crista, si plures

i sunt, forceps caute immittitur, et singuli protra-
 tur. Quod tamen, si arenosi calculi sunt, semper
 esse non est. Cum enim forcipe apprehensi utplu-
 um dilabantur, recepto specillo, vel uncus, vel
 hlear, iniicitur, quo frustra calculi maiora eximan-
 Nam, si quaedam exigua, vel arena, supersunt,
 ius relinquuntur, siquidem facilius per urinam elui
 unt.

§. 1371.

Ad haec, calculus etiam nonnunquam vesicae ad-
 rescit, quod non vno modo fit. Nam vel tunicis
 cae, modo fere totus, modo aliqua spina, inhaeret,
 quibusdam quasi carunculis mediis, adglutinatur.
 i tunica inclusus est, non, sine ingenti periculo,
 cipeprehenditur, et attrahitur. Vesicam enim a
 tamento sic laedi necesse est, ut nunquam fere non
 fera inflammatio consequatur. Contra frequenti ob-
 natione compertum est, seruari posse, quibus cal-
 us, vel aliqua spina, vel media caruncula, vesicae
 aerens, euellatur. Maxima tamen cura habenda
 ne calculus, cum deducitur, vesicam duplicatam,
 rementer agitet; Quare, ubi teneri eiusmodi calcu-
 i patet, opera danda est, ut, forcipe, in utrumque
 as, leuiter mota, a vesica diducatur. Si ne sic qui-
 n sequitur, videndum est, an, super digito immisso,
 nica, qua calculus retinetur, tantillum incidi possit,
 od tamen temere faciendum non est. Saepius enim
 culum finire praestat, et vulnus glutinare *.

Calculus et vesicam inter se glutinari posse, a multis exer-
 citatis Chirurgis negatum est, a pluribus tamen, luculentis
 exemplis, confirmatum. Negavit autem iam olim ROSSE-
 TVS in *Part. Caes. Afferit.* p. 239. ex recentioribus autem
 RVYSCHIVS in *Thes. Anat. II.* p. 30. *seq.* COLOTVS *l. c.* p.
 117. *seqq.* TOLETVS *l. c.* Cap. VIII. pag. 44. ALGHISI
l. c. p. 24. MARINI *l. c.* Cap. VIII. p. 142. et DOUGLASS.
 in *Lithotom. Sect. II.* p. 6. *seqq.* Contra id confirmasse in-
 venio, praeter CELSUM *loc. cit.* et ARETAEVUM, GALENUM

in *Isagog. Cap. XIX.* Plenius hanc rem exposuit PETRUS FRANCO *loc. cit. p. 117. seqq.* et ex recentioribus permultis Conf. PLATNERI *Diff. de Calculo ad vesicam adhaerescens.* LE DRAN in *Tr. des Operat. p. 271. seqq.* et HOVSTETII *Commentatio de Calculis tunica inclusis, in Mémoires de l'Acad. de Chir. Tom. I. p. 395. seqq.*

† Descripsit casum rariorem atque simul ex aliis scriptoribus medicis similes collegit IOH. GOTTFR. PFAEHLER in *Dissert. de calculis vesicae urinae cysticis* Praeside IOH. FRIDR. LOBSTEINIO A. 1774. Argentorati defensa. Ibidem alia Dissert. prodit sistens: *Rarum de calculo vesicae observationes.* A. IOH. SIGISMUND. MÜLLER. 1768. Praecipue euolutum est Volumen I. *Monument. Acad. R. Chirurg.*

§. 1372.

Vbi iam calculus euulsus est, latum aliquod crassum calidumque splenium super vulnus imponitur, quo frigus et aer arceatur, et, vinctura soluta aeger resupinus in lectum collocandus est. Sanguis enim rarissime ita fluit, ut supprimi debeat. Neque expedit eos sequi, qui, ut calculi reliquiae eo certius excidere possint, vel turundam, vel amplam et flexilem fistulam * vesicae per vulnus imponi volunt. Id vero, praeter hoc, quod nihil proficit, si via satis pertectata, etiam nocet potius, si plaga angusta est, et vulnus vexando, graues inflammationes mouet, quod ut non raro mors, sic frequenter fistula, excipit.

* Flexilem eiusmodi fistulam primus adhibuisse videtur TOLTYVS vid. ipsum *l. c. p. 117. Fig. 9.*

§. 1373.

Cum aeger paululum quieuit, interposita vna alteraque hora, vulnus obligari oportet. Conuenit autem, antequam aeger in lecto collocatur, huic aliquot laneos pannos, hisque linteum ceratum, insterner quo possit id, quod ex vesica profluit, excipi. Deinceps alia fascia, quam collare (*Collier de misere*) vocant, collo ita iniicitur, ut tanquam ansa quaedam, ad umbilicum usque propendeat, alia, quae latinorum Tassinianum
latu

lar, aegri lumbis subiicienda. Eiusque transuersa
 per altero extremo per prioris fasciae ansam dato,
 ventrem cingat, altera inter crura dependeat. Quo
 modo, naturales partes atque abdomen oleo rosaceo
 tangi debent, et huic linteum duplex imponi, scro-
 tū vero alio linteolo subiecto attolli. Tumque al-
 terius vincturae transuersa pars, a latere umbilici, non
 constringitur. Post haec etiam vulnere prospici-
 dum est, quod hoc modo fere optime fit. Splenio
 (1372.) ablato, quia sanguinem ac lotium exceptit,
 quod simile imponendum est. Super hoc autem pars
 prior fasciae, inter crura dependens, sic adducitur,
 cum fissa sit, decussim posita, per vtrumque inguen,
 alteram huius vincturae partem, quae ventrem cin-
 git, in utroque latere detur. Praeter haec, ne vulnus,
 oleo, quod femina diducerentur, irritari possit, genua
 am, quibus puluinar aliquod substernitur, vinctura
 eadem inter se colliganda erunt.

§. 1374.

Nemo dubitat, grauissimum vulnus esse, quod vri-
 nae itineri ac vesicae infligitur, ut calculus promi-
 possit: Neque sanescere potest, quia etiam collisum
 est, nisi prius fuerit purgatum. Ergo diligens obser-
 uatio inflammationis habenda est (390). Plurimum
 etiam ad felicem curationem confert victus et aeris,
 etiamque non naturalium rerum, curiosa observatio
 (399. 400. 401. 402). Itaque primis diebus nihil
 omnino super vulnus imponi debet. Id tantum curare
 oportet, ut pura et calefacta splenia vulnus custodiant.
 Vbi vero inflammatio se inclinavit, et ad suppuratio-
 nem spectat, idonea sunt medicamenta, quae digerunt
 (384). Quae tamen ita adhiberi oportet, ut, transitu
 id ea facto, quae carnem alunt, vulnus breui glutin-
 etur.

§. 1375.

Veniam ad eam calculosorum curationem, in qua ceruix vesicae, a latere, aperitur. Cumque in ea plures varietates sint, protinus de illa curatione dicamus quam RAVIVS, a FRATRE IACOBO repertam, emendavit. Eamque sic a RAVIO ordinatam esse habetur. Aeger in tabula minus alta, quam in *Mariana* solet resupinus collocatur, ut tamen caput et nates, pulvini supposito, paululum excitatae sint, scapulae contra depressae. Vincitur etiam laqueo, quo, carpo in iecto, manus, ad externam genuum partem datae alligantur*. Deinde ea specilli fulcati varietas est, ut, cum profundior sulcus sit, tum in parte tantum incurva specilli ductus. Vbi hoc in vesicam coniectum est, manubrium ad ventrem, ac dextrum aegri inguen inclinat, eoque fit, ut medio fere loco, inter anum et sinistri ossis ischii tuber, curvatura specilli sentiantur. Medicus deinde, dextro genu submisso, sinistra manubrium specilli firmiter tenet, dextra scalpellum, quod anceps est, et in hoc a vulgari recedit, quod cum totum minus latum est, tum in tenuem angustumque apicem terminatur**. Quo, antequam cutis incidatur, dextrae manus pollice, curvatura specilli quaerenda est, ut, an recte positum sit, constet, et, an praeter vesicam, nihil specillo, velamentisque communibus, intercedat. Eiusque rei fidem facit specillum, quod duos circiter latos digitos, ab ano abest, etsi in hac re etiam quaedam variat aetas, statura et plenitudo corporis.

* Vid. figuram laquei apud HEISTERVM *loc. cit.* Tab. XXIX. Fig. 10.

** Figuras ferrarum, quibus RAVIVS usus est, vide apud ALBINVM in *Ind. supellect. Anat.*

§. 1376.

Super specillo igitur, quod firma admodum manuteneri debet, cutis subiectaeque partes, profunda pla-

is, sic inciduntur, vt ab eo loco orsa, in quo sectio, quae in *Mariana* fit, terminum habet, vsque ad tuber- culum procedat. Hinc indice sinistrae manus, modo vulnus, modo in anum, demisso, sulcus specilli tra- ieritur; Qui, si non suo loco esse deprehenditur, iam accuratissime potest, restituendus erit, dumque vera plaga fit, ne anus laedatur, interdum hic quoque latus deprimitur. Simul etiam aeger monetur, vt corpus nullo modo agitet, ministri autem, vt ad id, quod cuique iniunctum est, animo attento sint. Tum- dem idem scalpellus ita immitti debet, vt apex sulco haereat, super quo vesica sursum deorsumque po- timum, incidenda est. In reliquis, quae ad ducto- rem, forcipumque immissionem, euulsionemque cal- li attinent, haec tantum animaduersionem deside- rant. Ductores, quia altior et aliquantum obliqua plaga, magna cum circumspectione, immitti debent, ne a vesica aberrant, ac peritonaeum aliasque vicinas partes, conuulnerent. Neque etiam digitus, ad dila- tandam plagam, demittitur, sed forceps, quae in bra- chiorum longitudine, a vulgaribus discrepat, dum in vesica haeret, aliquoties diducitur. Caetera omnia, iam in vulneris curatione, eadem sunt, ac, quae supra proposui (1373. 1374).

§. 1377.

Sequitur alia curatio, quae ab eo, a quo reperta est, *Cheseldeniana* nominatur. Eaque dicitur ex *Ravi- na* orta esse, nisi potius, quantum ad plagam attinet, falsa fuerit. Fuerunt tamen aliqua, in hac curatione, auctore ipso, mutata, quod facit, vt vulgo plures *Cheseldenianae* curandi viae esse habeantur *. Quam- ideo ipse nunc sequitur, haec est **: Aeger in men- te, quae trium pedum altitudinem habet, et cui pan- nus infernitur, resupinus sic collocatur, vt solum ca- put,

put, puluinare subiecto, paullulum excitetur. Deinde vinciri ac teneri debet, plane, vt diximus vulgo in *Mariana* fieri. Eodemque modo specillum incuruum fulcatumque in vesicam coniiciendum est, quod aliquanto longius, minusque incuruum esse oportet. Idque vbi sic, vt in *Rauiana* praeoipitur, collocatum est, illi ex ministris dextra manu tenendum datur, qui sinistra bursas colligit, et quem, vt manum firmam, sic animum ad ea, quae ipsi facienda sunt, quam maxime attentum, habere decet.

* Vid. IACOBVS DOUGLASS in the *History of the lateral Operation*, *Postscript, et in the Appendix to the History*, item HEISTERVS *loc. cit.* p. 970. *seqq.*

** Dedit eius descriptionem SHARP in the *Treatise on the Operations of Surgery*. Cap. XXI.

§. 1378.

Cum iam ita specillum firmatum est, vt eius incurua pars, cutem a latere ani, inter perinaei futuram et os ischii ac pubis, oblique attollat, curans Medicus dextro genu submisso, cutem subiectumque adiposum velamentum, longa plaga incidit, quae a latere perinaei, iuxta anum, ad tuber ossis ischii pertineat. Deinde sinistrae manus indice, in vulnus imposito, specillum quaerit, idque, vbi dimotum est, ita restituit, vt possit super eiusdem sulco, membranea itineris vrinae pars, cum prostata, a latere, et vesica ipsa aperiri. Quae plaga sic facienda est, vt, membranea parte itineris vrinae patefacta, dorsum scalpelli sulco imponatur, acies vero coxam sinistram respiciat. Cum in hac plaga metus sit, ne subiectum intestinum laedatur, duo digiti sinistrae manus in vulnus demitti debent, qui scalpelli ictum auertant. Magnumque etiam momentum ad felicem curationem habet, adipem neque nimis profunda plaga incidere, neque ictus quasi

repe-

petere, quoniam ex his pessima vlcera fiunt, quae habitu celluloso latius serpunt.

§. 1379.

Vbi via patefacta est, scalpellum recipitur, et qua strictior summa plaga est, vnguis indicis sinistrae manus in sulcum specilli demittitur, in eumque, super hoc, ductor canaliculatus coniiciendus est, cuius manubrium in latus sinistrum procedit *. Vt hic certo in vesicam demitti possit, curans medicus, cum dextra manu ministri, qui specillum tenet, huius manubrium prehendit, idque ad se oblique inclinando, curvatum a vulnere quasi in vesicam recipit, super qua ductor canaliculatus tuto in vesicam peruenit. Quo facto, specillum recipiendum est, ac forceps, quae aullulum longiora brachia habere debet **, in vesicam compellitur, calculusque protrahitur. Quae res nullam plane varietatem habet. Habet tamen sanguinis fluxus, qui in hac curatione ut plurimum maior, quam in *Mariana* est. Is solet a duabus arteriis provenire, quae a pudendis ortae, ad bulbum, quem vocant, urethrae, et ad prostatam, pertinent ***. Quae ex his laesa sit, videndum est, quanta vi sanguis profluat, antequam supprimatur. Ergo, si tam magna profusio est, ut curationem turbare possit, statim prima plaga facta, cohiberi oportet, si contra, finit, donec calculus euulsus sit. CHESELDENVS autem, si patet arteria, filo injecto, eam ligare iubet ****, si contra, ellychnium vulnere imponit, quod medicamentum, ad sanguinem supprimendum idoneum, exceptit. Reliqua curatio a *Mariana* non differt.

* Conf. IAC. DOUGLASS in the Appendix fig. V. SHARP loc. cit. Tab. VI. A. B. et HEISTERVS loc. cit. Tab. XXXI. fig. 9.

** Vide icones apud eosdem auctores. Legi etiam merentur, quae SHARPIVS de apertura brachiorum forcipis, ac de eiusdem dentibus, proposuit loc. cit. Explicat. Tab. VII.

*** Vide WINSLOW Tr. du Bas Ventre no. 577. 578.

**** Fi-

**** Figuram acus, admodum incuruae, habet IAC. DOUGLASS *loc. cit. Fig. XII.* et HEISTERVS *loc. cit. Tab. XXXI. Fig. 14.*

§. 1380.

Et haec quidem curatio a multis, et Anglis, et Gallo Francis, Chirurgis, calculosis adhibetur. Contra FVLBERTVS neminem adhuc inuenit, qui ipsius curandi rationem imitaretur. Haec autem FVLBERTI curatio sic ordinatur: Cum vesica ipsa, inter prostatam finistrumque vterem, perforari debeat, primum est, vt aeger ante curationem, quam diutissime possit, urinam contineat. Quod vt eo facilius possit, ptisanæ liberalis potio danda est, quae ex radice dentis canini, liquiritiae ac semine lini, paretur. Fere etiam maior, quam in *Cheseldeniana*, metus est, ne intestinum, quod rectum vocant, laedatur. Quare FVLBERTVS aliquoties aluum soluit, ne retentae faeces intestinum dilatent, et, proxime ante curationem, clysinatè infuso, subducit.

§. 1381.

FVLBERTI autem curatio, cum in loco, in quo plaga fit, tum etiam in ferramentis, a caeteris differt. Sunt igitur ex ferramentis: 1) Machinula, qualem NVCKIVS primum, ad viam urinae intercludendam, reperit, molli aluta obducta, quae gossypio farta est; 2) Acus triquëtra, suae fistulae inhaerens, minus plena, quam, quae ad aquam ex ventre euocandam, adhiberi solet, sed multo longior, atque, vt eo firmitus teneri queat, in fistulae manubrio, annulo instructa. Fistula etiam in summa parte sulcum in longum ductum habet. 3) Scalpellus longus, acutus, angustus, non anceps, et in manubrio ad angulum obtusum fixus. 4) Ductor canaliculatus, qui duabus partibus inter se iunctis, constat, vt, si opus sit, plaga ampliari possit, 5) alius scalpellus falcatus, qui nonnunquam, ad ampliandum
vulnus,

linus, inter crura forcipis, demitti debet. Haec fermenta *Fulbertianae* propria sunt *.

* Vide horum figuras in *FVLBERTI nouvelle methode de tirer la pierre de la vessie. loc. cit. Tab. I.* Ductor caniculatus pene idem est, ac dilatatorium, quo *PETRVS FRANCO* ad feminarum calculosarum curationem, vsus est, et cuius figuram dedit *loc. cit. p. 144.*

§. 1382.

Vbi ad curationem ipsam peruentum est, aeger ane, vt in *Mariana*, collocatur, et vinctus continetur. Tumque, vt vrinam non mittat, coli machinula ante cta iniicienda est, qua iter vrinae intercipitur. Ex sinistris vero, is, qui bursas colligit, pilam sinistra manu, imo abdomini imponit, quo vesicam deprimat, et ad sinistrum latus vrgeat. Inter haec curans Medicus indicem sinistrae manus, oleo prius vinctum, in anum emittit, quem adeo a vesica deducit, et cogit in latus extrum cedere. Quod eo nomine opus est, ne ipse ledatur, tum etiam, vt cutis densa et vesica depressa certo certius perforari queant. Deinde pollicem dextrae manus coxae sinistrae admouet, vt internum marginem tuberis ischii inueniat. Prope hunc, et pollicem ab ano circiter, non tam atramento, aut molybdoide lapide, quam oculis, punctum designatur, ab eoque linea sursum ducitur, quae cum ramis ossium pubis ischiique ductum parallelum seruat, et proxime sub scroto, duas tresue lineas, a perinaei futura, terminatur.

§. 1383.

Cum iam locus sectionis designatus est, quem tamen aetas, statura, aliaque, variare debent, acum triquetram arripit, ac per punctum, quod prope coxam est, alte in ipsam vesicam adigit *. Acus ita tenetur, vt in nullam partem inclinet, nisi, quod sulcus, qui in summa fistulae parte est, ad scrotum conuersus est. Vbi acum in vesicam peruenisse iudicat, neque tamen
vrina

vrina per sulcum, fistulae impressum, profluit, acus intra fistulam recipienda est, quo maior vrinae profluentis libertas detur. Vbi hoc iudicio cognitum est, mutatis manuum vicibus, scalpellus rectus dextra prehendi debet, eiusque dorsum sulco, quem in fistula esse dixi, ad acutissimum angulum imponitur. In vesicam quoque, super hoc sulco, adigitur, quod vbi factum est, lotii maior vis effluit. Vt vesica, quantum necesse est, longa, plaga aperiatur, manubrium scalpelli deprimi, et ipsum totum sursum mouendo, a sulco remoueri oportet **, contra, vbi protinus recipitur, attolli, quo cutis etiam satis pateat ***.

* Hoc expressum est a FVLBERTO *loc. cit. Tab. VI.*

** Vide ibidem *Tab. VII.*

*** Vide hoc in *Tab. VIII.*

§. 1384.

Protinus igitur scalpello recepto, ductor canaliculatus, quo FVLBERTVS vtitur, media lingula, in sulcum fistulae coniiciendus est, cui acus triquetra inhaeret, et super hoc, in vesicam demittendus. Vbi demittitur, sulcus ductoris debet deorsum conuersus esse. Quare, cum in vesicam peruenit, cui rei indicium praebet lingula ductoris, in extremo sulco haerens, qui clausus est, protinus acum recipi oportet, eodemque pene momento, sulcum ductoris inuerti. Super hoc, Medicus digitum indicem dextrae manus in plagam demittit, potius, vt, num satis patefactum sit, quaerat, quam, vt plus patefaciat. Vbi igitur satis patere viam deprehendit, forcipem in vesicam compellit, et calculum promit. Saepius accidit, vt se forcipi inferior plagae angulus opponat. Idque cum a cute esse potest, tum a musculo transuerso et parte leuatoris ani. Nullam difficultatem habet scalpellum falcatum, inter brachia forcipis, demittere et has fibras diducere. Aliae obser-

obseruationes necessariae non sunt, praeter hanc, vt
 lenior aliqua fistula, quae flexilis sit, et carpto, aut
 io molli linteo, obuoluta, vulneri imponatur. Metus
 nim est, cum, quia profunda, tum, quia obliqua, pla-
 a est, qua vesica patet, ne, quod effluit, in vulnere
 aereat, et sordida vlcera faciat, quae in his partibus
 urgare difficillimum est. Vt haec auerti, fistula de-
 issa, possunt, sic quoque sanguis supprimi, si eum ar-
 ria aliqua laesa fundit *.

* De his obseruationibus vide, quae dicta sunt a FVLBERTO
loc. cit. p. 678 seqq.

§. 1385.

Supra (1356. *) de noua quadam curatione dixi-
 mus, quam LE CAT, ante quatuor annos, reperit, et
 quae, quantum ad partem vesicae attinet, quae aperitur,
 roxime a *Fulbertiana* abest *. Non licet eam plenius
 xponere **, contra, ac illam, cuius descriptio nuper
 LE DRAN data fuit, ad quem etiam auctorem refer-
 ir ***. Quilibet videbit, eam curationem, ex *Maria-*
a, Cheseldenianaque veluti compositam esse. Cumque,
 a paucissimis, a *Mariana* differat, qualem supra descri-
 simus, satis habebimus, eam, in quibus vere differt, ex-
 osuisse. Ea vero haec sunt. Primum, abrogato liga-
 urarum vsu, quibus vulgo vtuntur, et quae aegrum
 on leuiter terrere debent, LE DRAN alias excogita-
 it, quae duas ansas habent, quarum vni manus, alteri
 es, immittitur, quae duae partes inter se colligari de-
 bent ****. Deinde Chirurgus ipse bursas colligit, ac
 ninistro, vtraque manu, quam mollissime potest, con-
 inendas dat: simulque eiusdem ministri indices exten-
 lit, sic, vt dexter futurae perinaei, sinister aduerso
 margini ossis ischii sinistri, vsque ad eius tuber, impo-
 natur. LE DRAN nullibi dixit, quali scalpello, ad pri-
 nam plagam faciendam, vtatur. Vtebatur autem, ante
 aliquot annos, rigido, et cuius scapus quoque ex cha-
 lybe

lybe factus *****. Cutis longissima plaga incidenda est, quae ab ea perinaei parte orsa, quae osium pubis ischiique vnionis loco respondet, vsque eo producatur vt finis vnum pollicem cum dimidio, inferior eo loco sit, a quo specillum, quod in itinere vrinae est, intus ad vesicam incuruatur. Vbi hac plaga, qua, quem dicunt, bulbus inciditur, iter vrinae patefactum est, loci ductoris, specillum aliquod rectum, quod, cum ampliore fulco, in auersa extremitate, lingulam habet ***** in catheteris sulcum, coniicitur. Eoque in vesicam compulso, cum in calculum ipsum, tum in eius magnitudinem, aliaque, curiosius inquirendum erit, vt quali forceps demitti debeat, intelligi possit. Post haec rectum illud specillum intus itineri vrinae apprimitur sic, vt sulcus illud spatium respiciat, quod anum et tuber ischii intercedit; Oportet, in hoc sulco, aliud scalpellum intus compellere, quo prostata, cum ostio vesicae findatur. Non anceps scalpellus est, acies vero quae, qua parte longissima est, septem, aut octo, quatuor latissima, sex, lineas aequat, incurua (*en rondache*). Atque, vbi receptus scalpellus est, Medicus, super inuerso specilli fulco, vulgarem ductorem (*Gorgeret*) in vesicam coniicit. Reliqua, vt in *Mariana*, perficiuntur.

* Vid. FVLBERTVS *loc. cit.* Tab. 4. et 5.

** Descriptio curationis, quam LE CAT reperit, in proximo fortassis Commentariorum Academiae Reg. Scient. Paris. habebitur, cum qua ipsam communicauit.

*** Conf. LE DRAN in *Tr. des Operat.* pag. 304 *seqq.*

**** Figuram huius ligaturae dedi in *Obs. Chirurg. de Calcul.* Tab. I. Fig. I.

***** Vide *easdem Obseruat.* Tab. I. Fig. III.

***** Icon *ibidem* est Fig. V. et apud LE DRAN *loc. cit.* p. 272 Fig. I.

† Lecatius in suppellestili magis quam in encheiresi mutauit Mutationes eas hic describere superuacuum foret. Nemo enim hanc rationem ex sola librorum lectione didicerit Quod ne frustra a me dictum esse videatur, rogo, velis ac animum reuocare, quae supra de MORANDO dicta sunt, scilicet eum petiisse Londinum, vt *Chesfeldeni* methodum cognosce-

ret,

ret atque perspiceret, cum in eo genere esset minime imperitus. Interea ab iis, qui animum legendo pascere voluerint, legi poterunt libri ad §. 1389 excitandi.

§. 1386.

Sunt tamen et aliae quaedam observationes necessariae, quae potissimum calculi apprehensionem extraneamque spectant. Cum, inter secandum, urinae effluxerit, quod facit, ut vesica in se coeat, eaque morbum saepius multum adstricta sit, nunquam est, forcipem incautius intus compellere. Nullum periculum habere debet iniicere sic, ut clauus, et brachia forcipis inter se iuncta continentur, usque foram externi vulneris, promoueatur. Vbi calculus in satis tenetur, ut etiam intus effugiat, aperta forcipis utrumque brachium, inuicem, huc illuc, super maiora vesicae parte, moueri oportet. Eoque saepe dicitur, ut, qui effugerat, calculus, adductis brachiis, satis teneatur. Plures animaduersiones ii calculi considerant, qui, quod admodum magni sunt, omnem vicinam implent, aut, qui in aliqua quasi cellula haerent. Suadent LE DRAN, ubi calculus promi debet, forcipem vertere sic, ut ex annulis, quibus tenetur, alios pubis spectet, alter anum. Finita curatione, plerumque illa fistula in vesicam demittitur, si haec ex calculo adstricta est, aut calculus intus mansit, quem promere non licuit, vel, si, in ipsa curatione, sanguis sic effluit, terrere possit. In hoc casu fistula linteolo obuoluentur, cui colophonii pulvis inspergatur.

§. 1387.

Supereſt, ut de illa calculosorum curatione, quam *Celscam*, vel cum paruo apparatu, nominant, aliam ex CELSO proponamus. Homo praeualens acritus in sedili alto confidit, supinumque puerum et transversum, super genua sua, coxis eius collocatis, comprehendit; reductisque eius cruribus, ipsum quoque

D d d

iubet,

iubet, manibus ad suos poplites, vel malleolos dati eos, quam maxime possit, attrahere, simulque ipse se eos continet, vt super humeros eius, suo pectore, incumbat. Huic homini etiamnum a lateribus duo volentes obiiiciuntur, qui circumstantes labare eum, qui puerum continent, non sinunt. Puerum tamen super genua hominis collocari, semper necesse non est, a quoque potest etiam fere commodius certiusque in mentem figurari.

§. 1388.

Medicus deinde, diligenter vnguibus circumcisi sinistrae manus duos digitos, indicem et medium, leniter prius vnctos oleo, simul in anum aegri demittit, dextraeque digitos, super inum abdomen, leniter imponit. Calculus igitur digitis, ano subiectis, quaeritur atque, vbi repertus est, curiose ad ceruicem deducitur. Cum iam super vesicae ceruicem est, iuxta anum incutis, longa plaga, vsque ad ceruicem vesicae, debet et haec deinde alia transuersa aperiri, quo iter vrinis pateat, sic, vt plaga paullo maior, quam calculus, sit. Nam, qui parum patefaciunt, aegrum in certissimo periculum coniiciunt, quod calculus iter, cum vi premitur, facit, nisi accipit. Ex quo, et sanguinis profusio, et distentio neruorum, inflammationesque, fieri possunt.

† Methodus a GÜNZIO ostensa *Celsianae* non prorsus congrua. CELSVS enim cutem plaga lunata incidi iubet, cornu ad coxas spectantibus paulum. Haec verba male intellexit BROMFIELD in *observationibus et casibus chirurgicis* angl. scriptis, et teutonice versis (*Chirurgische Wahrnehmung durch WILLIAM BROMFIELD. Leipzig 1774*). BROMFIELD enim in figura adiecta sectionem lunatam ita facit, vt cornu anum adeoque os sacrum spectent, quae iuxta praeceptum CELSI coxas spectare debent paulum. Vnde intelligi potest sectiones illas duas, quarum altera ab ipso BROMFIELD altera ab eius amico, periclitandi causa, facta est, parum aptas esse ad id, quod volebant, illustrandum. Idem BROMFIELD male vertit vocabulum *coxarum* per tuberositatem ischii. Coxarum regio est ibi, vbi acetabula sunt. vid. en.

CELS

CELSVS ipse in Cap. I. Lib. VIII. in editione a me curata pag. 506. lin. 10 et 22.

§. 1389.

Cum via patefacta est, in conspectum calculus venit. Qui, nisi excidit, laevae manus digitis sic ad vram datis, vt retro recedere, aut aliter effugere, non possit, dextrae index, super calculum, in vesicam conicitur, et ipse protrahitur. Si maior calculus est, inueniendus ei vncus est, inter ferramenta, ad *Marianam* rationem necessaria, propositus. Hunc nunquam ducere tutum est, nisi calculum satis teneri pateat, si hic intus effugiat, is in oram vulneris incidat, neque conuulneret. At, si plures calculi sunt, digitis sinistrae manus, ad vltimam vesicam datis, ad plam deduci ac protrahi debent. Incidere vero potest, digitis conquiri non possint. Ergo specillum, et per hoc forceps, in vesicam conicitur, quo calculi citius promi queant. Aliae varietates huius curationis non sunt.

† His, quae de variis rationibus sub osse pubis calculosos secandi dicta a GÜNZIO sunt, quaedam adiciam. Circa A. 1748 Frater quidam ordinis discalceatorum, cui nomen *Cosmi* est, FRERE COME, scalpellum vagina absconditum, (*Lithotome cachée*) inuenit, eoque vtens ab anno eodem calculosos curauit, tum in prouinciis, tum in vrbe Parisiorum. Scalpellum novum describi testis tamen nomine suo curauit in *Diario Verdunensi* mens. Nouemb. a. 1748. et in *Diario eruditorum*. (*Journal des Sçavans*) mens. Decemb. a. 1748. Ab eo tempore multa de ferramento hoc in vulgus edita sunt, tum ab aliis, tum vero ac praecipue a LECATIO, chirurgo dexterrimo, acri et pertinaci boni fratris aduersario. Is enim non parum multa aduersus eum eiusque methodum dixit. De his legenda sunt, quae Frater COSMVS voluminibus duobus, semper testis nomine, complexus est; quorum prius inscriptum est: *Recueil de pieces importantes sur l' Operation de la Taille, faite par le Lithotome cachée*, à Paris 1751. Huius calci adiecit chartas inscriptas: *Suite du Recueil*. Alterum Volumen inscripsit: *Addition à la Suite du Recueil de toutes les pieces, qui ont été publiées au Sujet du Lithotome cachée*, à Paris 1753. Scripta a LECATIO haec sunt: *Pieces concernant l' operation de la Taille. Second Recueil*, à Rouen 1752.

itemque ibidem tertia collectio (*Troisième Recueil*) 1753 edita. Prima collectio (*Le premier Recueil*) nihil contra Fratrem COSMVM dictum continet, edita est ibid. 1749. Praeterea prodiit *Parallele de la Taille laterale de Mr. LE CAT avec celle du lithotome caché etc. par Cl. NIC. LE CAT, publiée par ALEX. PIERRE NAHUIS. Amsterdam 1766.* Sed Frater COSMVS non solum LECATIVM, sed totum etiam Collegium Illustre Chirurgorum Parisiensem contra se excitavit, vid. *Monument. Ac. R. Chir. Vol. III.* in quo LOUISIVS experimenta de diuersis methodis ab Academia ea capta enarrat. Frater COSMVS non tantum lites eas inter se et chirurgos Parisienses exponit, sed et methodi suae initium, progressum, atque aduersarios ita enarrat, vt nihil praeterea hac de re desideres; Vid. eius Liber §. 1390. cit. Lithotomus autem vagina reconditus vid. et in eodem *Vol. Monum. Ac. R. chir.* et in supra citatis Diariis et in Quaestione medico-chirurgica: *An scalpello vagina recondito cystitome perfectior?* Praeside de PREVAL a MARQVARTO, Parisiis a. 1754 defensa, et adiecta post a COSMO supra cit. *Addition à la Suite du Recueil.* Habet scalpellus is hoc praecipui, vt datus in vesicam ad varios gradus 5. 7. 9. 11. 13. 15. ex vagina sua recedere, et ab ea abductus tam longum vulnus facere possit, quam calculi magnitudo requirere videtur. Vt autem scalpellus impelli in vesicam queat, alio acuto quidem, cutis et cellulositas inde a medio acceleratore iuxta raphen versus tuberositatem ossis ischii inciditur, sitque vulnus pollices duos cum dimidio longum, si homo quidem adultus curatur. Digitus index sinistrae manus explorat catheteris fulcum, quo percepto, is ipse scalpelli mucroni acuto viam monstrat, vt fulcus ille ad septem vel octo lines nudus in conspectum prodeat. In nudum iam fulcum eum inseritur extremi lithotomi lingua, vt, ea semper in sulco promota, lithotomus sub pubis arcum leniter impellatur, quoad ultra nequeat, obstante eminulo catheteris solido rostro: Si eo ventum est, catheter educitur, et lithotomus, pro cognita magnitudine calculi, recte apparatus, vt apparatus vulnus faciat, ad extrahendum calculum satis patens. Rebus omnibus recte adornatis, reducitur lithotomus; atque, dum hoc fit, incidit vesicae cervicem, prostatam et bulbum vrethrae sic, vt via ad vesicam recta et expedita pateat, qua forceps plerumque sine conductore in vesicam dari et calculus apprehendi queat. Tantum de lithotomo recondito. Plura qui scire auet, libros citatos legat.

Iam quaedam etiam de *Hawkinsiana* methodo. HAWKINS autem, dato antea in vesicam cathetere sulcato, integumenta communia sectione a vicinia ani ad tuberositatem ischii sinistri diuidit, fulcum catheteris digito indice sinistrae manus explorat ultra bulbum, quem in anteriorem partem protrudit; deinde partem vrethrae membranaceam et transversum musculi

musculi partem posteriorem oblique incidit, ut fulcus catheteris ibi nudus sit. In eum postea fulci locum demittit rostrum ductoris canaliculati generis singularis, h. e. cuius margo dexter in aciem assurgit; ita autem rostrum demittitur, ut pars ductoris conuexa spectet inferiorem vrethrae partem et intestinum rectum; atque sic paulatim a sulco eo nunquam deflectente rostro, ductor in vesicam demissus incidit vrethram, partem prostaticae maximam et ceruicem vesicae; si in vesicam ventum est, educitur catheter, in caua vero parte ductoris in vesicam datur forceps, postea educitur ductor. Forceps ad vulnus dilatandum aperitur, post rursus clauditur, calculum, quaerit, hoc inuento, iterum aperitur, apprehendit calculum, apprehensum educit. Plura vid. in Thesi *de methodi Hawkinsianae in calculosorum sectione praestantia*, a PETRO FAGUER, Praefide ANTONIO LOUIS, Parisiis 1769 defensa; itemque in Thesibus *de calculo vesicae urinariae, eoque extrahendo, praeuia sectione ope instrumenti Hawkinsiani emendati*, eodem LOUIS Praefide, a PETR. IOSEPH. DESAULT, 1776 defensis.

Praedicatur etiam ratio ea, qua MOREAU, Chirurgus Parisiensis percelebris utitur. Sectionem lateralem facit scalpello ancipiti, cuius acies tres pollices longa, lamina autem in parte a cuspide remotiori vix lineas sex lata, quae ne facile frangatur, in media parte maximam crassitiem habet. Encheireses studiosius quidem exposuit CAROL. LUDOVIC. FRIDERIC. BREYER in Dissert. Praefide GEORG. FRIDER. SIGWARTO, Tubingae 1764 defensa. Inscripta est: *Cystotomia Lateralis Moreauiana Noua Eademque Receptis longe praestantior, quia omnino tutior*. Additae sunt Icones, quibus si careas, carebis perspicuitate, etiamsi, quae BREYER dixit, a me descripta legeris. Caeterum non BREYERVS solus sed alii quoque Inuentoris, MOREAU, magnam dexteritatem secandi calculosos multis laudibus extollunt. De sectione calculosorum praeter illa, de quibus ad §. 1388. retuli, alia multa, paene dixerim diffusa, proposuit BROMFIELD l. c. quae tamen legi ab iis debent, qui hanc artis partem excolunt. Ductorem canaliculatum, duplicem et non parum compositum, cui aliqua lamina acuta addita est, laudat, qui cum figuris describi vix potest, sine figuris ne vix quidem, et cui nihilominus praestare videtur illud, de quo paulo supra, *Hawkinsianum*. PETR. CAMPER l. c. etiam haud contemnenda scripsit, minimeque illa, quae de directione ferramentorum commonuit, ita scilicet ea esse admouenda, ut axis instrumenti semper parallelus sit axi vesicae; ista enim ratione caueri, ne ferramenta tam facile a caua vesicae aberrantia in locum laxum illum, qui vesicam inter et rectum intestinum est, h. e. in cauum spurium incidant. Si forceps plus quam semel in vesicam dari necesse sit, methodum fortasse optimam esse, si chirurgus iuxta apicem digiti indicis laeuae manus specillum demittat, et iuxta hoc machinamenta reliqua.

Vt sectionem lateralem perficeret, multa et in ferramentis et in vinciendo retinendoque aegroti nouauit PALVCCI, atque de cohibenda nouorum calculorum generatione quaedam adiecit in libro inscripto: *Lithotomie nouvellement perfectionnée*. A Vienne 1757.

Ad huius chirurgiae historiam quoque pertinet, quod POUTEAU Filius scripsit in seq. inscriptionis libro: *La Taille au Niveau* etc. A Avignon 1765. Describit noua ferramenta, iisque ad faciendam sectionem utendi methodum. Sed de his et PALVCCI ratione, quia icones inspicere debent dici a nobis nihil potest. Sudante hac ipsa charta sub prelo, in manus incidit scripturionum collectio belgica lingua editorum, h. e. *Aanmerkingen over de Veranderingen, welke de Steenen in de Pisblaas der Menschen ondergaan* etc. door PETRVS CAMPER. Te Amsterdam 1782. Lectu digna inesse video, at neque prorsus legere, neque de lectis referre iam vacat.

§. 1390.

Ab his curationibus, quae sub ossibus pubis fiunt, transeundum ad eam est, in qua summa vesicae pars, in imo abdomine, aperitur. Praecedere hanc curationem ea fere debent, quae *Fulbertianam* praecedere diximus. Si aeger non satis vrinae continere didicit, primum oportet vesicam, in curatione ipsa, aqua, lotioneue alia, tepida implere. Quibus hoc placet, aegrum in mensa, vel, quod praestare debet, in lecto, collocant ante, quam aqua in vesicam coniiciatur, quod optime fit, si fistulae, qua urinam emolimus, siphonis vulgaris accommodatur. In modo autem lotionis, quae immitti debet, aliqua varietas est. Nam, ut immitti debeat, donec se vesica super ossibus, aliquo tumore manifestet, tamen et magnopere cauendum est, ne, quod neruorum distentiones facere solet, vesica, nimia vi aquae subito infusa, distendatur. Non exiguam spem prosperi successus facit vesica sana et spatiosa. Si vitiosa est, praecipueque adstricta, vel alia curandi via eligenda est, vel iubendus aeger, ut, post liberalem potionem, etiam ferratarum aquarum, quam diutissime possit, urinam contineat. Quo, quia asperior vesicae

calculum attritus auertitur, vesica interdum iterum impliatur. Cum iam satis aquae immissum est, necesse est, fistula recepta, colem ministro tenendum dare, tum, vt urinae iter intercludatur, tum, vt, depresso ole, cutis tendatur, quae in imo abdomine incidi debet.

† De hac ratione calculosos curandi recentior scriptor, Anonymus quidem, (sed qui Frater COSMVS, Frere COME, esse librum legentibus haud dubie videtur) et vehementer laudat eam methodum, et ostendit, qua sectio ea fieri possit, etiamsi vesica non impleatur. Liber eius inscriptus est: *Nouvelle methode d'extraire la Pierre hors de la Vessie par dessus le pubis* etc. à Bruxelles 1779. Methodus ea vix ac ne vix quidem potest paucis describi, est enim non parum composita. Cui volupe est, poterit legere dubitanter de ea compendio scripta a RICHTERO in *Biblioth. Chirurg. Vol. V.*

§. 1391.

Dixi, aegrum, siue in mensa, siue in lecto, collocandum esse, praestat vero in lecto. Est autem, tum in lecto, tum in mensa, aliter figurandus, quam in alia curatione quacunque. Coxae elatiores sint, pectore et capite. Si in lecto collocatur, crura, quae supra sponam inferiorem propendent, fulcris alliganda sunt, manus vero ab vtrunque adstantibus ministris firmandae. Neque haec res varietatem aliquam habet, si aeger in mensa collocatus fuit, praeter hanc, quod genua, vinctura quadam, ad fulcimenta mensae, adstringi debent.

§. 1392.

Veniam ad ipsam curationem, quae hoc modo ordinatur. Chirurgus a dextris aegri stat, et, dum alter ex ministris, qui prope stant, manu proxime sub umbilico imposita, cutem sursum tendit, cutem imi abdominis, tam longa plaga recta, incidit, vt ad radicem colis pertinens, quatuor latos digitos impleat. Vtitur Chirurgus vulgari scalpello, eumque indice sinistrae manus sequitur. Deinde, eodem scalpello, linea alba, aliquantum breuiore plaga, incidenda est, ne perito-

naeum aperiatur, donec vesica sese ostendat. Quae indice laeuae manus, in angulo plagae superiore, posito, alio falcato et rigido scalpello, pubem versus aperienda est. Statim ac tantum patefactum est, vnde digitus immitti possit, index eiusdem manus in vesicam coniicitur, quam, ipso quasi in vncum flexo, suspendi oportet, vt ad duorum digitorum latitudinem, commode aperiri possit. Superior angulus huius plagae digitum circiter, infra vrachi exortum, esse debet, inferior alte post ossa pubis descendere. Patefacta vesica, vel digiti, vel forceps, aut etiam vncus, immittitur, et calculus promitur.

§. 1393.

Commodissimum est, statim ac aeger calculo liberatus fuit, vulnus sic obligare. Linteolum molle ac purum iniicitur, quodque multo latius plaga sit. Super hoc tantum lintei carpti ponitur, vt totam plagam impleat. Idque saepius aliquot, sensim maioribus, contegi oportet, abdomini vero mantile circumdari, quod fascia, aliquoties circumducta, firmandum est. Cum sic vulneri prospectum est, aeger in alium lectum collocatur, qui sic paratus sit, vt alibi dixi (1373). Vrina vero, quae profluit, quoniam lintea iniecta humectat, saepius noua imponenda sunt. Ac, interpositis aliquot diebus, ellychnia et plumaceoli quoque superhaberi debent, qui filo firmati sint, et vnguentum exceperint, quod pus mouet. Vulnus, quo vesica patet, multo citius glutinatur, si post certum tempus, fistula breuior, per vrinae iter, in vesicam coniicitur, vt ibi maneat.

§. 1394.

Omnes fere Chirurghi hanc **FRANCONE** repertam, et a **DOUGLASSO** instauratam, curationem, iam inde a sedecim pene annis, neglexerunt. Fuit tamen, ante tres

es annos circiter, a LE CAT quasi restituta. Qui
iam multa, praecipue in ferramentis, mutauit. Ea-
e haec sunt. 1) Scalpellus fortis rigidus, illi simi-
s, quem HEISTERVS * habet, praeter hoc, quod in
orso obtusam eminentiam habet. 2) Ferramentum,
ico non ab simile, ex chalybe totum paratum
(*suspenseur*), 3) duo alia, vncis similia (*Dilatato suspen-
urs*) quorum dorsum, proxime ab incurua parte, quae
ta, paullulum excauata est. 4) Cochlear ex chalybe
ctum, quod in altera extrema parte potest vncum
ferre.

* *In Instit. Chir. Tab. XXX. Fig. 8.*

§. 1395.

Sequitur ipsa curatio, quam LE CAT hoc modo
ordinat: Aeger in lecto collocatur, plane, vt supra
(1391) dictum est, praeter hoc, quod caput, sub-
lecto puluinari, tantillum excitatur. Neque cutis imi
bdominis alia ratione a Chirurgo inciditur, qui ad
egri dextram est. Vbi via ad vesicam satis patet,
scalpellus inuerti debet, et post ossa pubis, in vesicam
digi. Quae, cum vmbilicum versus aperiat, peri-
culosus alias collapsus huius visceris auertitur, qui de-
bet in vulgari curatione contingere, profluente lotio-
ne, quae iniecta fuit. Cum vesica satis patefacta est,
scalpellus protinus sic conuertitur, vt, quae pars in
orso eminet, vesicam sustineat. Tumque scalpello
sinistrae tradito, dextra vncus suspensorii, a latere
scalpelli, in vesicam demittitur, quae, illo recepto,
suspensa tenenda est, et ad plagam externam appri-
menda. Sub hoc ferramento reliqua duo, vnum post
alterum, in vesicam, coniiciuntur, sic, vt vulnus, ve-
fica vtrinq, ad extremam plagam adducta, ampliatur.
Horum ferramentorum sinistrum, ab adstante ministro,
tenendum est, vt Chirurgus dextra possit, vel cochlea-

re, vel forcipe, aut digitis quoque ipsis, in vesicam coniectis, calculum, inter haec ferramenta, protrahere. Quod hanc vim habet, vt vesica, ab asperiore nonnunquam calculo, laedi non possit.

§. 1396.

In quo aegro *LE CAT* prima huius curationis experimenta fecit, eum, cum ante curationem, aduersa admodum valetudine conflictaretur, febris prehendit, in qua *LE CAT*, propter frigus, non audebat venam saepius secare. Quare balneum aliquoties adhibuit, vt aqua per vulnus in vesicam intraret, et plagam elueret. Iussit quoque aegrum in ventrem decumbere, quibus effectum est, vt, lotio naturale iter ingrediente, plaga citius coiret.

§. 1397.

Ab aliquo tempore disputatum fuit, quae, ex his omnibus, optima calculosorum curatio sit; Videtur etiam eorum, a quibus ipsae repertae sunt, is animus fuisse, vt excogitarent aliquam, quae caeteris praestaret. Quod potissimum *CHESELDENI* exemplo clarum est, qui, cum plurimos eorum restitueret, quibus, vesica super pube incisa, calculum exemit, tamen, noua curandi ratione inuenta, illam neglexit. Et hanc, de aliqua optima calculosis medendi ratione, opinionem existimo plures ad mortem deduxisse. Nempe nulla est ex iis curationibus, quas supra proposui, quae non aliquando debeat reliquis praeferi. Quo tamen negare nolo, *Cheseldenianam*, aut, quae lateralis in vniuersum appellatur, plerisque calculosis conuenire. Saepius tamen praestat, eam, in qua vesica, in imo abdomine, aperitur, caeteris anteferri. Quod eorum potissimum exemplo potest clarum reddi, qui eximiae magnitudinis calculo laborant, vel, quibus tam spatiosa vesica est, vt, pauxillo urinae retento,

sa pubis superemineat. De caeteris supra quaedam
opposita sunt (1362).

§. 1398.

Saepius fit, vt calculus, si vrina magnis nixibus
additur, in iter vrinae prolabatur, in quo inhaerescit.
qua re plures varietates sunt. Si aeger recens cal-
losus est, et calculus parvus, in omni parte itineris
rinae haerere potest, saepius tamen non longe ab
itu, vbi amplior fistula vrrinalis est, fossam nauicula-
m nominant, vel in membranea etiam itineris vrinae
arte, cui extus perinaeum respondet. Quibus olim
llculus, per *Marianam* praecipue curationem, exem-
as fuit, cum ceruix vesicae et illa membranea itineris
rinae pars vehementer distenta sit, parui calculi, qui
erum nascuntur, vrina postea promouente, solent in
is potissimum partibus inhaerescere. Quod etiam in
o casu fit, in quo exiguus calculus, vel arenosi ac
ollis quaedam reliquiae, intus manserunt. Sunt et-
m calculi, qui, cum nimis magni sint, prolabi in iter
rinae non possunt, qua parte tamen, ad modum coni,
ngusti sunt, ceruicem vesicae subeunt. Hi calculi
eberent omne iter vrinae intercludere, nisi vtpluri-
um aliquo canali pertusi essent, aut a latere quasi
ncisi, vt lotio aliqua via pateret.

§. 1399.

Haec omnia curationem permultum variant. Par-
us calculus, in quacunque parte itineris vrinae hae-
eat, non protinus ferro res agenda est, sed colis lacte
alido diligenter fouendus, in quo mollientes herbae,
adices ac semina, decocta sint. Possunt quoque panni,
ex eiusmodi lacte expressi, coli ac pubi superhaberi,
et, si calculus, non longe a ceruice vesicae, haeret,
pongia subiici, quae similem decoctionem exceperit.
uat etiam balneum, siue ex aqua fluuiatili, siue ex
ea,

ea, cui mollientes herbae incoctae sint. Lotiones, quae in aluum immittuntur, non raro calculum promouent, idque etiam olea tepida praestant, si ex mollientium genere sunt, et in iter vrinae immittuntur*.

* Commodum erit, hoc loco, aliqua de iis curationibus subiicere, quae inde ab antiquissimis temporibus, calculo itinere vrinae inhaerescenti, adhibitae fuerunt. CELSVS duas curandi rationes proposuit, alteram, vt, calculus specillo oriculario euellatur, alteram, vt cole, a latere inciso, eximatur. Desiderat autem, vt, antequam plaga fiat, cutis extrema attrahatur, quo, vbi calculus protractus fuerit, integra pars cutis plagam contegat. *Lib. VII. Cap. XXVI.* Sequuti sunt CELSVS PAVLVVS *Lib. VI. Cap. LX.* ALBVCA SIS *Lib. II. Cap. LX.* GVIDO DE CAVLIACO *loc. cit.* FRANCO *l. c. p. 116.* GOVRMELENVS *l. c. p. 183.* PAREVS *Lib. XVI. Cap. LX.* DE LEAVSON *l. c. Cap. VII.* HILDANVS *l. c. Cap. XXVI.* GROENEVELTVS *l. c. p. 57.* TOLETVS *l. c. p. 99. seqq.* DIONIS *l. c. p. 234.* SHARPIVS *l. c. Cap. XXII.* LE DRAN *Operat. p. 351. seqq.* ac recentiores pene omnes. Plures tamen ex his specilli oricularii vel vncinuli vsus non commendarunt, nisi, vbi calculus non longe ab exitu, inhaerescit. Si id fieri non potuerit exitum fistulae siue forfice, siue scalpello diduci debere, et calculum promi. Vid. imprimis TVLPIVS *Lib. III. Obs. Cap. VIII.* Figuras variorum specillorum vel vncinulorum dederunt PAREVS *l. c.* HILDANVS *l. c.* MARINI *l. c. Fig. I.* Sunt etiam varietates quaedam in ea curatione, quae cum sectione fit. Maxima ea est, quam THIBALTVS fecit. Is enim iter vrinae a cole separat, quo loco calculus intus haeret, vt ea parte aperiri fistula possit, qua coli subiicitur. Vid. GARENGEOT. *Operat. Tom. II. p. 289.* Neque non in vulneris curatione variant. Cum enim plerique, calculo exempto, nihil in fistulam demittant, alii specillum, ex plumbo aliaue materia paratum, iniiciunt. Sunt et aliae curationes ab auctoribus propositae. ALBVCA SIS *l. c.* terebram proponit, qua in fistulam demissa, calculus perforari ac frangi debeat. Ad hanc terebram tuto demittendam fistulam reperit FRANCO *l. c. p. 114.* vid. etiam PAREVS *l. c. Cap. XXXIX.* et HILDANVS *l. c.* quae curandi ratio hodie nemini probatur. PAREVS *l. c.* experiri ante medicamenta et manum iubet, scilicet, vt oleo amygdalarum dulcium e. g. infuso, calculus digitis ad exitum propellatur, idque a recentioribus quoque multis propositum est. Quia vero calculus, nisi grauitur laesa fistula, expelli hac ratione saepe non potest, plures Medici non sine causa existimarunt, modo dilatetur fistula, eam curationem succedere debere. Operosius hoc Aegyptii recentiores et Arabes fecerunt, de qua

qua re expositum est apud ALPINVM in *Lib. de Medic. Aegypt. Lib. III. Cap. XIII.* qui refert, voluisse ipsos ex vesica etiam, flatu immisso, calculos protrahere. Qui hoc ex nostris Medicis et Chirurgis imitati sunt, inter quos est HILDANVS *l. c. p. 187.* VAN HORNE *Microtechn. p. 457.* PURMANNVS in *Chirurg. Part. II. Cap. 14.* calculo siue ligatura siue compressione firmato, ne recedere posset, per fistulam aliquam, flatum lente in iter vrinae immiserunt, idque, ne exire aer posset, caute constrinxerunt. Cum satis dilatatum erat, calculum sensim versus exitum propellebant. Commodum esse videtur, antequam infletur fistula, oleum tepidum immittere. Vbi prope exitum inhaerescit, FRANCONI aliisque visum est, posse fugendo extrahi, quod tamen reiectum fuit ab HILDANO *l. c.* SOLINGENIVS, vt dilataret fistulam, turundas, ex charta pergamena confectas, adhibuit sensim maiores, ne nimius dolor moueretur *l. c.*

† Noui equidem foeminam quandam, quae filio suo quinquenni hoc genus auxilii, quod fugendo fit, non haesitante adhibuit, atque, cum ego mirarer, alio tempore iterum si opus quidem fuerit, se adhibituram esse pleno cum risu significauit.

§. 1400.

Alia medendi ratio est, si calculus, non longe ab exitu, inhaerescit. Sunt, qui exiguam forcipem immittunt, et calculum extrahere tentant, quod magnos dolores mouere debet. Quare praestat, antequam forceps in iter vrinae compellatur, oleum tepidum immittere, et, dum extrahitur, eodem post calculum constringere, ne recedere possit; Aliquando et illos qui licet, qui flatu immisso ampliare iter vrinae iuent, et tunc extrahere. Quae si nihil proficiunt, optimum est, ostium fistulae vrinalis sectione tantillum inducere, et calculum, specillo aliquo demisso, eiicere.

§. 1401.

Qui calculi in his partibus subsistunt, quia, cum vrina, recens ad has partes promoti sunt, iter vrinae plurimum parum laedunt. Contra cum iis est, qui inter bulbum ac ceruicem vesicae haerent. Saepius enim

enim incidere solet, vt arenulae, quae cum vrina promouentur, siue nimis angustus ille locus sit, siue nimis amplus, qualis in iis est, quibus olim calculus, per iter vrinae, exfectus fuit, in membranea eius parte haereant. Nihil attinet dicere, debere eas quotidie noua incrementa capere, quod efficit, vt, dum iter vrinae dilatatur, perinaeum intumescat; Calculus vero, qui sibi hoc modo viam parat, vlcus simul facit, quod se vtplurimum in plures sinus diducit, et in fistulam degenerat.

§. 1402.

Contra hunc morbum, a solo ferro, praesidium petendum est. Est autem eadem curatio necessaria, ac, quae *Celsica* nominata fuit. Tamen non oportet digitos in anum demittere, et antrorsum ad calculum dare. Prima plaga, quae longior esse debet, cutis tantum inciditur, altera ipsum iter vrinae. In eaque cauendum est, ne, inciso, super aliqua eminentia, itinere, qua cauum subest, relinquatur, quod, dum calculus promitur, vi adhibita, ruini necesse sit. Quare praestat, itinere vrinae aliquantum patefacto, specillum immittere, et super hoc tantum aperire, vt calculus possit, leui pressione, eximi. Interdum etiam sponte excidit. Vbi calculus protractus fuit, praecipue fistulae ratio habenda est. Ad eamque curandam necesse est, quidquid induruit, per ea, quae pus mouent, tollere, de qua re alibi dictum est.

§. 1403.

Neque alia ratione curandi illi calculi sunt, qui, cum parui erant, magnam partem in ceruicem vesicae prolapsi sunt, et in hac, a continuo profluente vrina, multum increuerunt. Oportet tamen totam ceruicem, ac vesicam ipsam a latere aperire, quo promi talis calculus, sine grauiore vesicae laesione, possit. Possent
tales

es calculi incuneati appellari, magis tamen illi, qui
 uici ad conii modum inhaerent; Atque hi alia quo-
 e ratione curantur. Si recens malum est, tentare
 et, an calculus, per fistulam demissam, repelli queat.
 epius vero non potest. Tumque a *Franconiana*
 ratione praesidium petendum est. Vbi euulsus fuit,
 am ceruicem vesicae negligere haud licet. Quae
 m a calculo induruerit, adhibenda sunt, quae molli-
 t, ac pus mouent.

§. 1404.

Supereſt, vt de ea curatione dicam, quae calculo
 hiberi debet, qui, cum breui ante, ad medium vrinae
 er descenderit, iis, quae supra (1398) proposita
 nt, eiici non potuit. Medium vrinae iter appello,
 od extus a bulbo, vsque ad frenulum pertinet.
 ante omnia cutis colis, quantum maxime potest, at-
 hitur, atque condita glande, lino vincitur, vel, si
 c non licet, glande nudata, fasciola post calculum
 icitur, quae cutem retractam firmet. Tum colis
 istras manus digitis continetur, sic, vt citra calculum
 m pollex, vltra index sic, et cute ad latus ducta, iter
 inae, qua parte coli subiectum est, a latere, recta
 aga, super calculo, inciditur. Isque vel sponte ex-
 dit, vel paruo aliquo vnco eximitur. Vbi exemptus
 s, integra pars cutis remittitur, quae, quia plagam
 ontegit, glutinationem vulneris multum accelerat.
 bligandum vero est plumaceolo, ac fasciâ, quae com-
 in orbem ambit. Tumque raro opus est fistulam,
 plumbo paratam, in vrinae iter conicere, ne lotium
 er vulnus profluat.

† Calculi vrinae non modo in naturalibus illis vrinae itineri-
 bus, sed aliquando etiam extra vias eas formantur, reperi-
 unturque. Qua de re in *Monum. Ac. R. Chir.* Vol. III. pag.
 332. seqq. LOVISIVS lectu digna scripsit.

§. 1405.

§. 1405.

Feminis etiam, sed rarius, calculus cum in renibus, tum in vesica concrefcit. Nam renum fistulae, per quas vrina destillat, ampliores, quam in viris sunt. Neque feminarum corpora tanto vt plurimum motu exercentur, vt magna vis terrearum particularum, a corpore detrita, ad renes cum sanguine promoueri possit. Raro quoque euenit, vt calculus, qui ex renibus in vesicam descendit, ad insignem aliquam magnitudinem perueniat, quod videtur ab itineris vrinae amplitudine ac breuitate prouenire. Efficiunt enim, vt parui calculi facile cum vrina promoueantur.

§. 1406.

Quae efficiunt, vt calculus raro ad aliquam magnitudinem in feminis excrescat, per ea etiam fit, vt saepius sine sectione promi possit. Olim multi fuerunt, quibus haec curandi ratio placebat *, videtur tamen praecipue a LE DRAN ita proposita esse, vt calculus, cum maiori securitate, protrahi posset. Curatio autem haec est. Femina resupina super mensam, aut lectum collocanda est, diductisque cruribus, et calcibus ad nates datis, a duobus ministris continenda. Medicus deinde, partibus naturalibus diductis, ostium itineris vrinae quaerit, per quod fistula, quali in feminis vrinam emolitur, et quam sulcatam esse oportet, in vesicam coniicienda est. Super hac fistula ductor canaliculatus (*Gorgeret*) in vesicam compellitur, quod iam incipit iter vrinae dilatari **. Tum fistula recepta, forceps immitti debet, quali ad calculum, in tenellis pueris, protrahendum, utimur. Haec duo ferramenta paullulum diduci oportet, vt iter vrinae ampliatur. Haec sufficere possunt, si calculus parvus est. Si maior, quam vt sine metu ruptionis ceruicis vesicae educi possit, prima forcipe recepta, necesse est, aliam

un maiorem iniicere, imo, si iter vrinae parum ce-
 , plures sensim maiores, donec et via satis aperta,
 forceps in vesica sit, qua calculus commode promi-
 ssit. Si plures calculi sunt, singuli eodem modo
 strahendi sunt.

Placet hic aliqua de variis calculi curationibus subiicere,
 quae feminis adhibentur. CELSVS voluit, si calculus in
 itinere vrinae inhaereat, vncō educendum, si maior, ad
 scalpellum deueniendum esse sic, vt vesica alio loco aperi-
 atur, si aegra virgo sit, alia, si mulier. Mulieri enim, di-
 gitis per naturalia subiectis, inter vrinae iter et os pubis,
 super calculo, incidendum esse, virgini sub ima sinisteriore
 ora, digitis, tamquam masculo, in anum demissis. Vtroque
 tamen loco plagam faciendam esse, quae transuersa sit.
In Lib. VII. Cap. XXVI. Sequitur CELSVI ALBVCAſIS in
 hoc, quod digitos demittendi rationem attinet. Quod
 vero locum attinet, de virgine non dicit, vbi incidendum
 sit, contra in muliere iubet calculum, ad radicem coxae,
 deducere, ac super eo incidere. Addit etiam animaduersiones
 quasdam de sanguinis profusione, quam in tam pro-
 fundo vulnere magnam esse oportet. *In Lib. II. Cap. LXI.*
 Vix tribus verbis hanc curationem attingit GVIDO DE
 CAVLIACO *loc. cit.* PETRVS FRANCO eandem proponit sic,
 vt digitorum quidem, prout mulier vel virgo est, modo
 per anum, modo per naturalia subiiciendorum, aliquam
 varietatem esse ponat, nullam vero loci, qui extus incidi
 debet *loc. cit. Cap. XXXIV.* Ad haec monet, cauendum
 esse, ne vteri vagina incidatur; Hanc curationem recen-
 tiores Chirurghi solis virginibus adhibendam esse dixerunt,
 nominaruntque cum paruo apparatu. Videtur eam SHAR-
 PIVS commendare, si calculus insignis magnitudinis sit, *l. c.*
Cap. XXIII. Aliam curationem mulieribus conuenire di-
 cunt, quam cum magno apparatu vocant. Fit autem, si
 calculus paruus est, sine scalpello, si magnus, iter vrinae
 sectione ampliandum est. Oportet illam curandi rationem
 iam FRANCONIS aetate cognitam fuisse, qui eam reiiicit *l. c.*
 Neque vero fuit ab omnibus eodem modo adhibita. HIL-
 DANVS iubet primo specillum parum incuruum, et fulco
 instructum, in iter vrinae coniicere, super hoc autem ducto-
 rem, eoque medio forcipem. Vult tamen, vt calculus eo
 certius prehendi possit, duos sinistrae manus digitos in va-
 ginam demitti debere, et ad vesicam dari. *In Lib. de Li-
 shot. Ves. Cap. XXII.* Ab eaque curatione parum ea differt,
 quam TOLETVS descripsit, et cum paruo apparatu nomi-
 nauit, quem scilicet putauit inde nomen habere, quod di-
 giti vesicae subiiciuntur, et calculus vncō educitur *loc. cit.*

Cap. XVII. Vid. etiam MARINI loc. cit. Cap. XII. p. 203. Curatio vero cum magno apparatu TOLETO haec est. Super specillo ductores demittuntur, et inter hos, ubi diducti fuerunt, et iter urinae ampliatum, forceps in vesicam coniicitur, qua calculus, ut in maribus, promitur. Hanc curationem propositam inuenio a THEVENINO *l. c. Cap. XLIX. GROENEVELTO l. c. p. 53. seq. DE LAVNAY l. c. Cap. X. p. 128. seq. SAVIARD Obs. de Chir. LXXII. DIONIS l. c. p. 236. ALGHISI l. c. Cap. XXIII. p. 89. seq. GARENGEOT Tr. des Operat. Tom. II. p. 83.* Plerique ex his auctoribus suadent, si calculus maior sit, quam ut videatur, sine rupture cervicis, euelli posse, vel ipsum in vesica-frangere vel iter urinae tantillum incidere. Hanc plagam iam olim PAREVS faciendam esse duxit, si ipsum recte capio *l. c. Lib. XVI. Cap. XLVII.* nam obscura praecipue ea sunt, quae de COLOTIS habet. Neque clariora sunt, quae apud DILEAVSON de calculo feminarum inuenio *loc. cit. Part. II. Cap. XII.* Alia curatio est, quae feminis adhibetur, e quae deberet lateralis nominari. Eam propositam esse inuenio a MARIANO, etsi ipse non videtur exercuisse *loc. cit. Cap. XXII.* Eadein forte fuerit, quam tribus tantum vel bis proposuit GOVRMELENVS *l. c. p. 182. seq.* Vere eam exercuit FRATER IACOBVS, quod per plura a MERYO et NOELLO proposita exempla clarum est. Vid. MERY *l. c.* et post hunc RAVIVS, qui tamen virginibus tantum conuenire existimauit. Vid. HERTIVS *l. c. p. 50* MERYVS autem, hac curatione reiecta, aliam excogitauit, quae si ordinatur. Specillum sulcatum in vesicam compellitur, se aliquanto magis incuruum, quam quo vulgo vtuntur. Hoc ceruix vesicae in vaginam deprimitur, ut simul cum haec incidere possit, *loc. cit. Cap. IV. p. 30* Huius curationis utilitatem probare videntur earum mulierum exempla, quibus calculus in fistulam delapsus, vagina intus incisa, extractus fuit sic, ut etiam lotium continere possent. Denique hoc addendum est, HILDANVM aliquando mulierem, qui calculo laborabat, vesica in imo abdomine aperta curasse. Vid. *Obs. Chir. Cent. I. Obs. LXVIII.* Eademque curatio si calculus magnus sit, a IOANNE DOUGLASSO propositum *loc. cit. Sect. X.* Neque dubitare licet, debere ruti quam in maribus, adhiberi posse, quoniam vesica feminarum et spatiosior est, et altius posita.

** Videtur nullam controuersiam recipere debere, fatius esse ut calculus promi possit, iter urinae ampliare, quam sectione aperire. Nemo enim ignorat, quam facile partem nostri corporis, ubi vehementer extentae fuerunt, sese reconstituant. Neque fieri potest, ut itinere urinae patefactus calculus, qui non admodum parvus est, euellatur, quam iter urinae etiam dilatetur. Habentur quoque multa ex

pla calculorum, qui, cum tam magni essent, ut itinere vrinae, etiam per sectionem, ampliato, non viderentur, nisi rupta ceruice, educi potuisse, tamen vel sponte sibi viam fecerunt, vel, sensim ampliata vrinae via, producti fuerunt sic, ut vrina pro voluntate reddi ac contineri posset. Vid. Cl. HEISTERVS *loc. cit. pag. 1029. seqq.* Est tamen magna cura adhibenda, ut iter vrinae lente amplietur. IOANNES DOUGLASSVS vult, si calculus parvus sit, turundas, quae ex spongia praeparata, vel ex radice gentianae factae sint, in vrinae iter demittendas esse sic, ut sensim maiores immittantur, donec tantum haec via pateat, ut forceps per eam immitti queat, et calculus protrahi. Crediderim in ea curatione, quae a LE DRAN proposita fuit, satius futurum esse, ut sensim maiores forcipes, sic ductores quoque maiores immittere, atque ab illo incipere, quem LE DRAN reperit, ad paruum illum scalpellum, ad prostatam, demittendum, quo in ea calculosorum curatione utitur, quam supra exposui (1385).

† Ad ampliandam vrethram feminae calculo affectae BROM-FIELDIVS aliquando feliciter vsus est processu vermiformi intestini coeci animalis parui. Eum per vrethram in vesicam ita dedit, ut caput coecum in vesica esset, patens vero pars foras spectaret. Tum per siphonem paruum iniecit aquae tantum, quantum intestinulum caperet, filoque constrinxit clausitque hanc partem. Et hanc ipsam postea semel vel bis torisit, ut aqua ex ea premeretur in partem, quae in vesica erat, atque adeo ea ampliaretur; itaque nunc exteriorem partem paulo magis foras retraxit. Idein facere deinde iussit adstantem foeminam. Ita paulatim ampliata vrethra calculum reddidit sponte. Vid. l. c.

§. 1407.

Calculo euulso, nisi aegra aliquo morbo tenetur, nil attinet, eam multis medicamentis vexare; tamen licet eam esse, et genua inter se colligata habere, penum non est, ut spatium detur itineri vrinae, quo possit iterum ad priorem angustiam redire. Quod si factus est, ut id satis cito fiat, sequi LE DRAN consistit oportet, et vaginam intus multa aqua calida fouere, cui aliquot herbae et radices ex adstringentibus insertae sunt. Videtur etiam commodum esse, spongiam per naturalia subiicere, quae ex eiusmodi lotionibus, et aceti paululum accedere potest, expressa sit.

§. 1408.

Cum vero eo peruentum est, vt res scalpello agenda sit, haec curatio necessaria est. Feminae non alio modo, quam quo mares in calculi curatione figurantur, super mensam collocandae sunt. Neque super vacuum est, manus et crura aegrae inter se deligare, et a lateribus duos valentes oblicere, qui ipsam continent. Tumque ductor (*Gorgeret*) in viam vrinae coniiciendus est, qui ante, quam in lingulam terminatur, quasi specillum affixum habet, quod longitudine latum pollicem aequat, et sulco, profunde excisso, instructum est. Ab initio ductor, non vltra hoc specillum, in vrinae iter demittitur. Eoque ita conuerso vt sulcus semen sinistrum respiciat, scalpellus eodem modo, quo id dictum est, a LE DRAN fieri (1385) impellendus est, et vrinae iter, plaga a latere facta patefaciendum. Cum via patefacta est, et scalpellus receptus, digitus dextrae manus index sulco ductori inponitur, quo iter vrinae lente aperiatur. Tumque via sic patet, vt cum forceps apta facile immitti possit, tum calculus educi.

* Fuit haec curandi ratio a Cl. LE CAT reperta, qui me eam per literas docuit, ac simul ferramenta misit, quibus perficitur. Scalpellus in multis illi similis est, quem cystitecum vocat, et in ea curatione adhibet, in qua in maribus ceruicem vesicae aperit. *Vid. Obseruat. nostrae de Calculo Cur. Tab. II. Fig. I.* et DIONIS *l. r. Tab. II. K.* Differetamen in his. Totus scalpellus rectus est, et aciem habet quae, longitudine duos circiter latos digitos aequat, vltra latissima est, 8 vel 9. lineas implet. Apex acutissimus est et a latere sulcus in longum ductus, qui quam vtilitatem habere debeat, non indicauit.

† De ferramentis ad sectionem feminarum calculosarum idoneis vid. ERNESTI PLATNERI, IOH. ZACH. Filii, Prohissio Lipsiae 1770.

§. 1409.

Non multum dissimilis est ea curatio, quam LE DRAN feminis adhibet, si calculus maior est, quam vt possit

offit, per ampliata[m] vrinae viam, educi. Cum enim
 pecillum fulcatum in vesicam coniectum est, et fulcus
 ad coxam sinistram conuersus, paruus ille scalpellus,
 cui supra (1385) descriptus est, super fulco demitti-
 tur sic, vt iter vrinae, vsque ad ceruicem vesicae, in-
 datur. In qua plaga tamen facienda monet, digitum
 per naturalia subiiciendum esse, ne vagina laedatur.
 Medicus deinde, vbi scalpellus receptus est, ductorem,
 super hoc digitum, forcipemque demittit, et cal-
 culum promit.

* LE DRAN, quo loco hanc curationem exponit, peculiarem
 quoque plagae factae medendi modum proponit. Ait enim
 cellulolum habitum, qui vesicam ambit, facile inflammatio-
 nem concipere. Fistulam igitur plenior[m] demittendam
 esse, donec inflammatio ad suppurationem spectet. Tum
 enim turundam imponi debere, et cum hac vnguentum,
 quod pius mouendi virtutem habeat. Turundae quoque
 tenuiorem fistulam immitti posse, ne vrinae fluxum suppri-
 mat. *Vid. LE DRAN Tr. des Operat. p. 335.* Subiecta ibi
 observatio est, quae LE DRAN mouit, vt hanc medendi
 rationem excogitaret. Ipsam enim tentasse non videtur.

† Vrinae iter plerumque non totum, sed duas tertias eius
 tantum incidendas esse et alii et BROMFIELD l. c. docent;
 nam post facile ita reliquam posse partem ampliari, vt cal-
 culus, maior quoque, egredi possit.

§. 1410.

Ante dictum est, aliquos voluisse, si magnus calcu-
 lus sit, vesicam, super osse pubis, aperiendam esse.
 De qua curatione, in feminis quoque simili, proprie-
 tas vnum videtur dicendum esse, vbi lotio idonea in
 vesicam immissa fuit, ac fistula recepta, aliquem ex
 sinistris duos digitos per naturalia subiicere debere,
 quibus itinere vrinae compresso, lotioni exitum prae-
 stat. Posset etiam pessus supponi, ex subere para-
 tus, et cera obductus. Haec tamen efficiunt, vt in
 his, quae virum nondum passae sunt, hanc curationem
 adhibere non liceat. In his ergo videtur vtile futu-
 rum esse, fistulam, quae illi quam LE CAT reperit,

similis sit *, per iter vrinae, in vesicam coniicere, et incuruam partem, in qua sulcus in longum ductus est, intus aduersae vesicae parti apprimere, quae hoc modo, etiam vacuata vrina, tuto incidi posset.

* Vid. in *Medic. Essays Vol. V. Tab. VI. Fig. 4.*

† Feminae quae ter pepererat, ex vesica per vaginam incisa eductus est calculus quatuor fere uncularum pondo. Vulnus sic satis facile sanatum. Vid. *Nou. Act. Acad. N. Cur. Vol. I. pag. 18. seqq.*

DE PARTV SECVNDVM NATVRAM ET DE EMBRYVLICIA.

§. 1411.

A Chirurgo saepe auxilium requirunt parturientes, quibus, si opem ferre vult, necesse est, vt habeat notitiam muliebrium, vteri, qualis est in omnibus feminis, maxime autem in grauidis, parturientibus, puerperis. Nosse debet huius ligamenta, eius os, quod internum, vel os tinae, vocant, et huius, quae in vterum gerentibus parturientibusque vario tempore incidunt, mutationes conuersionesque. Ossa etiam, ex quibus peluis componitur, et quae a virorum ossibus differunt, consideranda sunt, et noscenda etiam, quae ad foetum pertinent, secundae, vmbilicus, et, quas hic habet, arterias, venamque, placenta, vementa, et humor, qui his continetur. Omnium harum, aliarumque, rerum notitia se instruere potest, cui frequens occasio est grauidarum parturientiumque et puerperarum corpora post obitum incidendi.

† Ars obstetricia post tempora PLATNERI nostri tanta incrementa cepit, quanta maxima. Quae cum compendio comprehendere nequeant, nihil capiti huic addo aliud, quam librorum de ea scriptorum et memoria nostra editorum, non omnium quidem, sed praecipuorum, enumerationem succinctam. Laude digniores sunt:

1) IOH. GFORG. ROEDERERI *Elementa Artis obstetriciae.*
Edit. III. cura WRISBERGII. Göttingae 1766. in suo.

2) IOSEPH.

2) IOSEPH. IACOB. PLENCK Anfangsgründe der Geburtshülfe. Wien 1768. cum Fig. Latine versa et aucta ab auctore sup. anno.

3) WILLIAM SMELLIE, a Treatise on the Theorie and Practice of Midwifery, T. I. II. III. in 8uo.

a) Idem Liber gallice versus a PREVILIE et inscriptus: *Traité de la Theorie et Pratique des accouchemens*, à Paris. Par PREVILIE. T. I. 1754. T. II. 1756. T. III. 1763.

b) Idem Liber teutonice versus a KOENIGSDOERFERO prodiit Altenburgi 1755.

4) L'Art des Accouchemens, démontré par des Principes de Physique et de Mecanique. Par ANDRE LEVRET, à Paris 1761. in 8uo. cum Fig.

Idem Liber teutonice versus.

5) *Traité des Accouchemens en Faveur des Eleves*. Par DELEURYE F. A. à Paris 1770 in 8uo.

Idem Liber teutonice versus et inscriptus: Herrn DELEURYE Abhandlung über die Geburten etc. übersetzt von IOH. GOTTFRIED FLEMMING, Breslau 1778. Reliquis praeferri inre potest meritoque.

6) GEORGE WILHELM STEIN Theoretische Anleitung zur Geburtshülfe. Cassel 1770. in 8uo.

7) Eiusdem STEINI Anleitung zur Geburtshülfe, Cassel 1772, in 8uo. cum Fig.

8) L'Art des Accouchemens par M. BAUDELOCQUE, à Paris 1781. in 8uo. cum Fig. Tom. I. II.

Idem laude dignissimus liber in vernaculam nostram versus et inscriptus: BAUDELOQUES *Anleitung zur Entbindungskunst, mit vielen verbesserten Kupfern, und mit Anmerkungen versehen, und herausgegeben von PHILIPP FRIEDERICH MECKEL*. Lipsiae 1782.

9) IOH. STEIDELE *Abhandlung von dem unvermeidlichen Gebrauche der Instrumente in der Geburtshülfe*, Wien 1774. 8uo. cum Fig.

Liber is mole parvus, at grauis materie et Chirurgis, medicinam obstetriciam facientibus utilis est admodum,

10) Non chirurgis quidem sed mulieribus obstetricibus tamen dicatus, minimeque improbandus est, quem IOH. GOTTFR. FLEMMING, Lipsiae 1778. edidit et inscripsit: *Unterricht für angehende Hebammen*.

§. 1412.

Sed, quamuis haec omnia scientia comprehenderit chirurgus, vix opitulari poterit feminis, nisi vsu etiā exercitus sit. Oportet igitur eum prius adesse partu-
tientibus, quae facili naturalique partu prolem edunt,

et tandem etiam aliis, quibus, seu viuus, seu mortuus, infans manu atque ferramentis excutiendus est.

§. 1413.

Grauiditatis plures notae sunt, quas omnes conferri oportet, cum singulae fallaces sint, et decipere possint. Nam et in his fere nihil perpetuum est. Femina itaque partum aluo continet, cui catamenia non respondent, mammae turgent, et glandulae in areolis mammarum, quas sebaceas vocant, magis inflantur, cui solitus cibus fastidium creat, vomitumque movet, quae insueta appetit, atque in ea insuperabili desiderio, quod picam appellant, fertur. Grauidae etiam frequentius dentium dolore fatigantur. Tertio circiter mense inflatur venter, qui, durior, digito magis renititur, prominente aliquantum umbilico. Hoc vero minus in primiparis, magis in aliis, quae saepius pepererunt,prehenditur. Tandem, quarto, quintoque, circiter mense, percipitur, tum a matre in ipso vtero, tum, si extrinsecus manus ventri imponitur, motio viui, et quasi gesticulantis, infantis. Haec foetus agitatio ab aliis motibus discernenda est, qui a spiritu, ad inferiora deuoluto, et intestinum inflante, nec non a spasmis, quibus intestina interdum quasi vertuntur, proficiuntur.

§. 1414.

Certiolem vero notam habere potest obstetrix, si illa digitos, indicem mediumque, oleo illitos, in pudenda mulieris demittit, et os vteri internum attrectatu explorat. Hoc enim, quod vterum non gerentibus pudendis obuersum, tangenti digito, prominentiori ora vel quasi corona cinctum constrictumque, obuium est, intumefcente vtero, inferiora anumque versus inclinatur, vt etiam vltimis mensibus, difficilius digito explorari queat. Illud vero istis temporibus paulatim

am-

mpliatur, prominentior eius ora depressior fit, tan-
emque et haec et ille sinus quasi complanantur. Cui
bstetriciam artem exercere animus est, eum oportet
haec discrimina, quae variis, tum gestationis, tum par-
us, temporibus in hoc interno vteri ore incidunt, in
luribus feminis, studiosius indagare.

§. 1415.

Grauidis nihil nocentius est, quam, si vario genere
medicamentorum abutuntur, et in secunda valetudine,
duersae praesidia consumunt. Caueant sibi, ne vehe-
mentioribus, corporis, exercitationibus, cuius insuetae
ant, animique repentinis commotionibus, partum
condum maturum elidant. Hoc etiam fieri potest, si,
horacibus, aliisque adstrictioribus vestibus, amictae,
entrem comprimunt, vel eum, proiectiorem, altius-
ulis calceamentis vsae, rectorum musculorum inten-
tione vrgent. Vltimis mensibus plus esse conuenit,
nde vero ingens male interpretantibus natus est
error, grauidam se nullis obligare debere legibus, sed
omni ciborum genere, etiam valentissimo, vti posse.
Ex cibo enim, qui in stomacho non concoquitur, cru-
ditas, et ex hac plures, et feminae, et partui, pernicio-
ssimi morbi nascuntur. Confert, saepius cibum, sed
exiguum aliquid, assumere, et dilutius bibere, corpus
vero, citra defatigationem, pro eius natura, et pro ipsa
consuetudine, diligenter exercere. Quibus sanguis
abundat, et quibus eum mittendi iam consuetudo facta
est, iis, vicesima circiter hebdomade, et iterum expletis
mensibus, mox ante partum, aliquid eius detrahi pot-
est. Aestimandae vero sunt vires, vt, post sanguinis
detractionem, supersit, quo, in vna muliere, duo cor-
pora simul sustineri queant. Optime etiam grauidis
succurritur, praecipue iis, quae, pleniori cibo vsae, cor-
poris exercitationem negligunt, si illis saepius, inter-

posito tamen tempore, aluus ducitur, et noxia materia in inferiora depellitur. Substante tamen cruditate, hoc alienum est, quae abstinentia et modico victu tollitur. Intus medicamenta lenia danda sunt, inter quae, rheum caeteris omnibus praeferendum esse, usus docuit. Nec, ubi aluus non respondet, alienae sunt lationes, quae in illam immittuntur, modo nec acres sint, nec nimis calidae. Plures se vltimis diebus in calidam demittunt, balneoque vtuntur, vt iis muliebria relaxentur, quae utilis esse potest iis, quae adstricto corpore sunt, et quibus primus partus instat, non aequae aliis, in quibus id magis superuacuum, quam necessarium, est.

§. 1416.

Sunt, qui negant, infantem in vtero secundum naturam certa ratione collocatum esse *, id quod primis mensibus a vero propius videtur. Sed tamen, plerumque vltimis mensibus, infans ita compositus est, vt quasi erecto corpore sedeat, et faciem abdominis musculis grauidae obuersam habeat **. Vltimis diebus inclinatur caput, ad os vteri descendit, idque vrget. Hoc dum incidit, in imo ventre; etiam extrinsecus mutatio percipitur, quippe qui altius descendit, et in iis, quae numerosum partum ediderunt, propendet. Hic infantis positus, si naturalis non est, est tamen frequentissimus. Explicandae etiam sunt notae, quae ostendunt, partum instare, de quibus illud, quod de grauiditatis signis retulimus, repetendum est. Femina, vt modo diximus, plerumque, ventrem deorsum versus deuolui, sentit, illi crebra vriqae cupiditas est, quae aliquando vix, et non sine difficultate, redditur. Ex naturalibus fertur humor mucosus, cui interdum sanguinolenta admixta sunt. Tandem in lumbis dolor exoritur, qui per intervalla increscit. Sub finem illi dolores ad femora pedesque descendunt, qui etiam,

bi illi magis intenduntur, contremiscunt. Differt
 gitur hic dolor a ventris torminibus, et intestini coli
 morbo, in quibus dolor vagus est, vehemensque, non
 er intervalla se remittit, nec ad inferiora tendit, et,
 aepe admotis, calidis fomentis, et deuoluto ad inferiora
 ventris sonitu, discutitur. Certissimum vero indicium
 est, si, inserto in muliebria vnctae manus digito, cir-
 umcisisque vnguibus, obstetrix cognoscit, vrgentibus
 illis doloribus, os vteri adaperiri, et in illo tunicam,
 humore distentam, digito obniti. Huius velamenti
 equalis rotundusque tumor plerumque, caput proxi-
 mum, atque naturalem partum futurum esse, significat.

* Vid. LA MOTTE *Traité des Accouchem. L. I. Cap. XXI. p. 119.*

** MAURICEAU *L. II. Cap. III. p. 215. r. fig.*

§. 1417.

Vbi tandem os vteri satis adaperitum est, oportet,
 mulierem recte, et, vel in sedili ad id aptato, vel resu-
 pinam, transuerso lecto, sic collocari, vt eius femini-
 bus illia comprimantur. A lateribus aliae feminae de-
 bent assistere, quae parturientis femora inter se didu-
 cunt, et, si illa in lectulo supina iacet, cum pedibus
 continent. Quae in sedili pariunt, illarum pedes sub-
 lectis fulcimentis innituntur, et ob id valentioribus ni-
 xibus partum iuuare possunt. Num femina in sedili;
 num in lectulo, collocanda sit, saepe disputari solet.
 Si, nec foetus, nec vterus, aliter, quam naturaliter esse
 solent, compositus est, fere magis opportunum videtur
 sedile, in quo mulier illa fultura sustinetur, vt, collectis
 magis viribus, partum elidere possit. In aliis casibus
 praeferri lectulus debet, de quibus infra dicam. Nihil
 vero magis alienum ac pestiferum est, quam, si ab ob-
 stetricibus femina compellitur, vt laboriosis nixibus
 partum festinet, antequam os vteri satis patet, et ante-
 quam certo constat, infantem recte compositum esse.
 His enim intempestiuis laboribus franguntur vires, et
 non

non raro, si infans transuersus est, et aliter compositus, brachium, aliaeque partes, per os vteri altius descendunt, vt post illa membra nec possint replicari, nec infans queat dirigi, nec facile manibus extrahi. Sub illis nixibus os vteri magis adaperitur, quod oleo, aliove blando pingui perfundendum est, vt partus facilius exire possit.

§. 1418.

Dum vero sic dolores magis et magis intenduntur, tandem rumpuntur velamenta, effluit humor, qui iis continetur, quo etiam partes illae lubricae redduntur, caput infantis descendit, atque magis os vteri vrget, quo tandem id comprehenditur. Tunc mulier non mediocriter sibi opitulatur, si illa viribus ad foetum excludendum connititur, cui plerumque, vbi humeri ad os vteri compelluntur, noua mora impedimentumque iniicitur, auctis nixibus doloribusque superandum. Eo ipso tempore obstetrix manibus comprehendit infantem, eumque educit.

§. 1419.

Quoties autem infans protractus est, vmbilicus ad alterum transuersum digitum a ventre lino constringitur paulo pleniori, et praeciditur, ligata etiam illa vmbilici parte, quae a secundis dependet. Sequuntur plerumque secundae, quae vero, si vtero nimium inhaerent, extrahendae sunt. Ob id obstetrix praecisi vmbilici finem sinistra prehendit, et huius digitis circumdat, dextra autem vmbilicum ad secundas vsque sequitur, atque eum leniter trahit, concutitque, donec tandem secundae excidant. Si maiori vi adducitur vmbilicus, nonnunquam fit, vt is rumpatur, et periculosa sanguinis profusio concitetur, vel, vt, cum secundis, ipse vterus inuertatur, prouoluaturque. Interca, dum obstetrix hoc molitur, imperandum est mulieri,

vt

animam comprimat, tussiatque, quod, pressis a diaphragmate abdominis visceribus, secundae melius eliduntur. Nec alienum est, interea alicuius feminae manu parturientis ventrem, multa tamen adhibita moderatione, premi atque fricari.

§. 1420.

Vbi autem, id quod crebrius incidit, secundae non quuntur, sed penitus ad vterum adhaerescunt, ea assensio inter medentes est, quod alii necessarium esse contendunt, secundas protinus, demissis in vterum vinctae manus digitis, diduci atque protrahi, alii vero hoc naturae committunt, qui asseuerant, illas ab vtero contrahente, nulla alia vi adhibita, expelli, vt sponte excidant. Pro vtraque sententia experimenta adferuntur, quibus id probatur. Igitur hi, qui, festinandum esse, volunt, necessarium esse proponunt, vt obstetrix, contracto infante, manum protinus in vterum, hiantem adhuc eius ore, demittat, et digitos inter vterum et secundas, harum videlicet extremam oram, ita inserat, vt molles digitorum apices vtero, duri vngues secundis, obuersi sint, vtque has sic glubendo quasi ab vtero diducet, et cum coacto sanguine, aliisque quae intus sunt, eximat. Addunt, eo tempore sine molestia tantam manum intus esse posse, contracto autem vtero, eius os ita rursus arctari, vt manus in eum inseri nequeat. Iubent etiam, si secundae, vel omnes, vel earum disruptarum partes, a minus perita obstetrice in vtero relictas fuerint, vinctae manus digito indice ostendi iterum adaperire, rursusque alterum demittere, vt per has easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit, atque sic omnia, quae vtero inhaerent, educere. Probant enim, ex disruptis, et in vtero relictis, secundis, saepe sanguinem cum periculo ruere, et hunc vix conquiescere, nisi vtero contracto, nec vero

vero vterum contrahi posse, nisi ille vacuus fuerit. Addunt, si nullum ex sanguinis cursu oriatur periculum, illa, quae vtero inhaerescunt, tandem corrumpi, ita, vt vitium etiam ad vterum, et ab hoc ad totius corporis humida transeat, vel ea in carnes informes, quas molas vocant, verti, non raro cum muliere senescentes. Has vero non prohibere tantum, quo minus femina iterum concipere possit, sed etiam alia grauissimorum morborum genera parere *. Alii vero, qui contrariam viam ingrediendam esse, volunt, probant, hanc secundas auellendi rationem valde periculosam esse, violari enim vterum, et in hac inflammationem concitari, relinqui non raro exulcerationes, ac varii generis tumores, imo carcinomata. Minus periculi esse, si, contrahente sese vtero, sponte secedant secundae, hoc vix non semper fieri, cum ipse vterus in ima internaue sua parte muscolum habeat fibrasque in orbem ductas, quarum actione illae excutiantur **.

* Vid. IO. VARANDAEVS *de Affectibus Mulierum L. II. Cap. XI.* Inter alios plures LA MOTTE *Traité des Accouchemens L. V. Cap. I. p. 725.* et Doctissimi Viri mihiq̃ue amicissimi Dn. D. IO. VALENT. HARTTRANFFT *Diss. de non differenda Secundinarum adhaerentium extractione, Lips. MDCCXXXV.*

** Inter hos princeps est FRID. RVYSCHIVS *Aduersf. Decad. II. Obs. X. p. 30.* et in *Traçt. Anatom. de Musculo in fundo uteri obseruato, Amstelod. Anno MDCCXXVI.*

§. 1421.

Si vero de his, quae per magnae contentionis disputationes a medicis tractata fuerunt, atque tractantur, dicendum, quae proxima vero videntur, res non sine periculo est, si secundae non protrahuntur, vel omnes vel earum, partes, in vtero relinquuntur. Dum etiam manus in vterum demittitur, cum secundis excuti possunt alia, quae saepe intus sunt, coactus sanguis, mola, quae nisi eximantur nouis doloribus, post partum saeuientibus; exturbantur. Sed vero multa etiam

iam genera et tempora periculi sunt, si secundae valde inhaerescerent vi adhibita diducuntur. Quare magis tutum omnino videtur, si, protracto infante, sine mora educi possunt secundae. Sed vero, cum id saepe non, nisi aegerrime, fiat, nec ad eas eximendas adeo properandum esse, plures in arte exercitati viri praecipiunt, qui iubent, ut, nisi aliud quid, veluti grauior sanguinis profusio, id exigat, feminae temporis parum detur, quo a laboribus respirare possit, viresque colligere. Eam quoque, si in sedili partum ediderit, resuturam in lectulo collocandam esse, cum sic non tam facile ipse vterus secundas manu tractas sequatur. Saepius enim fieri, ut, contracto paulatim vtero, secundae, quae ab initio non, nisi vi adhibita, diduci potuissent, ne negotio, tracto concussoque paululum umbilico, cadant*.

* Hanc sententiam proposuit prae caeteris ALEX. MONRO in *the Medical Essays Vol. II. Obs. XI. p. 220.*

§. 1422.

Edito infante, eductisque secundis, mulieris puerenda panno tepesfacto operienda sunt, ne aer vterum, nec apertum, offendat. Femina in lectulo collocanda est, et, illi si iam numerosum partum edidit, fascia, qua venter paululum adstringitur, iniicienda. Haec superuacanea plerumque esse solet in femina, quae primum partum enixa est, cum illa tantum infirmitatem relaxati vteri, peritonei, atque musculorum abdominis, si qua est, adiuuare possit. Ea vero, si artius circumdatur, et nimium, praecipue vterum, premit, omnibus valde nocitura est.

§. 1423.

Gemellorum quilibet habet suum velamentum, et umbilicum. Illa vero secundarum pars, quam recentiores placentam vocant, interdum diuisa, interdum

dum autem ita concreta est, vt dirimi sine laceratione non possit. Si, post editum partum, deligatumque vmbilicum, mulieri venter non detumescit, sed durus manet, atque impositae manui renititur, obstetrix debet, antequam secundas diducit, vmbilicum sequi, et manu in vterum demissa, num alius infans intus sit, experiri. Si infans in vtero est, is doloribus parturientisque nixibus etiam ad inferiora compellitur, et, si recte compositus est, excluditur. Praestat vero, si, talem intus esse, certo constat, ipsum partum accelerare, et ob id etiam velamenta, si adhuc integra sunt, digitis rumpere, pedes conquirere, et infantem extrahere. Si gemelli in vtero, et eorum velamenta rupta, sunt, illi commode, prehensis pedibus, extrahuntur, ea vero sedulitas necessaria est, et cautio, ne chirurgus vtrumque infantem, correpto vno, vtriusque pede, simul adducat. Ex secundis gemellorum, illas, quae ad priorem partum pertinent, prius extrahi oportet.

§. 1424.

Iam vero ad eos casus veniendum, vbi partus, qui per se excidere haud potest, manu chirurgi dirigendus, eximendusque, vel etiam ferraementis excutiendus est, cuius rei plures causae atque occasiones sunt, quae summam prudentiam moderationemque desiderant. Ante omnia vero hoc exploratum esse debet, num partus viuus sit, num iam in vtero materno extinctus, cuius rei plura habemus indicia, quae vero etiam, cum, vt supra, occasione grauiditatis, retulimus, omnes fallere possint, sedulo conferre, et certo iudicio ponderare, debet Chirurgus.

§. 1425.

Partum itaque emortuum esse, interdum ex euidenti-
bus causis cognoscitur. Si mulieris venter, ictu
illato, casu ab alto, facto, vel alia ratione, vehementer
commo-

ommotus, violatusque, fuit, vel, si aliud quid incidit, eluti, si mulier subito terrore, metuue iniecto, commota fuit, si illa post aliquot dierum languorem inhorruit, nullo insequente calore, si crebrius animo linquitur, si faciei color nouo pallore mutatus est, ac luridus, oculos habet graues, liuentes labentesque, si os olet, mammae emacuerunt, venter desidit, et in eo non moti infantis, sed grauitatis aliquis sensus est. Certiores notae sunt, postquam sub ipsis doloribus vteri os aperiam est, et corpori mortuo iniecta manus frigus; nullo vero arteriarum ictus, sentit, et, si ab illo epidermis secedit, si foedi humoris sanies, et cum illo humore, quod naturaliter amnio continetur, etiam sterces, et, vt vocant, meconium, profluit. Incidere tamen potest, vt, viuo etiam infante, nullos arteriarum ictus percipiamus in membro, quod ab vteri ore interno valenter comprimitur, a quo membro etiam, si illud ingraena affectum est, epidermis separari potest. Si infantis etiam viui, clunes, obuersi sunt eosque, et infantis ventrem, dum hic replicatus descendit, os vteri comprehendit atque vrget, meconium etiam ex viuo artu exprimitur, et cum illo humore effertur.

§. 1426.

Partus vero emortuus, si recte compositus est, eadem via, qua viuus, excidere solet. Interdum, si intransuersus, vel aliter collocatus, est, is optime in pedes conuertitur, et manu chirurgi extrahitur, de qua artum dirigendi ratione mox dicendum. Si vero cauit ad os vteri haeret, et per illud, vel propter magnitudinem, vel membrorum conformationem, vel etiam propter muliebrium angustias efferri nequit, res ferramentis agenda est. Iam vero ab aliquot annis inuentae fuerunt maiores ampliioresque forcipes, quae ita aptantur, vt illarum laminae caput infantis comprehendant,

Fff

hendant,

hendant, quibus non solum emortui, sed viui etiam, partus extrahuntur. His enim ferramentis non solum infans prehendi, sed os vteri etiam ampliari, aliquantum potest *. Alii genere quodam laquei vtuntur quem certis accommodatisque ferramentis super infantis caput iniiciunt, et sic illaqueatum adducunt, totumque corpus extrahunt. Etiam, viuos sic exim posse infantes, scribunt **. Frequentissimum vero est in his casibus, si certo constat, partum emortuum esse eum vincto excuti.

* Figuram huius forcipis, vel, vt vocant, *Extractoris*, vide in WILLIAM GIFFARD'S *Cases in Midwifery*, quem hoc ferramento crebrius vsum fuisse illae eius obseruationes docent. Aliam figuram dedit ALEXANDER BUTTER, Chirurgus Edinburgensis, in *the Medical Essays Vol. VIII. Obs. XX. p. 320*. Confer. EDMUND CHAPMAN'S *Essay on the improvement of Midwifery Cap. I. p. 13.*

** Huius laquei (*Fillet*) mentionem facit CHAPMANN *l. p. 12.*

§. 1427.

Hoc vero recenti re fieri oportet, ne aliquam, quae per se moritura, erat, occidisse videamur. Manu enim admoueri, non debet mulieri, quae plurium dierum laboribus vigiliisque exhausta confectaque est quae febricitat, cuius arteriae aequis interuallis non mouentur, sed subeunt, atque interdum quiescunt quae somno vltra debitum vrgetur, cuius venter atque genitalia, quod inflammationem acceperunt, intumuerunt.

§. 1428.

Si vero partum ferramentis euellere statutum est ante omnia mulier urinam reddat, vel haec, si aliquid eam reddi naturaliter, prohibet, demissa in urinae iter (1338) argentea fistula euocetur. Oportet vero resupinam mulierem transuerso lectulo subiecto inter corpus et lectum scorteo puluino, ita collocari, vt imum ventris

enter in conspectu sit, et vt mulieris feminibus ilia
 comprimentur. Ad latus duo valentes assidere oportet,
 qui femora cruraque continent, et alius minister
 tergo toti corpori incumbit, atque prohibet, quo
 minus id, dum partus adducitur, sequatur. Tum chi-
 rurgus diligenter, vnguibus circumcisis, digitos, leni-
 ter oleo vnctos, in pudendum demittit, vt emortui
 partus habitum, positumque, sentiat, et inueniat, vbi
 vncus demitti possit. Antequam vero hoc fit, si caput
 proximum est, sed vero maius, verticem aperiri, et ce-
 brum eximi, oportet. Foratur membrana, quae in
 uerorum summo capite est, fontanellam vocant, vel
 scissura, vel alio ferramento, cuius varii modi sunt *.
 Tandem vero cerebrum, vel nudis digitis, vel alio fer-
 ramento, cochlearis instar formato, euellitur. Cauen-
 dum vero sedulo, ne caluariae ossa mulieris genitalia
 periturdine sua laedant. Tandem vncus, vndique
 acutus, et acuminis brevis, demittitur, et, vel oculo,
 vel auri, vel ori, vel occipiti, vel maiori etiam in calua-
 riae foramini, per quod spinalis medulla descendit, in-
 ducitur. Optime autem vncus pone aurem, vbi in
 ultis apophysis mastoidea est, defigitur. Cura enim
 breuis est, dum vncus adducitur, ne eius acumen in
 ventri, vel in muliebria, delabatur, ex qua re ingens
 mortis periculum oriri potest. Vnci manubrium non
 habet, quae ostendit, cui parti eius acumen ob-
 rursum sit.

* Varia ad id excogitata sunt ferramenta a MAURICEAU, a Ce-
 leberr. FRIEDIO, *Argentoratensi*, aliisque, in quibus scalpelli
 acumen, vagina inclusum, elatere, vel cochlea, vel alia ra-
 tione, mouetur.

§. 1429.

Defixo sic vnco, is a chirurgus, mediante dextra,
 citius adducendus est, sinistra intus posita, quae infan-
 tem simul, quantum fieri potest, dirigit. Sed vero
 hoc, quod in omnibus his curationibus perpetuum est,

sedulo teneri debet, vbi manum, vel ferramenta, in vterum demittere, aliquid in eo moliri chirurgum oportet, is vt, compresso per dolores vtero, quiescat, hianti vero vtero, desinenteque dolore, procedat, et id, quod propositum est, efficiat, necesse est. Qui enim vrgentibus doloribus, manus intus dare, vel foetum dirigere, aut aliquod membrum replicare, audent, iis euenire potest, vt vterus rumpatur, mulierque subita morte rapiatur, cuius partus post obitum in ventre reperiri solet *. Vbi vero partus vnco protractus fuit caetera agenda sunt, vt iam superius exposui **.

* Vid. HILDANVS *Cent. I. Obs. 64. Cent. IV. Obs. 57. Ephemer. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 19. p. 21. et Obs. HEISTERI in Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 186. p. 397. et EIVSD. Differt. de Foetu ex vtero materno exscindendo et de ruptura vteri. Alta MDCCXX.*

** Partum alii aliis ferramentis excutere voluerunt. Machina a FRANCISCO MAURICEAU inuenta (*le Tire tete* d MAURICEAU) artificiosius efficta est, qua vero partus vituto prehendi potest. Vid. MAURICEAU *l. c. L. II. Cap. XXXII. p. 367.* IO. PALFINVS, Gandauensis Chirurgus, proposuit duas laminas, satis amplas, recuruas, quibus infanti caput vtrinque prehendere et educere voluit. Vid. *Cel. HEISTERI Inst. Chirurg. P. II. Sect. V. Cap. 152. p. 1046. et Tab. XXXIII. Fig. 16.* Haec PALFINI ferramenta eo lubentius adduco, quod mihi persuasum est, illa inueniendis illis forcipibus, quarum superius mentio facta est, occasionem dedisse. Aliud inuentum est Celeberrimi Viri, apud Argentoratenses Obstetricii, Dn. D. IO. IAC. FRIEDII, qui aliu κεφαλῶλον, vel *Tiretete*, reperit. Vide *Acta Erud. Ann. MDCCXXIX. Mens. Aug. p. 347. Tab. IV. fig. 1.* Alibi (§. 12 dictum est, paucioribus ferramentis vti debere chirurgum id quod vel maxime obstetricium decet, qui, vbi rem manibus agere potest, merito negligit ferramenta.

§. 1430.

Si partus emortuus in transuersum iacet, medenti propositum esse debet, vt, conquisitis adductisque pedibus, eum protrahat. Incidere vero potest, vt, attracto sic infante, auulsum caput in vtero maneat. Hoc sine mora auferendum est, vel digito in os inserto, vel forcipe

arcepe, vel illis, modo descriptis, ferramentis, ex
 quibus forceps, et id, quo Cel. D. FRIEDIVS vtitur,
 notiora caeteris videntur. PETRVS AMANDVS, Chi-
 rurgus Gallus, reticulum inuenit, quo caput, sic
 ciliolum, extrahere instituit *.

* Vid. *Les nouvelles observations sur la Pratique des Accou-
 chemens Obs. LXXIII. p. 235.*

§. 1431.

Quoties autem partus emortuus tranfuerfus, eius
 pro manus, vel alia pars, in propinquo est, et per os
 vteri prominet, infans autem, id quod interdum inci-
 dere solet, dirigi, ac in pedes conuerti non potest,
 quod, quia os vteri inflatum inflammatumque est,
 manus intus dari nequit, et quod ipse partus, eiusque
 vires, quae proxima est, intumuit, ac replicari nequit,
 hae difficultates faciunt, vt is, qui solidus non
 est, concisus eximi debeat. Conciditur autem infans
 vno vnco, qui in interiore parte per totam aciem
 incutitur. Hoc vnco, vel, id quod magis tutum vi-
 detur, scalpello incuruo, falcato, cuius mucro glebu-
 m habet, praeciduntur carnes prominentis humeri
 prope articulum cum omoplata, et humerus rotando
 magis, quam trahendo, ex sinu suo euellitur. Iam-
 vero chirurgo enitendum est, vt manum inferat, et
 pedes conquirat. Si vero nec tunc os vteri manum
 admittit, corpusculum illo vnco forandum, effuso hu-
 more exentisque visceribus, extenuandum, atque sic,
 vel manu, vel alio vnco, etiam duplex acumen habentem,
 extrahendum est *. Magna diligentia adhiberi
 debet, ne vnCUS, putri corpusculo injectus, elabatur,
 in quo, quid periculi sit, supra positum fuit. Non
 temere ad hanc horrificam medendi rationem festi-
 nandum est, quae saepe vitari potest, si chirurgus
 opportuno tempore accersitur, et si is, rerum suarum

peritus, partum non recte compositum in pedes dirigere, et per hos eum protrahere, potest.

* Aliud ferramenti, vel scalpelli, genus, quod annulum habet, quo id digito indici aptatur, delineatum vid. *in the Medical Essays Vol. V. Obs. XXXIX. p. 445.*

§. 1432.

Atque vero hoc non de emortuis tantum infantibus, sed etiam de viuis, intelligi debet. Partum vero, quamuis adhuc velamentis suis inclusus sit, modo adaperitum os vteri fuerit, transuersum esse, sciri potest, si, vrgentibus doloribus, illud velamentum non globosum, quale ab insequente capite redditur, digito obnititur, sed fere aequale est et flaccidum. Ruptis vero his tunicis, habitum infantis digito sentire potest chirurgus, cui infantis pollices indicio sunt, cuius lateris manus, vel pes, in propinquo sit. Partus vero, qui sic compositi sunt, nisi conuertantur, edi nequeunt, id quod, vt ex haecenus dictis intelligi potest, mox ab initio fieri debet, quo tempore mulier nondum adeo oppressa doloribus est. Quare, si ex velamentorum habitu sentit chirurgus, partum recte compositum non esse, expedit, ea sine mora digito forare, atque rumpere, infantem vero dirigere atque extrahere. Infans dirigitur, si chirurgus, vt supra retuli, vnam manum in vterum inserit, id quod, se remittentibus doloribus, fieri oportet, cum, iis substantibus, vt iam retulimus, quiescendum sit. Vbi tota manus, per has occasiones demissa, intus est, debet digitis pedes conquirere, et, his apprehensis, infantem educere. Sic enim non difficulter protrahitur, modo is, vbi ad nates vsque educus est, iniecto prius tepesacto linteo, duabus manibus prehendatur, et ita conuertatur, vt eius vultus perinaeo mulieris obuersus sit. Brachia, si obnituntur, digitis adduci possunt. Si non vterque pes inueniri potest, adducendus est vnus, qui proximus,

us, quem alter sequitur. Omnes igitur in pedes conuertuntur, et viui protrahuntur, quorum ceruix, oes, aures, pectus, tergum, abdomen, in propinquo est, nec minus illi, qui, in pedes conuersi, Agrippam more, descendunt, quos conuertere non opus est. Nec oportet, si manus in vterum inferi, et pedes inueniri, possunt, membrum, quod proximum est, etiam in vteri ore haeret, replicari, cum illud adductis pedibus, sponte sequatur.

§. 1433.

Non raro infantes obuersis clunibus vtero emergunt. Hoc si tempestiue deprehendit chirurgus, eum oportet nates paululum retro repellere, atque sic corpus rectius reddere, post pedes conquirere, et his artum educere. Sed vero, vbi retropelli clunes commode nequeunt, chirurgus inguinibus infantis utriusque manus digitum indicem iniicere, et sic eum complicatum protrahere, potest, ad quam rem magnitudo genitalium plurimum facit.

§. 1434.

Solet etiam euenire, ut vmbilicus, dum infans adhuc in vtero est, foris sit, et ex eo propendeat, quae res summum, mortisque, periculum infanti afferre potest. Ante omnia, digitis vmbilico admotis, expectandum est, num arteriae in eo moueantur, ex quo intelligitur, vitam nondum deseruisse infantem. Huic autem sine mora succurrendum, isque, conquisitis pedibus, celerius protrahendus est. Nam, si maternis, venterisque, nixibus eliditur, comprimitur vmbilicus, sistitur in eius arteriis venaque sanguis, et infans, quasi strangulatus, antequam lucem aspicere potest, vitam amittit.

§. 1435.

Nec ignorari oportet, difficultates, quibus parturientes affliguntur, non semper a partu male composito oriri, sed etiam ab vtero, si is aliter collocatus est, quam naturaliter esse debet, et in obliquum flexus. Nonnunquam, praecipue in feminis obesis, quibus venter, et ipse vterus, cum suis ligamentis, frequenti partu iam relaxatus est, is super pectinis ossa anteriora versus inclinatus propendet. Hoc si incidit, infans ita deuoluitur, vt suo capite ossi sacro mulieris innitatur. Ex qua re sequitur, vt eidem et coccygis ossi etiam os vteri obuersum sit. Hoc igitur difficiliter digito potest explorari, cuius superior saltem ora sentitur. Haec omnia sub primis doloribus optime cognoscuntur, et tunc confert, mulierem non in sedili, sed in lectulo, resupinam, coxis etiam elatioribus, collocari. Chirurgum oportet, altera manu mulieris sic iacentis ventrem paulatim, et multa adhibita moderatione, deprimere, alterius manus digito, sub ipsis etiam doloribus, quantum fieri potest, ori vteri inserto, huius ceruicem paululum leuare, vt sic vterus rectior fiat. Aliquid conferre potest, si coccygis os in iunioribus aliquantum deprimatur.

§. 1436.

Vitium huic contrarium est, si vteri ima pars, fundum vocant, nimium resupinata, tergo mulieris quasi affixa est. Nec in hoc casu os vteri loco suo, et digito tangenti obstetricis obuium esse potest, quod sub ossibus pectinis urinae itineri proximum latere solet. Infans autem, si is caeteroquin recte compositus est, dum exitum molitur, ab obliquo vtero se contrahente ad ossa pectinis propellitur, quibus, capite innixus excludi nequit. Ad hanc rem aliquid conferre videtur, si mulieri peluis angustior est, et si illa tem-

pore,

ore, quo vterum gerit, frequentius supina cubat. frustra autem sunt omnes mulieris labores, nixusque, nisi prius, et vterus, et ipse infans, recte compositus sit. Antequam in hoc casu hoc molitur chirurgus, mulier urinam reddat, et tum ille digito vinctae manus, sub pectinis ossibus, os vteri, inserto in hoc, quantum fieri potest, digito, explicare, illud, sub ipsis etiam doloribus, paulatim deorsum, et perinaeum verum, premere, alteram autem manum ventri super pectinis ossibus imponere, et hunc, summa adhibita moderatione, aliquantum deprimere debet. Interea, ubi digitus in os vteri inferi potuit, caput, quod ossibus pectinis innititur, etiam expediendum et deorsum deorsum ducendum est. Omnia haec modice molliter tractanda esse, nemo non intelligit. Sub his exedit, mulierem non supinam cubare, sed erecto corpore, et capite in priora magis inclinato, esse, genuisque inniti. Vbi, tum vterus, tum partus, recte compositus est, mulier doloribus iungat suos etiam nixus, quibus infans exturbatur. Si tamen manus interum inferi potuit, fere et hic commodius est, parum, prehensis pedibus, extrahi.

§. 1437.

Etiam in latus inclinatur vterus, id quod interum in pusillis foeminis fit, in quibus vterus, quod interum, plenior, pelvis satis comprehendere nequit, supra illam affurgit, qui facile in latus detorquetur. longe frequentius hoc fit, si intestina, in latere dextero coecum, in latere sinistro colon, quod ibi replicatum est, flatibus, vel stercore plenum vicinum vterum urgent, et in contrariam partem propellunt. Plurimum confert, si mulier tempore graviditatis frequentius in vnum latus cubare solita est. Hoc vitium agnoscitur, si venter non aequalis est, sed in vno latere

latere magis, quam in altero, tumet. Os vteri in opposita parte, plerumque sub osse ischio, vel etiam sub altero osse pectinis, delitescit, quod vltimum incidit, si vterus ita obliquatus est, vt eius fundus non solum in vnum latus, sed etiam in partem posteriorem, inclinatus sit. Si vero vterus in latus, v. g. dextrum, deflexus est, atque simul propendet, os vteri, quod, vt supra retuli, intestino recto incumbit, in sinistro latere reperitur. Etiam in his casibus recte collocari femina debet, et os vteri, quantum fieri potest, dirigi. Saepe ante caetera necessarium est, aluum lotionibus ducere, si, ante partum venter suppressus, parum reddidit. Plerumque etiam hic optime res geritur, si, adaperto ore interno, partus, conquisitis prehensisque pedibus, protrahitur. Nam, in omnibus his casibus priora tempora opportunissima curationibus esse, hisque intermissis, saepe, et mulierem, et partum, mortis periculo subiici, vsus docuit.

§. 1438.

Minime distantem curationem etiam requirit sanguinis profusio, quae, antequam partus exclusus est, interdum incidere solet. Nam de ea, quae abortus periculum facit, hic agendum non est. Si parum fuit sanguis, imperanda est quies, aliaque adhibenda auxilia sunt, quae alibi (417. 418) executus sum. Si vero cum impetu ruit sanguis, intelligitur, secundarum aliquam partem ab vtero auulsam esse, et ex huius vaforum hiantibus osculis sanguinem ferri. Hoc ipsum comprobatur, si euident causa fuit, et vterus ictu, extrinsecus illato, casu, saltuue, aliaque corporis exercitatione, vel animi perturbatione, commotus. Interdum etiam partus, vmbilico suo irretitus, et quasi illaqueatus, est, quem, dum exitum molitur, trahit, et secundas ab vtero diducit. Reperiuntur etiam feminae,

ae, quibus secundae, et id, quod placentam vocamus, os ori vteri inhaerescunt, quae, dum illud os doloris ampliat, diducuntur, ut ex patentioribus arteriarum osculis, vel iis etiam disruptis, sanguis cum periculo profundatur. Vnicum praesidium aduersus hoc sanguinis profluuium est, infantem protinus, et festinanter, etiam aliqua vi adhibita, protrahere. Digitus, oleo vnctus, inferi debet in os vteri, quamuis hoc etiam parum dehiscat, qui, si in eo continetur, alius digitus debet demitti, et per has occasiones alius. Dum vero sic digitis aperitur os vteri, dolores concitantur, quibus infans propellitur. Data intus manu, os, si eas appositas sentit, secundae digitis forandae sunt, et rumpenda velamenta, atque infans, conquisitis pedibus, sine mora protrahendus est. Inuenio tamen recentiorum scriptorem, qui, aliam curandi viam ingressus, iubet, excitatis doloribus, naturalem partum celeriore facere. Dolores mouet, dum, inserto in os vteri digito, illud paulatim dilatat. Ostendit enim, irritato sic ad sui contractionem vtero, ora vasorum sanguinem fundentium adstringi, et sanguinem supprimi, ipsumque partum expelli. Ob id, ut vterus se melius possit in angustum adducere, ampliato vteru re, rumpenda esse velamenta, ut humor affundatur. Sic enim, id quod experimentis probat, minori periculo mulieres, etiam iam sanguine fere exhaustas, partum edere potuisse, et omnem profusionem conquiescere *. Experiendum erit, quae medendi ratio miserie feminis maiorem securitatem praestare possit.

* Vid. *Comment. de Haemorrhagia vteri grauidarum in Acad. Chirurg. Vol. I. p. 358. Edit. in 4.*

§. 1439.

Grauis et miserabilis casus est, si per naturales vias partus excludi nequit, id quod ex variis causis incidere

cidere solet. Interdum verendorum, ossiumque, conformatio et figura, nimiaque angustia, id prohibet *. Nonnunquam orae naturalium inter se a natiuitate glutinatae sunt, aliquando vero, exulceratione facta, per malam curationem sanescendo iunctae. Quomodo, his incisus atque diductis, iis, quae inter se cohaerent, succurrendum sit, protinus, vbi de atretis dicetur (1443), exponam. Infans si humore distenditur, id quod fieri interdum solet, et si chirurgus certus est, eum emortuum esse, oportet eius corpus digito indice forari, vt, effuso humore, extenuatum, manibus, vel etiam vncō, possit extrahi. Nam vix sperari potest, superstitem futuram esse parturientem, si scalpello os vteri incidatur, ampliaturque, id quod Clarum Professore ausum esse legimus **. Si naturalibus, quorum nimia angustia est, frustra admota fuerunt fomenta, aliaque, quae maxime ad emolliendum possunt, superest auxilium, quod, quamuis incertum temerariumque sit, adhiberi oportet, cum sit vnicum. Sectionem Caesaream vocant hanc chirurgiam, qua, inciso parturientis ventre, vteroque partus protrahitur. Nunquam hoc negligi, sed protinus, et sine mora, fieri, debet, si puerpera, antequam partum enixa est, morte occubuit, et, vel exploratum, vel probabile, est, infanti vitam suppetere ***. Multa tamen prudentia adhiberi oportet, ne feminam, quae, sanguine exhausta, viribus defecta, vel grauitate morbi, dolorisque acerbitate, oppressa, animo linquitur, atque quasi exanimis iacet, superstite vita, nulla adhibita moderatione, incidamus ****. Iam vero plurium obseruatione compertum, et ita comprobatum, est, vt nulla dubitatio relicta sit, non raro feliciter cedere hanc medendi rationem, si illa etiam viuis feminis adhibeatur, et ex earum inciso vtero partus, vel viuus, vel mortuus, eximatur *****. Imo, fuisse dicuntur feminae, quibus

haec

aec anceps et periculosa curatio iterum, et aliquoties, dhibita fuit *****.

* Vide Casum in *Comment. Acad. Chir.* p. 646.

** THOMAS SIMONIVS, Clarus Professor Scorus, vid. *the Medical Essays Vol. III. Obs. XIX.* p. 315. os vteri callosum incidit, femina post viginti et quatuor horas obiit, quamvis ex illis plagis nulla secuta fuerit sanguinis profusio.

*** Vide HEISTERI *Dissert.* supra ad §. 1430. * citata.

**** Senatus Venetus legem tulit, qua cauit, ne puerperae mortuae, quarum partus adhuc vivus educendus est, decussata sectione incidantur, sed simplici, qua alias vtuntur chirurgi, qui vivae matri hanc chirurgiam adhibere solent. Hoc me docuit Celeberr. WINSLOVIVS in *Quaest. med. Chirurg. An ad servandam prae foetu matrem obstetricum hamatile minus, anceps et aequae insons, quam ad servandum cum matre foetum Sectio Caesarea? Lutetiae, Anno MDCCXLIV. proposita.*

***** Omnia fere, quae ad Sectionem Caesaream attinent, congestit Chirurgus Gallus SIMONIVS in *Comment. Acad. Chirurg. Vol. I.* p. 623. Vide PLINIVM *Hist. Nat. Lib. VII. Cap. IX. T. I. Edit. HARDVINI* p. 378. vel Caesares v. eundem l. c. De Origine tamen huius denominationis multis disputat AELIVS SPARTIANVS in *Vita Aelii Veri in Hist. Augustae Scriptor T. I.* p. 224. Conf. SEXTVS POMPEIVS FESTVS *de Verb. Signif. Lib. III.* p. 61. qui Caesares a caesarie appellatos fuisse prodidit. Qui inter recentiores primus hanc curandi viam ingressus esse videtur, fuit *ἑξότρουος* Heluetus, qui anno circiter MD. propriam uxorem curavit tam feliciter, ut ea post gemellos, et quatuor adhuc infantes, enixa fuerit. Vid. BAVHINVS in *Appendice ad ROSSETVM* p. 162. Hanc vero chirurgiam post singulari studio exposuit, et medentibus commendavit FRANCISCVS ROSSETVS in *Traité nouveau de l'Hysterotomotokie ou Enfantement Caesarien, à Paris, MDLXXXI:* quem libellum modo laudatus CASPARVS BAVHINVS in latinum sermonem vertit, eique alias observationes addidit. Latine eum edidit et multum adauxit ipse ROSSETVS Anno MDXC. cui titulus: *Ἱστορικὸς καὶ κλινικὸς Περὶ τῆς Καesareas τοῦ ἑξότρουου ἱστορία, i. e. Caesarei Partus Assertio historiológica, et eodem anno Carmen scripsit, cui Titulus: Dialogus Apologeticus pro Caesareo Partu in maleuoli cuiusdam Pseudoprotei dicteria.* Plures enim habuit aduersarios, de quibus vide modo dictam Commentationem. PAREVS, cuius magnum illo tempore nomen fuit, de hac medendi ratione et eius successu dubitavit in *Lib. XXIII. Cap. XXXI.* p. 702. Variæ in illis Commentariis huius curationis feliciter peractæ leguntur historiae, partim ex Autoribus

bus exscriptae, partim quae haud ita pridem Lutetiae animaduersione diligenti plurium Chirurgorum notatae fuerant, quibus addimus *Observationes in the Medical Essays Vol. V. P. I. Obs. XXXVII. p. 439. et XXXVIII. p. 444.* Non vero hac Chirurgia tantum partus in utero haerentes protrahuntur, sed etiam aliis, qui forte, tubae Fallopianae, vel alii visceri, adhaerentes, extra uterum, solo abdomine conclusi, aliquando per plures annos circumferuntur. Talis fuit, ut alias observationes iam mittamus, foetus Mussipontanus a LAVRENTIO STRAVSSIO singulari studio descriptus in *Resolutione Casus Mussipontani, Darmstadii, An. MDCLXII.* Confer THOMAM BARTHOLINVM de *Insolitis Partus Viis Cap. XI. p. 74.* nec non ille foetus a RVDOLPHO IACOBO CAMERARIO descriptus et delineatus in *Diff. de Foetu XLVI annorum, Tubingae, MDCCXX.* Alii casus plures in hac Dissertatione allegantur. Nonnunquam hi partus, in abdomine senescentes, sibi viam, per peritoneum et abdominis musculos, concitata magna suppuratione, aperiunt. Vid. BARTHOLINVS l. c. Cap. V. ex ROSSETO et aliis Autoribus. Conferatur *Istoria d'un feto estratto felicemente interno dalle parti deretane scritta da GIOVAN DOMENICO SANTORINI, in Venezia, MDCCXXVII. §. XXX.* ubi etiam plura exempla ab Autoribus proposita leguntur. Ossa corruptorum foetuum per intestinum rectum extracta fuerunt a LITTRIO, Academico Gallo. Vid. *Comm. Acad. Reg. Sc. Anno MDCCII. p. 313.* et ex muliere alia, praesente Celeberr. SANTORINO, a Chirurgo NICOLAO PATVNA, qui eundem casum, de quo SANTORINVS in mox citato Tractatu egit, libello quodam descriptit, edito *Venetiis, MDCCXXVII.* In alia muliere alter infans per vlcus umbilici extractus fuit, alterius ossa per aluum exturbata. Vid. *the Medical Essays l. c. Obs. XXXVIII. p. 441.* Partum vero talem, inciso abdomine, extraxit ABRAHAMVS CYPRIANVS Professor Franequeranus qui edidit *de hoc casu Epistolam, Lugd. Bat. MDCC.* Mulier, postquam hanc curationem sustinuerat, iterum filium, et post etiam gemellos, peperit l. c. p. 14. Confer de Sectione Caesarea, praeter ROSSETVM, *Traité de l'Operation Césarienne par JEAN RULEAU, à Paris, MDCCIV. et Voorstel- ling van de Noodsaakelijkheid der Keiserlyke Snee door DIONISIVS VAN DER STERREN, tot Leyden Anno MDCLXXXII.*

***** Vide *Comment. Acad. Chirurg. l. c. p. 637.*

§. 1440.

At enim, si, ubi aliter succurri non potest, hanc sectionem experiri vult chirurgus, oportet, mulierem supinam iacere, ita tamen, ut illud latus, quod secari debet,

ebet, superius fit. Incidantur, iuxta lineam albam, laga maiori, quae ab umbilico ad ossa pubis fere descendit, tum abdominis muscoli, tum peritonaeum, ubiumen vitandum, ne violetur arteria epigastrica. Hac laga facta, vterus conspicitur, qui alia plaga, magis in ceruice, quam eius ima parte, vel fundo, aperientis est, quod imo vtero secundae adhaerent, quas vulnerari periculosum est. Arteriis, si ex iis sanguis proinditur, vinciendo prospiciendum est. Educuntur per plagam, et infans; atque etiam secundae, quae ab vtero diducendae sunt. His peractis, plerumque vulnus futura adducitur, et imponuntur medicamenta, quae putredinem auertunt. Nam plagae tandem cicatrix inducitur, cui pannum obici, vel super eam aliquid quid deligari, oportet, quo illa reprimatur. Nam hac curatione frequentius hernia relinquitur *.

* Vide MICHAELIS DOERINGII *Epistolam ad GVILIELMVM FABRICIVM HILDANVM, de Hernia vterina. Witteb. MDCXII.* prostat etiam in HILDANI *Operibus* p. 893.

† Annis abhinc paucis problema propositum est de sectione synchondroseos ossium pubis facienda, iis datis peluis conditionibus, quibus fit, ut exitus eius nimis angustus naturalem pariendi rationem haud admittat. Capta sunt experimenta de animalibus brutis, et, ut genius hominum aetatis nostrae, in noua quacque ruentium fert, protinus fuerunt, qui idem genus curandi, triste profecto, etiam in hominibus prosequi haud dubitarent. Verum de his stilum abstinco, lectoresque ablegatos volo ad scriptores maxime idoneos probatosque. Legantur igitur, quae in confectibus publicis Academiae Regiae Chirurgorum Parisiensium acta sunt et post litteris mandata in Commentariis eiusdem Academiae inscriptis: *Seances Publiques de l'Academie Royale de Chirurgie. A Paris 1779. pag. 102. seqq.* ubi et Facta, sectionem synchondroseos ossium pectinis attinentia, et ab illustri Academia habitum eorundem examen atque saequum de iis decretum, sincere ac perspicue sunt perscripta. In supra laudato BAUDELOCQUII libro cum de omni artis obstetriciae historia tum quoque seorsim Tom. II. de sectione symphyseos ossium pectinis leguntur haud contemnenda. Qui vero libris iis haud gaudent, illi possunt legere et colligere ea, quae ex aliis excerpta per

Volumina Bibliothecae chirurgicae suae dispersim comminuit RICHTERVS.

§. 1441.

Pudenda mulieris, post difficilem partum nimirum vexata, saepe intumescunt, quibus adioueri debent fomenta tepida ex emollientibus herbis, quae, vel e aqua, vel lacte, coquuntur. Si perinaeum ruptum fuit, vulnus colluendum est vino calido, et mulier extensis compressisque in vnum feminibus cubare debet quae, ne sub somno diducantur, fascia deligari queunt. Sunt, qui plagam in perinaeo fuendam esse, volunt*.

* Vid. *Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 44. p. 90.*

'A T P H T O I.

§. 1442.

"Ατρητοι*, Atretae, dicuntur feminae, quarum naturalia praeclusa sunt, vt concubitus non admittant. Vel membrana pudendo opposita est, vnde eius orae inter se glutinatae sunt, id quod, vel ex vtero materno esse solet, vel incidit, dum, exulcerationem in his partibus facta, illae orae atque tunicae per multam curationem sanescendo iunguntur. Si in puellulis quibus catamenia instant, sanguis in haec loca coarctatus fluit, et ei nullus exitus datur, eas non raro neruorum distentio, febris, cum inflammatione, aliaeque grauissimarum atque pernicialium morborum genera malum habent. Membrana, si opposita est, sine negotio inciditur, si vero caro pudendum repleuit, idque protractum in vtero matris euenit, malum saepe nullam curationem recipit. Nec minorem difficultatem illud habet, si tunicae, post exulcerationem sanescendo, in vnum iunctae, coierunt.

* "Ατρητοι κατὰ τὰ γεννητικὰ μόρια. PAVLVS Lib. VI. Cap. LXXXI. p. 92. Edit. Aldi.

§. 1443.

Femina resupina, eo modo, quo in partu difficili
guratur, super lectum ita collocatur, vt verenda in
onspectu sint. Membrana, si adest, scalpello incidi-
ur, et exitus datur sanguini, alique humori, qui re-
ntus fuerat. Si vero per cicatricem orae inter se
nctae sunt, suspensa manu illae incidi, et inter se
luci, debent, diligentia adhibita, ne vrinae iter vio-
ur. Aperto igitur pudendo, demittenda est turun-
maior, pleniorque, etiam aliquo medicamento, ad
anguinem sistendum, vel cicatricem inducendam,
oneo respersa, vel madefacta. Sunt, qui ad id vtun-
r ampliori fistula, ex ebore facta, et crebrioribus ma-
ribusque foraminibus pertusa, vt effluere possit om-
s humor. Turunda, vel fistula, non prius recipi
bet, quam, donec, persanatis omnibus, cicatrix sit.

VTERI PROCIDENTIA.

§. 1444.

et ipse vterus, et illa pudendi pars, quam vaginam
appellant, procidere solet *. Vterus, aperto post
tum ore interno, quandoque inuersus procidit,
exime, si valenter inhaerescunt secundae, et vmbili-
s multum trahitur, vel, si obstetrix manu non secun-
s, sed vterum,prehendit, et adducit. Raro sic vte-
per dolores, qui vehementer post partum femi-
n excruciare solent, ita deuoluitur. Hoc vitii ge-
s cognoscitur ex ipso tumoris habitu, et si is globo-
propendet **. In huius mali curatione properan-
tem, et protinus vterus manu recondendus, est. Fe-
ma quietem seruare, et non aliter cubare, debet,
tam extentis cruribus, et compressis in vnum, etiam
licia deligatis, feminibus. Vbi deuolutus vterus non
protinus repositus fuit, isque contrahente se ore inter-

no, premitur, saepe feminae cita, et fere inopina, mori rapiuntur, vel iis magna inflammatio atque gangraena nascitur.

* Magna controuersia aliquando fuit, num ipse vterus precipitare possit. Vid. DAV. VAN DER BECKE *de Procidentia uteri*

** Vid. Obs. et figuram in RVYSCHII *Obs. Anat. Chirurg. Obs. X. p. 16. fig. 12.*

† Vid. *Ontleed en Heelkundige Verhandeling over de Uitzakkingen en Uitwassen der Lyfmoeder en Schede etc. Te Utrecht 1767. 8uo.* Item LEVRETTI *Dissert. in Journal de Médecine, par ROUX Tom. XI.*

§. 1445.

Totus autem vterus cum ore interno descendit et ex naturalibus partibus prolabitur, si eius sic dicta ligamenta, quibus vterus in sede sua continetur, cuncta caeteris partibus relaxata sunt *, vel, si vterus ipsa scirrhus similis, induratus est, et tumidus, atque sic periculosior, delabitur **. Nec hoc malum semper tolli potest, ubi enim vetustas accessit, parum spei superesse et ubi in vtero scirrhus, vel carcinoma, est, omnia rationibus irritantur. Si relaxata sunt ligamenta, vtrum recentiori re tolli potest. Resupina collocanda mulier, et id, quod deuolutum est, suspensa manu condendum. Admoueri possunt fomenta ex recrementibus, etiam suffimenta. Haec vero medicamenta si iis nimis valenter retenta fuerit materia, nocere possunt, quare praestat, pessis uti, quae naturalibus condita, vterum, ne rursus delabi possit, prohibent. Fiant autem ex subere, et cera obducuntur. Ut menstrualiisque humidis, in pudenda confluentibus exitus datur, pessos perforatos esse, conuenit, qui etiam magnitudini naturalium aptari debent ***. Prae ceteris omnibus quies necessaria est, et ut femina resupina cubet. Interdum, si vitium recens fuit, et femina iunior est, his pessis per tempus admotis, vterus in sedem suam

nam reuertit, et in ea manet. Aliis autem pessi auxilium per omnem vitam necessarium est.

* Vid. RVYSCH c. l. *Obs. IX. fig. II.*

** c. l. *Obs. VII. fig. 8.* et H. VAN SANDEN *Dissert. de Prolapsu vteri, Regiom. MDCCXII.*

*** Pessos delineatos vide in HEISTERI *Instit. Tab. XXXIV.* Alius modus describitur a THOMA SIMEON in *the Medical Essays Vol. III. Obs. XVIII. pag. 311.*

† De Pessis vid. apud WILLIAM SMELLIE *Tab. XXXVII.* LEVRETTI animaduersiones de pessis seu *Remarques sur les pessaires in Journal de Médec. Tom. XXXIV. et Tom. XXXVI. nec non Edinb. Essay. Tom. III. praecipue Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappye etc. te Harlem Deel. V.* In eiusdem societatis commentariis et *Tom. quidem XIXmo (Deel XIX.)* laudatur spongia marina, quae commodissime sedet, ac praeterea medicamentosos humores ex facili hauriens, partibus relaxatis robur quoddam reddere potest. De remedio hoc vid. quoque *Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte, Siebender Band.*

§. 1446.

Frequentissimum vero inter haec vitium est, si pueri, vel sic dictae vaginae, tunica relaxata procidit, cuius rei varius modus atque varia figura est. Interim ora circum circa resoluta deuoluitur, et, botuli quasi in modum, ex verendis dependet. Nonnunquam in vno latere id, quod relaxatum est, in tumorem excrescit ingentem, et qui verum atque ingens coma repraesentat. Id, quod descendit, non raro inflammationem accipit, quandoque etiam illud, quod vestimentis affricatur, exasperatur, induraturque. Alium plerumque nascitur, si a frequenti laboriosoque actu, vel a nimio humorum profluuiio, etiam ab adhaerentibus extrinsecus emollientibus, tunicae relaxatae sunt.

§. 1447.

Vitio, si recens est, mederi potest Chirurgus, si quod deuolutum est, recondit, et fomenta et suffraganea, quibus reprimendi facultas est, admouet. Oportet

tet vero, feminam quietem seruare, et supinam, compressis adstrictisque femoribus, iacere. Id, quod supra de medicamentis, quae menstrua suppressere possunt, dictum fuit, etiam hic sedulo tenendum est, quare confert, illo tempore, quo prouenire solent, a omni medicamentorum genere abstinere. Si inflammatio se ostendit, fomenta adhibenda sunt, aduersus eam idonea. Vbi autem in illis pudendi tunicis magna imbecillitas est, perfecta curatio sperari nequit, quare admota fascia id, quod descendit, inuoluendum est, ne iniuriis externis exasperetur. Si autem hoc in magnus tumorem excreuit, et hic ad radicem tenuior est, scalpello praecidi, vel, id quod magis tutum est, vinciendo tolli potest*.

* Vide figuram in MECKEREN *Obseru. Cap. 54.* Ante plures annos magnus eiusmodi tumor, ex naturalibus propenderat, ligatura prius iniecta, post, scalpello etiam adhibito, ablatus fuit, et mulier conualuit.

F I N I S.

A P P E N D I X


NONNVLLORVM

MEDICAMENTORVM

C O M P O S I T O R V M

HINC ET INDE

C I T A T O R V M.



I. Pulueres.

(§. 163.)

Rec. Farinae volatil.

Fabarum ana Vnc. j.

Cort. medii Sambuci

Fl. Sambuci ana Vnc. Sem.

Camphorae cum sacchar. contritae Drachm. ij.

M. F. Pulu. D. S. Puluis resoluens externe vsurp.

(§. 164.)

Rec. Farinae volatil. Vnc. vj.

Plumbi vsti

Bol. rubr. ana Vnc. ij.

Mastich. elect.

Oliban.

Cerussae ana Vnc. j.

M. F. Pulu. D. S. Pulu. Mynsichti ad erysipelas,

(§. 240.)

Rec. Ol. Cinamom.

Cort. Citri ana gtt. ij.

Caryophyll. gtt. j.

Sacchar. Canar. Drachm. ij.

M. F. Elaeosacch. admisce

Laudani opiat. gr. ij.

M. D. S. hora vna ante operationem fumend.

(§. 739.)

Rec. Rad. Scillae rec. Libr. Sem.

Pulu. Rad. Vincetox. Vnc. ij.

Cont. in pulpam, quae, in umbra siccata,
puluerif.

Ggg 4

Rec.

Rec. huius Puluer. Scrup. Sem.

Rad. Ari

Pimpinell. alb.

Nitr. dep. ana gr. v.

M. F. Pulu. pro vna doſſ.

II. Electuarium.

(§. 205. 390. 394. 417.)

Rec. Pulu. Cort. Peruu. opt. Vnc. Sem.

Confect. Alkerines Vnc. j.

M. diu. in 8. part. S. omni quadrihorio partem
vnam ſumend.

III. Boli,

(§. 505.)

Rec. Turpeth. mineral. gr. xij.

Lap. Contrayeru. Drachm. j.

Theriac. Andromach. q. ſ.

M. F. Boli No. III. D. S. quotidie ante cubitum vnum

IV. Emulſio.

(§. 124. 130.)

Rec. Sem. Papau. alb.

Card. Mariae.

Amygdal. dulc. excort. ana Drachm. ij.

Aq. Fragar. Vnc. iv.

Ceraſ. nigr. Vnc. ij.

M. F. Emulſio, adde

Baſſ. Peruu. Vitel. Ovi ſol. gtt. x-xv.

Syr. Althaeae Fernel. Drachm. iij.

M. D. S. omni bihorio cochl. j. ſumend.

V. Linctus,

(§. 137.)

Rec. Mucil. Sem. Cydonior. Vnc. ij.
 Mell. rosat.
 Rob. Diamor. ana Vnc. Sem.
 Nitr. dep. Drachm. Sem.
 M. D. S. interne ad collum.

(§. 914. 915.)

Rec. Aq. Theriacal, Vnc. j.
 Tinct. Myrrh.
 Ess. Succin. ana Drachm. Sem.
 Mell. rosat.
 Syr. Violar. ana Vnc. Sem.
 M. D. S. vt supra.

VI. Infusa vinosa,

(§. 739.)

Rec. Rad. Ari,
 Scillae,
 Bryoniae ana Vnc. j.
 Herb. Trifol. fibrin.
 Centaur. min. ana Mp. j.
 Bacc. Lauri,
 Cort. Winteran. ana Drachm. iij.
 Fol. Senae f. ft. Vnc. Sem.
 Rhabarb. opt. Vnc. j.
 Agarici in petia ligat. Drachm. ij.
 Sal. tart. Vnc. j

Conc. Cont. M. F. Species. D. in Sindone.

ad has species affunditur in vase bene obturato Mens.
 em. aquae feruentis, et postquam per aliquot horas lo-
 co calido stetit, iterumque refriguit, affunditur adhuc
 Mens. j. vini rhenani optimi, et in cella asseruatur. Quo-
 tidie de eo mane Vnc. ij. f. iij. bibuntur.

Ggg 5

(§. 267.)

(§. 267. 739.)

Rec. Sal. stipit. Fabar. Vnc. iij.
 affunde Aq. fontan.
 Vini Rhenan. merac. ana Libr. j.
 stent per noctem; bulliant hora matutina, D. S.
 Quotidie Vnc. j. ad ij. bis sumend.

VII. Apozema laxans.

(§. 63. 114. 191. 213. 269. 305. 496. 857. 901.
 1024. 1313.)

Rec. Pulp. Tamarind. Vnc. Sem.
 Crem. Tartari Drachm. j.
 Fol. Senae f. ft. Scrup. ij.
 M. Coq. in f. qu. Aq. fontan.
 Rec. Colatur. et in ea leni calore solue
 Mannae Calabr. rec. Vnc. j.
 Dep. add. cum pauco Sacchar.
 Ol. Syrae gtt. ij.
 D. S. Potio laxans pro vna dosi.

Aut:

Rec. Rhabarb. opt. Drachm. ij.
 Crem. Tartari Drachm. iſſ.
 Passul. minor. Vnc. Sem.
 M. Conc. Coq. in f. q. Aq. fontan.
 Rec. Colatur. et in ea leni calore solue
 Mannae Calabr. rec. Drachm. vj.
 Dep. add. cum pauco Sacchar.
 Ol. dest. Anisi gt. j.
 D. S. vt supra.

VIII. Ptisana.

(§. 64. 162. 191. 213. 269. 303. 400.)

Rec. Decoct. Hordei Libr. ij.

Oxym.

Oxym. simpl. Vnc. iij.

Syr. Acetof. Citri Vnc. iij.

M. D. S. de ea iteratis vicibus cochl. j. bibere potest.

Aut:

Rec. Tamarind. Vnc. ij.

Hordei mund.

Rad. Scorzon. ana. Vnc. j.

Herb. Acetof. Mp. iv.

Conc. M. Coq. in Aq. fontan. Mens. IV.
per quadrant. horae.

Rec. Colatur.

adde Rob. Ribes. Vnc. ij.

Nitri dep. Drach. iij.

Sol. M. D. S. vt supra,

IX. Decoctum Ligni sancti.

(§. 1055.)

Rec. Ras. Ligni sancti ponder. virid. Vnc. x.

Sal. Tartari Drachm. Sem.

Digere cum Aq. fontan. Libr. iv. per XXIV. horas
coq. per duas horas, sub finem adde Spiritus Vini
rectificatiss. Vnc. iv.

Colat. D. S. quatuor de die Vnc. iv. bibend.

Aut:

Rec. Rasur. Ligni sanct. pond. Vnc. vj.

Sal. Tartari Drachm. j.

M. Coq. per horam in vase clauso cum

Aq. fontan. Mens. IV,

post horam adde

Rad. Polypod. Vnc. iſſ.

Cort. Ligni Sassafr. Vnc. j.

Coq. adhuc per dimid. horae, Colat.

D. S. vt supra.

X. Gar-

X. Gargarismata.

(§. 135.)

Rec. Rad. Althaeae.

Bistortae ana Vnc. j.

Herb. Salviae

Prunel. ana Mp. ij.

Fl. Sambuc.

Rosar. ana Pug. ij.

Conc. M. Coq. in f. q. Aq. fontan.

Rec. Colat. Libr. j.

adde Rob. Dianuc. Vnc. Sem.

Nitri dep. Drachm. iſs.

Sol. D. S. Gargarisma

(§. 136.)

Rec. Rad. Althaeae Vnc. ij.

Herb. Parietar.

Mercurial. ana Mp. j.

Fl. Malvae

Papav. errat. ana Pug. iij.

Sem. Foenu graec. Vnc. j.

Conc. Cont. M. Coq. in Aq. fontan. Mens. iij. per quadrant. horae.

Rec. Colatur. Libr. ij.

adde Syr. Capillor. Vener. Monsp.

Althaeae Fernel. ana Vnc. iſs.

M. D. S. Gargarisma emolliens.

Aut;

Rec. Herb. Parietar.

Violar. ana Mp. ij.

Fl. Verbasci Pug. iij.

Caricar. pingu. No. VIII.

Conc. M. Coq. in f. q. Aq. fontan. per quadrant. horae.

Rec.

Rec. Colatur. Libr. ij.

adde Mel. rofat.

Rob Diamor. ana Vnc. j.

Nitri dep. Drachm. ij.

Spirit. Sulphur. gtt. xv.

M. D. S. vt supra.

IX. Clysteres.

(§. 63. 167. 305. 659. 682. 811. 840. 1016.
1023. 1024. 1313.)

Rec. Spec. Emollient. Vnc. j.

Sem. Carui Vnc. Sem.

M. Coq. in f. q. Seri lactis vel lactis ebutyrati.

Rec. Colatur. Libr. j.

adde Mel. despum. Vnc. iſſ.

Ol. Lilior. alb. Vnc. Sem.

Nitri dep. Drach. iſſ.

M. F. Clyster. App.

(§. 505.)

Rec. Aq. Selteran. Vnc. viij.

Nitri dep. Drachm. iſſ.

Mel. rofat. Vnc. j.

M. F. Clyster. Appl.

Aut:

Rec. Decoct. Hordei Vnc. viij.

Nitri dep. Drachm. ij.

Aceti corn.

Syr. Rosar. pallid. ana Vnc. j.

M. F. Clyster. Appl.

(§. 659. 811. 1313.)

Rec. Sapon. Venet. Drach. vj.

Coq. in f. q. Seri lactis.

Rec. Colat. Vnc. x.

adde Mellis Vnc. Sem.

M. F. Clyster. Appl.

(§. 811.)

(§. 811.)

Rec. Rad. Althaeae Vnc. j.

Fl. Chamomill. Mp. ij.

Fol. Peti Drachm. iſſ.

Conc. M. Coq. in f. q. Aq. fontan.

Rec. Colatur. Libr. j.

adde Elect. Hierae picrae

Mel. anthos. ana Vnc. Sem.

Sal. com. Drachm. j.

Sol. M. F. Clyster. Appl.

XII. Iniectio.

(§. 906.)

Rec. Cort. Ligni ſancti ſubtiliſ. pulueriſ. Vnc. iv.

Rad. Ariſtoloſch. long. Drachm. ij

Herb. Agrim.

Abſinth. ana Miſſ.

Myrrhae Vnc. j.

Mellis Vnc. iij.

M. F. cum Vini rubri Libr. iv. Decoctum

Colat. appl. vel iniiciat.

XIII. Epithemata.

(§. 76. 723. 1115.)

Rec. Rad. Tormentil.

Biſtortae ana Vnc. Sem.

Herb. Rutae

Abſinth.

Fl. Sambuc. ana Mp. j.

Conc. M. Coq. in Vini Gallici rubri libr. iſſ.

Colat. D.

(§. 79. 521. 723.)

Rec. Herb. Scordii j.

Rutae

Abſinth.

Origan. ana Mp. j.

Conc. M. Coq. cum Vini Rhen.

Aq. fontan. ana Libr j.

Colat. add. Aq. Prophylact. Vnc. ij.

M. D.

(§. 193. 195. 723.)

Rec. Herb. Rutae

Abfinth.

Maluae ana Mp. jv.

Alliar. Mp. j.

Farin. Sem. Lini Vnc. j.

M. Coq. in vase clauso cum Acet. et Aq. fontan.
ana q. f.

Rec. Colat. Libr. iv.

adde Sal. Ammoniac. Vnc. Sem.

Spir. Matric. Vnc. j.

Sol. M. D.

Aut:

Rec. Aceti destil. Vnc. ij.

Aq. Menth. Libr. j.

Sal. Ammoniac. Drachm. ij.

Vini albi Vnc. vj.

M. Sol. D.

(§. 300.)

Rec. Herb. Rutae

Millefol.

Abfinth. ana Mp. Sem.

Malicorii Vnc. Sem.

Sem. Foenicul. Drachm. ij.

Conc. M. Coq. dimid. horae cum

Vini rubri Gallici Mens. j.

Col. D.

(§. 743.)

(§. 743.)

Rec. Lithargyr. Vnc. j.

G. Animæ

Myrrhae ana Vnc. Sem.

M. Coq. cum Vini rubri Gallici Libr. ij.

Col. D.

XIV. Cataplasmata.

(§. 91. 104. 146. 192. 202. 810.)

Rec. Rad. Athæææ Vnc. ij.

Herb. Parietar.

Verbasci

Melilot. ana Mp. j.

Farin. Sem. Lini Vnc. iij.

M. Coq. cum s. q. Lactis ad Consist. Catapl.

Aut :

Rec. Rad. Lilior. alb. Vnc. ij.

Herb. Maluae

Melilot. ana Mp. ij.

Absinth. Mp. j.

Pulu M. Coq. cum s. q. Aq. fontan. ad Consist.
Catapl. adde

Farin. Sem. Lini.

Foen. graec. ana Vnc. jß.

Ol. Lilior. alb. q. f.

(§. 92. 104.)

Rec. Mel. ad spissitud. coct. Vnc. iij.

Cepar. vstulat. Vnc. jß.

Gum. Galban. in Acet. sol.

Sapon. Venet. ana Vnc. j.

M. F. c. f. q. Ol. Verbasc. l. a. Cataplasma.

Au

Aut:

Rec. Caricar. pingu. Vnc. iij.

Cepar. vstulat. Drachm. iij.

1. Coq. cum pauca Aq. ad Consist. Catapl.

adde Farinae Sem. Lini Vnc. iſſ.

Ol. Lini Vnc. ij.

M. F. Catapl.

(§. 135. 136. 222. 454.)

Rec. Micae Panis cand. Vnc. vj.

Pulu. Herb. Hyoscyam.

Melilot. ana Vnc. ij.

Coq. in f. q. Lact. ad Consist. Catapl.

adde Croci Or. Drachm. Sem.

Ol. Lilior. alb. Vnc. ij.

Vitel. Ouor. No. iij.

M. F. Catapl.

XV. Vnguenta.

Vnguentum de Tutia.

§. 228. 292. 300. 316. 323. 333. 334. 583.
585. 586. 771.)

Rec. Tutiae a sordibus repurgatae Vnc. jv.

Igniatur decies et extinguitur Vino alb.

ne trita et lota conuert. in Pulu. subtiliss.

Rec. huius Pulu. Drachm. j.

Butyr. Majal. vel Axung. Capon. rec. Drachm. iij.

Gum. Ammon. Scrup. Sem.

M. F. Liniment.

Hhh

(§. 292.)

Vnguent. Ophthalm. rubr.

(§. 292.)

Rec. Butyr. Majal. Vnc. iij.

Ceraë alb. virgin. Drachm. iij.

Fund. leni igne, adde

Mercur. praecip. rubr. bene triti Drachm.

M. exacte D.

Vnguent. digest.

(§. 202. 384. 386. 389. 952.)

Rec. Terebinth. Venet. lot. Vnc. ij.

Vitell. Ovi No. j.

Croci Or. Scrup. §.

M. exacte add.

Ol. Hyperic. q. f.

Aut :

Rec. Terebinth. Venet. Vnc. j.

Vitel. Ovi No. j

exacte M. adde

Mel. Rosat. Vnc. Sem.

M. adde denuo

Aloës

Myrrh. subtiliss. puluerifat. ana Drachm.

Sapon. Venet. subt. rasi Drachm. j.

M.

Vnguent. neruin.

(§. 445. 1116.)

Rec. Vnguent. Neruin. off. Vnc. j.

Balsam. Peruuian. Drachm. ij.

Ol. dest. Caryophyl.

Lauendul.

Macis ana Drachm. Sem.

M. D.

Bals. Arcae.

(§. 147. 387. 396. 522. 704.)

Rec. Terebinth. Venet.

G. Elemi ana Vnc. Sem.

Pingued. castrat. Vnc. ij.

Porcin. antiq. Vnc. j.

Liquefiant ad ignem F. Liniment.

XVI. Emplastra.

Empl. defens. vir. Würtz.

(§. 76. 168. 1115. 1232.)

Rec. Cerae citrin.

Resin. ana Vnc. viij.

Seui hircin.

Terebinth. ana Vnc. vj.

Pulu. Herb. Alchimill. Vnc. iv.

M. F. l. a. Empl.

(§. 267.)

Rec. G. Galban.

Opoponac.

Ammoniac. ana Vnc. j.

Myrrhae Vnc. Sem.

Hhh 2

Cam-

Camphorae Drachm. j.
 Ol. Lilior. alb.
 Axung. Anat. ana Drachm. vj.
 Cerae q. f.
 M. F. l. a. Emplast.

Empl. de Minio Harris.

(§. 274.)

Rec. Ol. Oliuar. Libr. j.
 Chamaem. Vnc. ij.
 Vngu. Popul. Vnc. vj.
 post debitam illorum agitationem cum spatula super
 ignem, adde
 Minii Libr. Sem. et denique dissolue
 Cerae alb. in frustula contractae Vnc. i
 Continuetur agitatio, donec reducatur in Massam
 Emplastri.

Emplast. Diaphor. Myns.

(§. 115. 125. 132. 136. 168. 267. 723. 724.
 855. 1217.)

Rec. Cerae flau. Vnc. ix.
 Colophon.
 G. Bdell. ana Vnc. iv.
 Ammon. cum Aceto dep. Vnc. ij.
 Mastich. el.
 Olibani ana Vnc. Sem.
 Sandarac. Vnc. j.
 Succin. flau. Vnc. iij.
 Terebinth. Venet. Vnc. ij.
 Cerae cum Coloph. liquatae et ab igne sepos. ac paulu-
 lum refriger. Tereb. G. Ammon. colliq. et tandem
 reliqua pulueris. admisc.

Emplast

Emplast. Saponat. Barb.

(§. 146. 723. 855.)

Rec. Ol. Oliuar. Vnc. xx.

Sapon. Venet. Vnc. iij.

Minii.

Ceruss. ana Libr. Sem.

M. F. l. a. Emplast.

XVII. Collyria.

(§. 291.)

Rec. Aq. Foenicul.

Rosar. f. Sal. ana Vnc. ij.

Tutiae praepar. Scrup. j.

Vitriol. calcin gr. viij.

M.

(§. 300.)

Rec. Aq. Rosar.

Plantag. ana Vnc. ij.

Vulnerar. non spirituof. Drachm. vj.

Tutiae praepar. Scrup. Sem.

M.

(§. 300. 305. 306.)

R. Aq. Foenicul. Vnc. iv.

Lap. Diuini gr. iij.

Croci Metall. gr. v.

Sol. M.

XVIII. Lapis diuinus.

(§. 300. 305. 306. 910. 916.)

Rec. Nitri

Vitrioli

Alumin. ana Libr. Sem.

M. Fluant in Crucibulo, sub finem adde

Camphorae Drachm. j.

Eff. feru. Vñ.

XIX. Liquor Bellostii.

(§. 201. 214. 1060.)

Rec. Mercur. curr. Vnc. j.

Aq. fortis Vnc. ij.

Sol. in loco calido, deinde adde

Aq. fontan. vel distil. Libr. vj.

M.

XX. Aqua Phagedaenica.

(§. 274. 737. 782. 910. 913. 950.)

Rec. Calc. viuae Libr. Sem.

Aq. fontan. feruid. Mens. ij.

M. agitat. effund. per Inclinat.

Rec. huius Aq. Calc. Libr. j.

Merc. sublimat. Scrup. Sem. vel gr. xv.

M. l. a.

A D D E N D A.

Quaquam fortasse, quae lectoribus rerum chirurgicarum gnaris in hoc libro omissa esse videantur, tam multa sint, ut breui spicilegio colligi, et paucis hactenus describi non prorsus possint, nolui tamen committere, ut solertia mea in iis quoque desideraretur, quae vel cognita mihi ac perspecta addi poterant, nisi obstinante calamo et urgentibus operis, subinde tempe-
 ssem, vel sero demum, attamen sic satis tempestive, et notitiam meam venerunt, ut absoluto operi subiungi possent. Sunt autem fere haec pauca:

§. 607. Commendanda erat PETITI observatio, quae medicos (vid. *Monum. Acad. R. Scient. Paris.*) docuit, infantes teneriores posse linguam suam ita replicare et quasi vorare, ut, respiratione primo multum impedita, deinde prorsus cohibita, suffocati moriantur. Eius periculi notae sunt, si, nulla alia causa data, puer in-
 ans difficulter et multo cum labore spiritum ducit, facies eius tumet turgetque ac rubet. Cognitae causa-
 ae remedium in promptu est. Linguam ad superiora et posteriora reflexam si chirurgus digito in os dato ad anteriora et inferiora oris retrahit, pristina libertas respirationis protinus infanti redditur.

§. 821. not. lin. 4. pro *iliis* lege *ilibus*.

§. 831. Pro *lineamque albam versus* legendum *ilia-
 que versus*;

§. 872. Singularem acum triquetram descripsit JOHN ANDREE in *Account of an Elastic Trochar for
 Tapping the Hydrocele etc.* London 1781.-

Ad cap. de Ulceribus §. 914. mentio facienda erat
 dissertationis, quam de utilitate caloris actualis, in per-
 sanandis

sanandis vlceribus, conspicua conscripsit FAVRE. Ligitur autem in Vol. v. *Monument. Acad. R. Chir. Paris*

De commodis a spongia marina in vlcerum veterum curatione sperandis scripsit G. I. VAN WYI *Handelingen van het geneeskundig Genootschap, onder DZINSPRECK: Seruandis ciuibus. Deel I.* Ex belgico sermone in linguam Germaniae superioris translata elegas in *Auserlesenen Abhandlungen für praktische Aerzte et Siebenden Bande.*

§. 1142. Excitandus erat CHRIST. GOTTL. LUDWIGVS, quondam noster, qui in Volum. II. *Aduersar. med. pract.* de caussis scolioseos optime scripsit. Pollicum CORNELIVS HENRIC. A ROY edidit *Commentationem anatomico-chirurgicam de scoliosi Lugd. Batav. 1774.* quam legisse iuuabit.

§. 1145. Obseruationes recentiores illae, quas PERCIVAL POTT cum chirurgis communicauit, imprimis ad locum hunc pertinent. Leguntur autem in *Remarks on that Kind of Palsy of the lower Limbs, which is frequently found to accompany a curvature of the spine, and is supposed, to be caused by it etc.* London 1779. itemque in *Farther Remarks on the useless state of the lower Limbs in consequence of a curvature of the Spine, being a Supplement to a former Treatise on that subject*, by PERCIVAL POTT, London 1782. Docet autem vir peritissimus imbecillitatem extremitatum inferiorum illam, qua multi gibberosorum hominum laborant, et quae in iis a paralytica affectione propior est, non a curuatura spinae, verum gibberositatem spinae et imbecillitatem crurum a causa communi quadam, effici, eamque fere in aliquo vitio humorum et metastasi ad vertebrae et ligamenta conuersorum cerni. Et cum ex medico docto, cui CAMERON nomen est, intellexisset, vlcere in loco curuaturae arte facto,

Sto, sanatam esse eius generis paralyfin, idem genus
 curandi in non paucis gibberosus affectione crurum pa-
 ralytica laborantibus, adhibuit, et saltem crura confir-
 mata, saepe quoque gibber sublatum magna cum ani-
 mi voluptate vidit. Seu setaceis seu fonticulis usus fue-
 rit, idem effectum est. Solet tamen fonticulos exci-
 tare, in utroque quidem gibberis latere vnum. Haec
 quidem POTT. Ego vero crurum imbecillitatem in
 gibberosus semper non tam a gibbere, quam a causa
 quadam gibberis et affectionis illius paralyticae com-
 muni effici, vix crediderim. Quotquot enim gibbere
 spinae affecti sunt, habent illi omnes femora et crura
 parum bene nutrita. Non tamen omnes gibberosus
 a causa interna difformitatem spinae suae contra-
 herunt.

§. 1175. Hoc ipso temporis momento, quo adden-
 da haec conscribebam, in manus incidit nouissimo an-
 no edita, ANDREAE BONN *Commentatio de Humero*
luxato, Lugd. Batav. 1782. In qua humeri articulus et
 vicinae partes accurate describuntur, Auctorum sen-
 tentiae de luxatione humeri exponuntur, observationes
 numeri luxati anatomicae leguntur, experimenta ana-
 tomica in cadaueribus instituta adducuntur, denique
 diagnosi, prognosis et curatio ita proponuntur, ut
 nihil praeterea desideres, sed Auctori de diligenti tra-
 ctatione sumtae sibi materiae gratias agas habeasque;
 egisse certe non poenitebit. Per temporis rationem
 mihi non licuit esse prolixiori.

§. 1445. ad not. † de pessis. De his legatur quo-
 que IOH. THEBESII *Hebammenkunst. Liegnitz 1759.*
 in 8vo. Nam Tabula decima et in ea figura decima
 sexta exhibet iconem fasciae eius, quam FRIEDIVS, ce-
 leberrimus quondam apud Argentoratenses obstetri-
 ciae artis Doctor, ad retinenda pessaria, nemini non
 cognita illa, vtilem iudicauit et commendauit. Videatur
 Hhh 5 etiam

etiam *Essay sur l'abus de regles generales*, qui s'opposent aux progrès de l'Art des accouchemens par Mr. LEVRET, à Paris 1766. pag. 164. De usu spongiae marinae vulgaribus pessis substituendae et humore adstringente quodam imbuendae, praeter volumen XIX Societatis Harlemonsis in nota §. 1445 adductum, videas, si lubet IOH. LEACKE anglice scriptum librum de curatione morborum diuturnorum sexus sequioris, quem in vernaculam suam versum legere Germani possunt. Inscriptus est: JOHN LEACE *Anleitung zur Heilung der Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Leipzig 1779.*
pag. 95.

F I G U R A R V M

E X P L I C A T I O

Tab. I.

Fig. I. Turundarum genus, quod Galli *les Meches* appellant, et quo in curationibus fistularum, quae ad anum sunt, potissimum utuntur. §. 20. 1009.

Fig. II. Pilae, seu glomi minores, Gallis *Pelottes*. In herniarum curationibus imponuntur vulnere. §. 21. 839.

Fig. III. Glomus maior, Gallis *le Gateau*, imponitur, postquam membrum praecisum fuit. §. 21. 239.

Fig. IV. Minores glomi, quibus, si caluaria modiolis excisa fuit, foramina implentur. §. 21. 563. 2. 571.

Fig. V. Linteolum caesitium, cuius ora in fila resoluta est, quod, loco turundae, in pectoris vulnera demittitur. §. 22. 639.

Fig. IX. Minora instrumenta, ex argento, quae cuspides acutas ex chalybe habent. Ea *woolhoysius* scarificatoria vocabat, quae extenuandis leucomatis, aliisque cicatricibus corneae, adhiberi possunt. §. 319. 320.

Tab. II.

Fig. X. Machina *SENFFII* pro comprimendo Aneurysmate. §. 432.

a) Cochlea, qua mediante pila

b) apprimitur tumori.

cc) ferrei vinci, quibus lora,

dd) quae brachium comprehendunt, innectuntur.

Tab. III.

Fig. VI. N. 1. et 2. Lanceola, cuius cuspis incurua est. Aptae sunt aperiendis in oculo pustulis ardentibus. §. 228. et 310.

Fig.

Fig. VII. Torcular, quod apud nos B. HAGEMEYERVS construxit. §. 237*.

Fig. XI. Acus maior ampliorque ex argento, arteriae in Aneurysmatis curatione vinciendae idonea, a PETITO inuenta. §. 438.

Tab. IV.

Fig. XII. Forceps, qua ossiculum eiicitur, si caluariae modiolus excisus fuit, a SHABPIO delineata. §. 562*.

Fig. VIII. Ferramentum, quo nonnulli vtuntur ad oras foraminis modiolus facti circumradendas, loco scalpelli excisorii, qui retusus lenticulam habet. §. 562.

Fig. XVII. Syringotomus SENFFII. §. 954.

Tab. V.

Fig. XIV. Ferramentum extrema sua parte incisum, quo linguae frenulum excipitur, vt tuto possit incidere. §. 607.

Fig. XV. Aliud Instrumentum, eidem chirurgiae aptatum, cui scalpellus minor, elatere mouendus, affixus est. v. c. l. §. 607.

Fig. XVI. Scalpellus anceps, in cuspide glebulam habens, ampliandis pectoris vulneribus idoneus. §. 637.

Tab. VI.

Fig. XIII. Instrumentum, quo vterque oculus comprimitur. §. 589. 754.

Fig. XVIII. Machina reponendo humero accommodata §. 1175.

I N D E X

Numerus §. indicat, * vero notas.

- Abdominis vulnera* caute exploranda 660. seq. quae intus penetant 671. quibus internae partes laesae sunt 655. seq. et 661. eorum curatio varia 680 seq. et 700. seq. noua sectione quomodo amplianda 689. eorum futura vel γαστρώσαφλα 659. 702. eorum post hanc curatio 705. ex iis saepe hernia ventris relinquitur 659. 790. 821. linea alba laesa, quae inde oriantur pericula 657. seq.
- Abscessus* differt a phlegmone 73. non facile 96. interdum tamen crudus incidendus 96. 993. aperitur adurentibus 97. Scalpello 98. Abscessus aperti curatio 99. seq. raro soluitur per vrinam 88. vid. *Pus et Suppuratio*.
- Achlys* 311 *
- Aduſta*, eorum diuersitas ratione causarum et sedis 215. seq. curatio varia 222. seq.
- Aegilops*, nominis etymon 313 *. vid. *Fistula lachrymalis*.
- Amaurosis* 1309. 1312. seq.
- Amputatio* quando instituenda 229. seq. veterum methodus 231. eius apparatus 237. seq. digitorum 232. seq. manus 236. brachii 240. seq. membrorum truncatorum curatio 246. seq. amputatio humeri 249. humeri ex articulo 251. cruris 248. Verduini et Sabourini methodus 252. femoris 250
- Anasarca* 733. eius curatio 737
- Anchilops* 969
- Ancyloblepharum* 331. seq.
- Ancylosis* 1214. seq.
- Aneurysma*, eius differentia 419. veri descriptio ibid. notae 421. seq. causae 424. seq. exitus 429. curatio varia 431. seq. et 443. spurii descriptio 420. notae 423. causae 428. exitus 430. curatio 436. seq. cur gleba ex vitriolo vulneratae arteriae non obliicienda? 444. post aneurysmatis curationem relicta membri debilitas qua ratione tollenda? 445
- Angina* 138
- Ani* musculi et vasa 989. circa illum abscessus, vlcera, fistulae; harum noxarum causae 990. seq. futuri abscessus signa 992. eius curatio 993. seq. fistularum tria genera 997. seq. illae quomodo explorandae 1001. illarum prognosis 1002. curatio 1103. Ani procidentia 1022. seq. Anus praecclusus 1026. seq.
- Anthrax* vid. *Carbunculus*.
- Aphtae* 923
- Ἀπόχνηα vid. *Caluaria*.
- Ἀποσκεπατισμός vid. *Caluaria*.
- Argemon* 311
- Arteria*, eius vulneratae maioris pericula 353. signa et curatio 446. incisae aliqua parte quae superueniunt 354. quomodo vincien-

vincienda 242. seq. ad cruralem arteriam comprimendam	
machina 244*. arteriae intercostalis praecisae signa 628. cu-	
ratio 643. quomodo haec comprimenda	1261
<i>Arteriotome</i>	1294. seqq
<i>Articulorum</i> varia genera 1094. axungia 1099. seq. eorum vulne-	
ribus, quae accidunt?	357. 485. seq
<i>Asa foetida</i> ad cariem ossium prodest	1053
<i>Ascites</i> 733. eius causae et curatio	755. seqq
<i>Atheroma</i>	755
<i>Atretae</i>	1442
<i>Aurium</i> vulnera	596

B.

<i>Bacilla</i> vid. <i>Cerei</i> .	
<i>Belladonna</i> dicta utilis ad cancerum	267
<i>Brachii</i> amputatio vid. <i>Amputatio</i> . fractura	1268. seq
<i>Bronchotomia</i> 614. seq. aquis submersis et praefocatis an adhi-	
benda?	618
<i>Bubo</i> , eius et bubonocles signa 123. venereus 124. seq. pesti-	
lens 127. ex lymphae redundantia vulgo <i>Wachsbeulen</i>	128
<i>Bubonocle</i> vid. <i>Hernia</i> .	

C.

<i>Caecitas</i> ex vulneribus superciliorum	1327
<i>Calculi</i> sub lingua 608. renum an educi possint 1356. Nephro-	
tomiae historia 1356 **. calculorum vesicae causae 1358. no-	
tae 1359. illi sectione eximendi 1356. Lithotomiae historia	
1356 *. ea est periculosa 1357. 1360. ad eam aeger quomodo	
praeparandus 1361. diuersa ratione debet fieri in variis aegris	
1362. et 1397. eius quae magno apparatu fit methodus 1363.	
seq. sectio lateralis secundum Rauium 1375. seq. Cheseldenum	
1377. seqq. Fulbertum 1380. seq. le Dran 1385. Sectio Celsicae	
vel eum paruo apparatu 1387. seq. Sectio quae fit alto appa-	
ratu, vel hypogastrica 1390. seq. Calculorum in vrinae itinere	
inhaerescantium curatio 1398. seqq. Calculo feminae rarius	
laborant 1405. in his extrahitur saepe sine sectione 1406. is	
quomodo sectione tollendus	1408. seq.
<i>Callus</i> in fistula quid sit, et quomodo tolli possit 943. 949. seq. 955	
<i>Caluariae</i> periostio suo nudatae quae applicanda auxilia? 524. seq.	
ea percussa tribus modis violatur 527. huius lacerationis varia	
genera: ἔδρα, ἐκκοπή, διακοπή, ἀποσπένανσιμος 528. Caluariae	
depressio, θλάσις 529. eius curatio 556. ἐσφλασις vel ἐνθλασις	
529. 557. seq. ἐκπίεσμα 529. ἀγγίσωμα et καμάρωσις 539. Calua-	
riae fissurae seu ῥήγμα 530. ῥωγμή ibid. τριχισμός 530. 548.	
ἐπόχημα, contrafissura vel resonitus 530 ***. huius varii modi	
531. non facile curatur 548. sub caluaria humor extra vasa mis-	
sus, quae habeat pericula 535. hic quomodo educendus 561.	
seq. Caluariae modiolio excisae curatio 573. eius futurae per-	
cussae periculum adferunt 545. fracta vel fissa caluaria non	
semper modiolum requirit 552. Caluaria extrinsecus, et ad	
diptoen, percussa modiolio excidenda	553

Gamareus

<i>Camaropsis</i> vid. <i>Caluaria</i> .	
<i>Cancer</i> , eius hystoria 265. cancer mammarum et eius curatio 270. labrorum 271. canceri curatio palliativa 272. seq.	
<i>Candelae</i> vid. <i>Cerei</i> .	
<i>Canis rabidi</i> morsus vid. <i>Hydrophobia</i> .	
<i>Caput obstipum</i> 1124. capitis contusio sine vulnere 521. seq. ad capitis vulnera quae referantur? 509. seq. quae periculosa? 541. seq. ab initio leuiores aliquando mortifera fiunt 512. eo- rum prognosis incerta 513. capitis externae partes saepe non sine periculo laeduntur 514. vulneris simplicis in capite cu- ratio 515. seq. vulneris collisi curatio 518. illi saepe superue- nit <i>Emphysema</i> 519. et inflammatio et erysipelas 520. capitis cum ceruice articulus 1120. si hic excidit quae sequantur? 1123	
<i>Carbunculus</i>	107. seq.
<i>Cartes</i> ossium 1032. eius signa 1040. et 1046. seq. causae 523. et 1040 et 1049. prognosis 1050. seq. curatio 1052. seq.	
<i>Caruncula</i> in vrethra	1335
<i>Cataracta</i> vid. <i>Suffusio</i> .	
<i>Cateteres</i> , eorum varia genera 1338. seq. eos demittendi in vesti- cam ratio	1341. seq.
<i>Cauteria</i> 926. eorum vsus	935
<i>Cerebri</i> commotio 511 *. fungus 571. seq. vlcus	570
<i>Cerei</i> eorumque vsus	1336
<i>Ceruicis</i> vulnera	609
<i>Chalazion</i>	770
<i>Chemosis</i>	276
<i>Chirurgia</i> 1. eius vsus 2. diuisio in medicam et manulem 3. seq. eius cum medicina nexus 6. quomodo discenda 8. eius scri- ptores optimi	27
<i>Chirurgus</i> qualis esse debeat 11. eius suppellex	12. seq.
<i>Cicatrix</i> 352. quomodo inducenda 396. eam deformem quae fa- ciunt 397. quomodo haec possit auerti	398
<i>Cicuta</i> utilis ad cancerum	267
<i>Cirfocele</i> vid. <i>Hernia</i> .	
<i>Clauus</i>	890. seq.
<i>Coccyx</i> , eius cum osse sacro commissura et huius emotio 1151. seq.	
<i>Collum</i> , eius vulnera	610. seq.
<i>Collyria</i> aquosa, saepe nocent	313.
<i>Condylomata</i> in intestino recto	1019. seq.
<i>Contrafissura</i> vid. <i>Caluaria</i> .	
<i>Cornea</i> humore turgida et opaca 316. eius cicatrices 317. ha- rum recentium curatio 318. crassae et splendentes num tolli queant 319. Vlcera vid. <i>Vlcus</i> .	
<i>Cortex Peruvianus</i> laudatur ad gangraenam ex imbecillitate or- tam	205
<i>Costae</i> , harum cum vertebris articuli 1153. seq. luxantur 1149. earum repositio 1150. fractura	626. et 1260. seq.
<i>Crotaphites</i> musculus, eius laesio	544

Crus eius amputatio vid. *Amputatio*, eius fractura 1275. crurum
 ulcera 91
Cubitus, eius articulus cum humero et radio 1177. seq. luxatus
 1179. reponitur 1180. et 1182. fascia huic articulo luxato ido-
 nea 1183. cubiti fractura 1266

Cystocele vid. *Hernia*.

D.

Dentes, eorum historia 1074. seq. Dentitionis dolores quomodo
 mitigandi 1077. seq. Dentes quae laedunt 1079. seq. quae eo-
 tuentur 1081. dentium dolor 1082. caries 1083. euulsio
 1084. seq.

Diacope vid. *Caluaria*.

Diaphragmatis vulnerati symptomata 662. pericula 670

Dolor 48. acutus a laeso nervo 448. seq. Dentium vid. *Dentes*
 grauis in vulneribus periculum significat 450. eius causae 447
 aduersus eum auxilia 451. seq.

Ductus salivaris Stenosis vulneratus et eius curatio 594. seq.

Dura mater quando incidenda? 567. seq. patefactae alienatae
 que curatio 566

E.

Ecchymosis 712. eius curatio 723. seq.

Eccope vid. *Caluaria*.

Ectropisma vid. *Caluaria*.

Ectropium 582. seq.

Emollientia sunt duplicis generis 91

Emphysema capitis vulnere 519. pectoris vulnere superueniens
 621. *** eius curatio 644

Emplastrum 28

Empyema 647. seq. soluitur quandoque alui et urinae purulenti-
 to profluuium 653. eius chirurgia 646. seq.

Encauma 311

Engisoma vid. *Caluaria*.

Enterocoele vid. *Hernia*.

Enteroraphe 693. seq.

Entblasis vid. *Caluaria*.

Epicauma 311

Epiplocele vid. *Hernia*.

Epulis 1089

Erysipelas 156. eius notae 157. differt a phlegmone 73. et ab
 herpete 919. illius causae 157. et 159. seq. tria genera 158.
 sedes 157. et 160. prognosis et curatio per remedia interna
 162. et externa 163. seq. et quae fugienda 167. post illud re-
 manens tumor durus atque vlcus quomodo tractandum 168.
 illud aliquando capitis vulnere superuenit 520

Espblasis vid. *Caluaria*.

Exfoliatio 1035

Exomphalos vid. *Hernia*.

Exostosis 1032. benignae causae 1041. seq. malignae causae, in-
 dicia et curatio 1043. seq.
 F. Faciei

F.

<i>faciei vulnera</i>	576
<i>fasciae</i>	14. seq.
<i>caucium ardor, eius curatio</i> 137. <i>inflammatio, eius curatio</i> 138	
<i>febris vulneraria vel symptomatrica</i>	49. seq.
<i>emur, eius cum coxa articulus</i> 1191. <i>cum crure et patella</i> 1202.	
<i>seq. eius fractura</i> 1271. <i>raro luxatur saepius frangitur</i> 1192.	
<i>qua occasione illud luxetur?</i> 1193. <i>seq. signa, illud luxatum</i>	
<i>esse vel fractum</i> 1195. <i>seq. quibus modis illud laxari possit</i>	
<i>1197. seq. luxati femoris symptomata</i> 1199. <i>vt ne articulo</i>	
<i>excidat interdum potest auerti</i> 1201. <i>reponitur</i> 1200. <i>femo-</i>	
<i>ris amputatio vid. Amputatio.</i>	
<i>fistulae cum tibia et talo commissura</i> 1206. <i>illa luxatur</i> 1207.	
<i>frangitur</i>	1275
<i>fistula</i> 942. <i>fistularum sedes et varia genera</i> 944. <i>eas explo-</i>	
<i>randi ratio et illarum signa</i> 945 <i>seq. causae, prognosis, curatio</i>	
<i>947. seq. Ani fistula vid. Anus. Lacrymalis fistula, vid. La-</i>	
<i>crymae.</i>	
<i>articulus</i> 926. <i>varii eum excitandi modi</i> 928. <i>seq. quatenam se-</i>	
<i>des fonticulo oportunae sint</i> 927. <i>in summo capite</i> 930. <i>in</i>	
<i>brachia</i> 931. <i>in brachio, femore, crure</i> 932. <i>eum conseruandi</i>	
<i>ratio</i> 933. <i>eius vsus</i>	934
<i>acta, eorum causae</i> 1219. <i>seq. signa</i> 1122. <i>seq. prognosis</i> 1225.	
<i>seq. ad horum curationem quarum rerum cognitio necessaria</i>	
<i>1221. ipsa curatio</i> 1227. <i>seq. aliquando luxatum os etiam fra-</i>	
<i>ctum est</i> 1119. <i>singulorum ossium fracturas vide suo loco.</i>	
<i>figus, eius affectus in corpus</i> 207. <i>eo rigentium membrorum</i>	
<i>curatio</i>	208 seq.
<i>figus cerebri vid. Cerebrum.</i>	
<i>fungulus</i>	102. seq.

G.

<i>gaglion</i>	772. seq.
<i>gagraena</i> 169. <i>eius sedes frequentissima</i> 56. <i>et</i> 170. <i>causae</i> 55.	
<i>ratia discrimina ratione cautelarum, quae etiam variae sunt</i> 178.	
<i>eq. signa</i> 171. <i>seq. prognosis</i> 189. <i>curatio varia et cautelae</i>	
<i>in ea obseruandae</i>	191. seq.
<i>gynoraphia vid. Abdominis vulnera.</i>	
<i>gynellorum partus</i>	1423
<i>gynitalium vlcera venerea</i>	917. seq.
<i>gynber, eius varia genera</i> 1143. <i>causae</i> 1143. <i>curatio</i>	1146
<i>gynbulae, earum tumoribus non sunt imponenda reprimencia,</i>	
<i>ad emollientia</i> 113. <i>Vulneribus quae superueniant?</i> 356.	
<i>gynbulae lacrymalis induratae curatio</i> 303. <i>glandularum Mei-</i>	
<i>omii exulceratarum cura</i>	307
<i>gyncoma</i>	1309. seq.
<i>gynorrhoea suppressa interdum reuocanda</i> 124. <i>ex ea repente co-</i>	
<i>hibita ophthalmia venerea</i>	283 *
<i>gynuidarum regimen</i>	1415
<i>gynuiditatis notae</i>	1413. seq.
	H. Haema-

INDEX.

H.

Haematocele vid. *Hernia*.

Haemorrhagia vid. *Sanguinis profusio*.

Haemorrhoides caecae earumque causae et curatio 1015. earum fluxus nimius 1017.

Hedra vid. *Caluaria*.

Hepatis vulnerati symptomata 655. prognosis 6

Hernia vera, eius descriptio 795. 788. a bubone differt 12

eius varia genera 789. seq. in ea peritonaeum raro ruptur, sed tantum diducitur 794. ἔξομφαλος vel ὀμφαλοκήλη 78

801. seq. *Hernia* ventralis 790. 821. seq. βεβωνοκήλη 79

824. seq. ὀσχεοκήλη hernia scrotalis 791. 842. seq. ἐντερική

ἐπιπλοκήλη 791. μαστοκήλη hernia femoralis vel cruralis 79

848. seq. κύστοκήλη hernia vesicae 793. 850. *Herniae* spuriae

852. ὕδρομφαλος 796. 852. σαρκόμφαλος 796. 853. πνευμ

τόμφαλος 796. ὕδροκήλη 797. 861. seq. σαρκοκήλη 798. 83

seq. κισσοκήλη 799. 875. fe

Herpes 166. eius varia genera et ab erysipellate differentia 91

curatio 920. fe

Hirudines 10

Humerus, eius amputatio vid. *Amputatio*; eius articulus cu

scapula 1162. cum radio et cubito 1177. seq. luxatur 116

seq. reponitur varia ratione 1165. seq. fractura 12

Hydrocele vid. *Hernia*.

Hydrocephalum 733. eius duo genera 744. signa 745. seq. ca

sa 748. curatio 749. fe

Hydromphalos vid. *Hernia*.

Hydrophobia 500. fe

Hydrophthalmia 733. eius causa et curatio 7

Hydrops scroti, eius differentia ab hydrocele 863. et 733. cur

tio 873. fe

Hyperostosis 10

Hypopyon 320 * eius signa, causae et curatio 321. fe

I

Ichor 9

Inflammatio 29. seq. eius notitia necessaria 28. vera et spu

33. sedes 34. seq. causae 35. 37. seq. notae 48. progno

60. exitus varius 52. curatio 53. 61. seq. illius diligent

obseruatio in vulneribus necessaria 3

Instrumentorum chirurgicorum apparatus necessarius 12

Intestina, horum vulnera 664. periculosa 674. suuntur 69

seq. eorum vulneratorum curatio 698. per abdominis vi

nus prolapsa reponenda sunt 686. seq. intestini recti vasa

musculi 9

Iugulum, eius cum scapula et sterno articulus 1154. exci

1155. seq. reponitur 1157. seq. fractura 1255. seq. fractu

1255. fractura commode in situ retinetur fasciae genere no

I N D E X

L.

<i>labrorum vulnera</i>	597.	<i>labrum leporinum</i>	598. seq.
<i>lae reprimentia</i>			115
<i>lacrymalis glandulae induratae curatio</i>	303.	<i>lacrymarum viae</i>	
<i>ex oculo ad nares</i>	958.	<i>saepius angustantur occluduntur</i>	959.
<i>et inflammatione intumescunt</i>	960.	<i>idque a variis causis accidit</i>	961.
<i>sius rei notae</i>	962. seq.	<i>recentis et simplicis ob-</i>	
<i>structionis curatio</i>	964. seq.	<i>lacrymalis sacci tumor, hernia,</i>	
<i>hydrops</i>	969. seq.	<i>earuncula repleti curatio</i>	972.
<i>fistulae verae lacrymalis curatio</i>	974. seq.	<i>lacrymalia puncta prae-</i>	
<i>clusa</i>			987
<i>ophthalmus</i>			580. seq.
<i>ucoma</i>			319
<i>ucophlegmatia</i>			733
<i>namenta carpta</i>			19
<i>lingua, eius calculi</i>	608.	<i>resolutio</i>	607.
		<i>ulcera</i>	915.
		<i>vulnera</i>	606
<i>nteola varie figurata</i>			22
<i>ppitudo</i>	275.	<i>vid. Ophthalmia.</i>	
<i>thotomia vid. Calculus.</i>			
<i>axata et quae ad eorum cognitionem necessaria</i>	1090. seq. et		
<i>1101. in pueris rariora</i>	1101.	<i>luxatorum discrimina varia</i>	
<i>1105. causae</i>	1104.	<i>signa</i>	1105. seq.
<i>quae ex iis oriuntur</i>		<i>pericula</i>	1109.
<i>eorum repositio</i>	1110. seq.	<i>reliqua curatio</i>	1114. seq.
<i>singulos articulos luxatos vid. suis locis,</i>			

M.

<i>alarum vulnera</i>			594
<i>amnia, eius extirpatio</i>	270.	<i>inflammatio</i>	114. et 117.
<i>quo-</i>		<i>modo haec auertenda</i>	115.
<i>quae in ea fugienda</i>	116.	<i>curatio</i>	117. seq.
<i>anus luxatur</i>			1186. seq.
<i>axilla inferior, eius articulus</i>	1125.	<i>excidit</i>	1126. seq.
<i>Maxil-</i>		<i>lae fractura</i>	1251. seq.
<i>edici in casibus chirurgicis officium</i>			7
<i>edulla ossium varia</i>			1031
<i>eliceria Celsi</i>			357. et 486
<i>eliceris tumor</i>			759. seq.
<i>esenterii vulnus</i>			667. et 676
<i>irocele vid. Hernia</i>			
<i>oxa</i>			936
<i>ydriasis</i>			1309. et 1322

N.

<i>nres, earum polypus, vid. Polypus, scarificatio</i>	1299.	<i>vulnera</i>	
<i>592. curtarum narium curatio</i>	593.	<i>ossum nasi fractura</i>	1247. seq.
<i>atura, quid per eam intelligat autor</i>			32 *
<i>epheleon</i>			311 *
			Ne-

Nephrotomia vid. *Calculus*.

Nervorum distentio vulneribus superueniens

355. et 4

O,

Obstructio, eius causae 37. seq. cur ea data augeantur motus vitales, et excitetur febris? 32. est inflammationis causa

Occipitis vulnera periculosa

56

Oculi variis humidis lubricantur 957. igne laesi quomodo curandi? 228. tunicae externae 275 *. custodiuntur in variis si palpebrae inter se glutinatae sunt 285 *. oculorum vulnera 586. phlebotomia 299. in illos quomodo vnguentum conicienda

313

Oedema 722. seq. praeputii

8

Omentum, illud vincendi ratio 684. ex vulnere prolapsi corruptique curatio

683. fe

Omphalocele vid. *Hernia*.

Oryx

3

Ophthalmia 275. seq. eius causae 284. seq. in ea nocent quae refrigerant, reprimunt, et spirituosa 286. eius prognostici 287. seq. in illa quae observanda 290. singulorum eius generum curatio 291. seq. acutae et longae discrimen 288. arida vid. *Xyrophthalmia*, epidemica 283. humida 277. huiusmodi curatio 295. seq. periodica et scorbutica 283. venerea ibidem eius curatio.

38

Oscheocele vid. *Hernia*.

Ossa, eorum articuli et commissurae 1092. seq. cartilagineae 1098. ligamenta 1096. seq. medulla 1031. membranae periostium externum 1029. internum 1030. eorum structura 1028. morbi 1032. seq. morborum horum comparatio cum quibusdam morbis molliorum partium 1034. seq. sup illis nascuntur saepe varia tumorum genera 1036. horum curatio 1037. seq. Fracturae vid. *Fracta*, Luxata, vid. *Luxata*

1130

Os hyoideum, subluxatum

P.

Paedarthrocace 1032. eius causa 1065. 1071. eius historia 1066. curatio

10

Palati ulcera

9

Palpebrae superioris casus 577. seq. futura 585. scarificatio vid. *Scarificatio*.

Panaritium vid. *Paronychia*,

Panni ex linteis.

Panniculus in oculo

325. fe

Paracentesis abdominis 755. seq. vesicae vid. *Vesica*,

882. fe

Paraphimosis

3

Paralampsis

Paronychia vel *Panaritium* 140. seq. quatuor eius genera horum curatio

144 fe

Parotidum tumor et inflammatio

119. fe

Pa

INDEX.

<i>Parturientium</i> situs	1417
<i>Partus</i> , eius, si instat, indicia 1416. eius historia 1417. seq. post eum feminae venter fascia vincendus 1422. difficilis si ab obliquo vteri situ 1435. seq. gemellorum 1423. qui obversis clunibus vtero emergit 1433. transfusus viuis quomodo extrahendus 1432. cur per naturales vias aliquando excludi nequeat 1439. mortui indicia 1425. hic quomodo extrahendus 1426. seq. post partum pudendis vexatis et perinaeo rupto quomodo succurrendum.	1441
<i>Parulis</i>	1087. seq.
<i>Patella</i> , eius cum femore et tibia nexus 1203. luxatus 1204. seq. saepius frangitur	1272
<i>Pectoris vulnera</i> , eorum exploratio 620. seq. externorum curatio 622. seq. his inhaerens plumbea glans quomodo extrahenda 645. eorum quae in cauum penetrant indicia 627. seq. prognosis 634. curatio	635. seq.
<i>Penicilli</i>	21
<i>Perinaei</i> abscessus 1349. sectio 1350. seq. vlcera 1352. fistula 1355. ruptura in partu difficili	1441
<i>Periostium</i> externum 1029. internum 1030. quibus efficitur ut illud renascatur	524. seq.
<i>Perizomata</i>	807. 833
<i>Perniones</i>	209. seq.
<i>Pes inferior</i> , eius articulus cum talo 1208. luxatur	1210. seq.
<i>Phimosis</i>	877. seq.
<i>Phlasis</i> vid. <i>Caluaria</i> .	
<i>Phlegmone</i> 72. differt ab erysipelate et abscessu 73. eius causae 74. pericula 75. curatio 76. seq. phlegmone oculi 281. huius curatio	305
<i>Phlyctenae</i>	310
<i>Pilae</i> seu <i>glomi</i>	21
<i>Pladarotis</i>	771
<i>Pneumatomphalos</i> vid. <i>Hernia</i> .	
<i>Pollex</i> , eius articulus cum osse trapezio luxatur	1190
<i>Polypus</i> narium	776. seq.
<i>Proptosis</i>	281
<i>Psorophthalmia</i> 280. eius curatio	304
<i>Pterygium</i>	320 *. et 324. seq.
<i>Pulmonis</i> vulnerati signa 627. seq. 631. 633. curatio 641. seq.	19. seq.
<i>Pulvillorum</i> varia genera	
<i>Pus</i> 54. quae mouent medicamenta 384. seq. eius in vulnere differentia 348. 351. mutatur ab assumtis 100 *. vid. <i>Abscessus</i> , <i>Suppuratio</i> .	
<i>Putredinis</i> ratio, et quae eam in nostro corpore faciunt 169 **	

R.

<i>Rabiei</i> animantium causae	501
<i>Radii</i> articulus cum humero 1177. cum cubito 1178. cum carpo 1185. fractura	1269

INDEX.

<i>Reppum</i> calculus vid. <i>Calculus</i> , vulnera	666. 671
<i>Reprimentiũ</i> noxa 77. inprimis in glandularum inflammatione	111
<i>Resolutio</i> inflammationis	52
<i>Resonitus</i> vid. <i>Caluaria</i> ,	
<i>Rhachitis</i>	1067. seq.
<i>Rima</i> vid. <i>Caluaria</i> .	
<i>Rhyas</i>	32
S.	
<i>Sanies</i> quae dicatur	90
<i>Sanguis</i> ; causae quibus is per vasa propellitur 31. eius pro-	
fusio ubi toleranda, supprimenda? 403. sistitur variis modi	
238 ****. 242. seq. 404. seq. ubi timetur, quale regimen	
seruandum, et quae remedia adhibenda? 417. post eam quo	
modo vires resciciendae? 418. ex vtero ante partum 1438	
sanguinis extra vasa missi et in pectore haerentis concretiqu	
signa 630. quando ac quomodo hic euocari queat. 635. seq.	
<i>Sarcocele</i> vid. <i>Hernia</i> .	
<i>Sarcomphalos</i> vid. <i>Hernia</i> .	
<i>Scapula</i> , eius articulus cum humero 1162. et iugulo 1154	
eius fractura	1257. seq.
<i>Scarificatio</i> cutis 1297. seq. malleolorum 1300. narium 1298	
palpebrarum	29
<i>Scirrhus</i> 58. 254. eius sedes 254. causae 59. 255. seq. pro-	
gnosis 259. seq. scirrhi duo genera 262. benigni curatio 267	
seq. malignus oritur saepe ex benigno 263. maligni nota	
264. extirpatio	26
<i>Sclerophthalmia</i> 279. eius curatio	30
<i>Scorpionis</i> virus	49
<i>Scroti</i> hernia vid. <i>Hernia</i> , hydrops vid. <i>Hydrops</i> . eius inflam-	
matio	13
<i> Sectio</i> Caesarea	1539. seq.
<i>Secundarum extractio</i> 1419. de ea controuersia.	1420. seq.
<i>Sedes</i> vid. <i>Caluaria</i> .	
<i>Setaceum</i> 939. seq. laudatur ad ophthalmiam chronicam 30	
<i>Siphones</i>	2
<i>Sphacelus</i> 57. 169. eius signa 175. seq. pericula 190. curatio	
214. conf. <i>Gangraena</i> .	
<i>Spina bifida</i> 747. ventosa. vid. <i>Paedarthrocace</i> ,	
<i>Staphyloma</i>	587. seq.
<i>Steatoma</i>	759. seq.
<i>Sterni</i> fractura 1266. trepanatio	65
<i>Stomachi</i> vulnera	61
<i>Strabismus</i>	132
<i>Suffusio</i> 1301. huius historia et de vera eius sede controuers	
ibid *. eius indicia 1302. varia genera 1304. seq. 1307	
1321. causae 1306. seq. prognosis 1310. curatio per victum	
et medicamenta 1311. chirurgia 1312. seq. Corneae in	
cilio et cataractae extractio	132
	Suf

INDEX.

Suppuratio 54. eam quae iuuant et faciunt 89. seq. futuras
notae 84. praesentis indicia 85. seq. ex ea noxae 87. saepe
cohibetur in vulnerum curatione, et vnde 591. huius rei
signa, euentus etc. 392. seq.

Sura vid. *Fibula*.

Symphysis ossium pubis diuisio nouissimis annis proposita 1440.

Synonia vid. *Melicera*.

T.

Taraxis 276. eius curatio 291

Temporum vulnra periculosa 543

Tendo, eius praecisi futura 456. seq. et quae eam sequitur re-
liqua curatio 459. seuiter vulnecati symptomata et aduersus
haec auxilia 461. Tendinis Achillis rupti, luti, curatique
exempla 460

Testiculorum inflammatio 129. seq.

Thlasis vid. *Caluaria*.

Tibiae articulus cum femore et patella 1202. seq. cum fibula
1206. et talo 1208. luxatur 1204. seq. Tibiae fractura 1275

Tonsillae, earum inflammatio 135. seq. suppuratio 139. exul-
ceratio 914

Torcular 237. 240

Reparatio vbi instituenda 564. ad eam instrumentorum appa-
ratus 562. seq. eam perficiendi ratio 565. seq. sterni 654

Tumor crystallinus 881. Tumores cystici, qui sua tunica in-
cluduntur 758. seq.

Turundae 20. nocent in pectoris vulneribus 639 *

V.

Vari 105. seq.

Venaesectio aliquando periculum adfert 1276. instrumenta
quibus perficitur 1277. seq. quomodo instituenda 1280. seq.
triplicem in finem celebratur 1282. seq. in variis corporis
sedibus fit 1286. seq.

Ventriculi vulnera 663. quae periculosa 673. eorum sanatorum
exempla 673. curandi ratio 699

Verruca 886. seq.

Vertebrae primae colli cum occipite articulus 1120. huius cum
secunda vertebra commissura 1121. seq. vertebrarum omni-
um ceruicis, dorfi et lumborum articuli 1131. et ligamenta
1132. Vertebrae luxantur 1135. huius rei indicia 1137.
Vertebras emotas reponendi modus a veteribus traditus 1138.
vera curatio 1139. ligamentorum nimis distentorum causae
1140. et curatio 1141. vertebrarum fractura 1264. seq.

Vesica, eius calculus, vid. *Calculus*, hernia vid. *Hernia*. para-
centesis 1345. seq. Vulnus 669. hoc non semper lethale 679

Vesicatoria 937. seq.

Vexata 706. seq.

Viperac venenum 489. morsus, huius symptomata et curatio
492. seq.

Vlcus

Vlcus 892. differt a vulnere 336. eius sedes 893. causae 894. seq. geneta varia 896. varius ex iis effertur humor 897. notae 898. prognosis 899. curatio varia 900. seq. vlcus cerebri vid. *Cerebrum*. vlcerum corneae varia genera 311. eorum causae 309. seq. et curatio 312. seq. Vlcerum venereorum in genitalibus curatio 917. seq. eorum quae arte fiunt historia 926. seq.
Umbilicus in partu ligandus 1419. si ex vtero propendet quid faciendum 1434. *Umbilici hernia*. vid. *Hernia*.
Vnguis vid. *Onyx*.
Voluulus 814
Vrinae reddendae difficultas 1329. huius curatio. 1330 seq.
Vterus, eius procidentia 1444. seq. eius vaginae procidentia 1446. seq. *Vterus* oblique situs partus difficilis causa 1435. seq. vteri vulnus 668. periculosum 677. vid. *Settio Caesarea*.
Vuae inflammatio 135. seq.
Vulnus 335. differt ab vlcere 336. eius sedes, causae, signa 337. seq. vulnorum varia genera 341. vulnera partium internarum ex quibus signis cognoscenda 361. vulnorum lethalitas 362. seq. vulnera explorandi ratio 358. seq. adeorum curationem quae chirurgus confert 371. vulnus debet ab inhaerentibus purgari 372. et quomodo? 372. vulneris purgati signa 395. vulnus carnibus implendum 395. eique cicatrix inducenda 396. in omni vulnere fere necessaria febris et inflammatio 349. seq. in eius curatione victus et medicamentorum ore sumendorum ratio 399. seq. etiam aëris et animi pathematum venerisque ratio habenda 402. vulnera aliquando sui debent 376. et quomodo 377. seq. contineri multum possunt imposito emplastro glutinante 380. Vulneris simplicis recentis historia 346. seq. curatio 375. 381. 383. vulnus collisum 709. moto pure purgandum 374. eius curatio 384. seq. raro, sed aliquando hoc sui oportet 382. *Vulnera* sclopeto illata 461. seq. *Vulneta* quae vitus habent periculosa sunt 488. quae venenatorum et rebidorum animalium morfu inferuntur aliquando sine noxa sunt 494. eorum prognosis 493. curatio 495. seq. 505. seq. singularum partium vulnera, vid. suis locis.

X.

Xyrophthalmia 278. eius curatio 361

Z.

Zona vid. *Herpes*.

Zoster vid. *Herpes*.




Fig. X.

Fig. X.






Fig. VII.

Fig. VII.

Fig. XI.

Fig. VI.






Fig. XVII.




Fig. VIII.




Fig. XII.






Fig. XVI.



Fig. XIV.



XV.



XV.



Fig. XV.





Fig. XVIII.



Fig. XIII.

